

PROSPECTO

CANIGUARD DUO 26,8 mg/240 mg solución spot-on para perros muy pequeños
CANIGUARD DUO 67 mg/600 mg solución spot-on para perros pequeños
CANIGUARD DUO 134 mg/1.200 mg solución spot-on para perros medianos
CANIGUARD DUO 268 mg/2.400 mg solución spot-on para perros grandes
CANIGUARD DUO 402 mg/3.600 mg solución spot-on para perros muy grandes

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización y fabricante responsable de la liberación del lote:

ALFAMED
 13^e Rue – LID
 06517 Carros Cedex
 Francia

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

CANIGUARD DUO 26,8 mg/240 mg solución spot-on para perros muy pequeños
 CANIGUARD DUO 67 mg/600 mg solución spot-on para perros pequeños
 CANIGUARD DUO 134 mg/1.200 mg solución spot-on para perros medianos
 CANIGUARD DUO 268 mg/2.400 mg solución spot-on para perros grandes
 CANIGUARD DUO 402 mg/3.600 mg solución spot-on para perros muy grandes
 Fipronilo, Permetrina

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Cada pipeta contiene

	Fipronilo	Permetrina	Butilhidroxi-anisol (E320)	Butilhidroxitolueno (E321)	Excipientes*
CANIGUARD DUO para perros muy pequeños	26,84 mg	239,8 mg	0,088 mg	0,044 mg	csp una pipeta de 0,44 ml
CANIGUARD DUO para perros pequeños	67,1 mg	599,5 mg	0,22 mg	0,11 mg	csp una pipeta de 1,1 ml
CANIGUARD DUO para perros medianos	134,2 mg	1.199,0 mg	0,44 mg	0,22 mg	csp una pipeta de 2,2 ml
CANIGUARD	268,4 mg	2.398,0 mg	0,88 mg	0,44 mg	csp una

DUO para perros grandes					pipeta de 4,4 ml
CANIGUARD DUO para perros muy grandes	402,6 mg	3.597,0 mg	1,32 mg	0,66 mg	csp una pipeta de 6,6 ml

* Otros componentes: alcohol bencílico, Dietilenglicol monoetil éter

Solución transparente amarilla

4. INDICACIÓN(ES) DE USO

En perros, para ser administrado frente a infestaciones por pulgas y/o garrapatas cuando también es necesaria la actividad repelente (anti-alimentación) frente a moscas flebotomus y/o mosquitos

Pulgas

Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*). Las pulgas de los perros mueren durante las 24 h siguientes al tratamiento. Un tratamiento proporciona eficacia persistente frente a nuevas infestaciones con pulgas adultas durante 4 semanas. El medicamento veterinario puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas (DAPP), cuando ésta se haya diagnosticado previamente por el veterinario.

Garrapatas

Tratamiento de infestaciones por garrapatas *Ixodes ricinus*

Una aplicación proporciona eficacia persistente frente a infestaciones de garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*, y *Rhipicephalus sanguineus*) durante 4 semanas.

Si algunas especies de garrapatas (*Dermacentor reticulatus* o *Rhipicephalus sanguineus*) están presentes en el momento de la aplicación, puede que no todas las garrapatas se mueran en 48 horas, pero lo harán dentro de la semana.

Moscas flebotomus y mosquitos

Un tratamiento proporciona actividad repelente (anti-alimentación) frente a mosca flebotomus (*Phlebotomus perniciosus*) y frente a mosquitos (*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*) durante 4 semanas

5. CONTRAINDICACIONES

No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.

No usar ni en conejos ni gatos debido a sus reacciones adversas ya que incluso se puede producir su muerte (ver sección 12. “Precauciones especiales para su uso en animales”).

No usar en animales enfermos (p.e enfermedades sistémicas, fiebre...) o convalecientes.

6. REACCIONES ADVERSAS

Se han reportado reacciones cutáneas transitorias en algunos perros después de su uso en el lugar de aplicación (prurito, eritema) y prurito general.

Excepcionalmente se han observado hiperactividad o vómitos.

Si se produce la lamedura puede observarse hipersalivación transitoria.

Si observa algún efecto adverso, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

Como alternativa puede usted notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia Veterinaria vía tarjeta verde

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc

7. ESPECIES DE DESTINO

Perros

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Unción dorsal puntual

Dosis:

La dosis mínima recomendada es de 6,7 mg fipronilo /kg peso corporal y 60 mg de permetrina /kg peso corporal.

Peso del perro	Fipronilo (mg)	Permetrina (mg)
1,5-4 kg	26,8	240
4-10 kg	67	600
10-20 kg	134	1.200
20-40 kg	268	2.400
40-60 kg	402	3.600


Para perros > 60 kg se deberá usar la combinación apropiada de pipetas.

Modo de administración

Retirar la pipeta del blíster. Sostener la pipeta en posición vertical. Golpear suavemente la parte estrecha de la pipeta para asegurarse que el contenido se encuentra en el cuerpo de la parte principal de la misma. Romper la parte superior de la pipeta por la línea indicada

Separar el pelaje del animal hasta que la piel quede visible. Colocar la punta de la pipeta directamente sobre la piel exterior y apretar ligeramente varias veces para vaciar su contenido en dos o tres puntos diferentes a lo largo del animal, desde el hombro hasta la base de la cola, dependiendo del peso corporal.

Como referencia, a los perros de menos de 20 kg se les debería aplicar el medicamento veterinario en dos puntos mientras que los perros por encima de 20 kg deberían recibir el medicamento veterinario en 2-4 puntos



Sistema antigoteo.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Protocolo del tratamiento

El uso del medicamento veterinario debería basarse en una infestación confirmada o riesgo de infestación con pulgas y/o garrapatas cuando también es necesaria una acción repelente (anti-alimentación) frente a moscas flebotomus y/o mosquitos.

Dependiendo del desafío del ectoparásito el veterinario responsable puede recomendar repetir el tratamiento.

El intervalo entre dos tratamientos debería ser de al menos 4 semanas (ver sección de sobredosificación)

10. TIEMPO DE ESPERA

No procede

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Conservar el blister en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta después de “CAD/EXP”. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

Advertencias especiales para cada especie de destino:

El medicamento veterinario sigue siendo eficaz después de la exposición al sol o si el animal se moja por la lluvia.

Evitar baños y lavados frecuentes en perros tratados ya que podría afectar adversamente en el mantenimiento de la eficacia del medicamento veterinario.

Un perro con pulgas puede mostrar una reacción alérgica a la saliva de la pulga llamada Dermatitis atópica por picadura de pulga (DAPP). Si el perro presenta inflamación en la piel, si se rasca y muerde excesivamente y está inquieto e incómodo, consulte con el veterinario para diagnosticar la DAPP.

Para reducir las reinfestaciones de nuevas pulgas, se recomienda tratar a todos los perros del hogar. Deberían también tratarse con productos adecuados los otros animales que conviven en el mismo hogar. Las pulgas de las mascotas a menudo infestan la cesta del animal, la ropa de cama y las diferentes áreas de descanso habituales como alfombras y mobiliario blando las cuales, deberán ser tratadas en caso de infestaciones masivas y al inicio de las medidas de control con insecticidas adecuados, y aspiradas regularmente.

Puede producirse la adhesión de una sola garrapata o la picadura de una mosca o mosquito. Debido a ello, la transmisión de enfermedades infecciosas por estos parásitos no puede excluirse completamente si las condiciones no son favorables.

Estudios han mostrado el efecto anti-alimentación durante 4 semanas para moscas flebotomus y para mosquitos.

Por lo tanto, en viajes cortos (menos de 4 semanas) a zonas endémicas se recomienda aplicar el tratamiento inmediatamente antes de la exposición. Para exposiciones más largas (p.e animales que viven en zonas endémicas o que viajan a estas zonas durante más de 4 semanas), el protocolo del tratamiento debería basarse en la información epidemiológica local.

Precauciones especiales para su uso en animales:

Los animales deben pesarse de forma precisa antes del tratamiento

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en perros de menos de 12 semanas de edad o en perros que pesen menos de 1,5 kg.

Se debe tener cuidado para evitar que el contenido de la pipeta entre en contacto con los ojos o la boca de los perros que reciben el tratamiento. En particular debe evitarse la absorción oral por lamedura de la zona de aplicación por los animales tratados o en contacto con ellos.

Este medicamento veterinario es extremadamente tóxico para los gatos y podría ser fatal. En caso de exposición cutánea accidental, lave al gato con champú o jabón y consulte con un veterinario rápidamente. Para prevenir que los gatos se expongan accidentalmente al medicamento veterinario, mantener a los perros tratados alejados de los gatos después del tratamiento hasta que se seque la zona de aplicación. Es importante asegurarse de que los gatos no se acicalan en el lugar donde un perro ha sido tratado con este medicamento veterinario. En caso de exposición de este tipo, consulte con un veterinario inmediatamente.

No usar en conejos ni en gatos

(pictograma no administrar a gatos)

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

El medicamento veterinario puede causar neurotoxicidad. El medicamento veterinario puede ser nocivo si se ingiere. Evitar la ingestión incluyendo el contacto mano-boca. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrelle el prospecto o la etiqueta.

Este medicamento veterinario puede causar irritación de ojos y mucosas. Por lo tanto, evite el contacto entre el medicamento veterinario y la boca o los ojos incluyendo contactos mano-boca y mano-ojo. En caso de contacto accidental entre el medicamento veterinario y los ojos, enjuague inmediatamente los ojos con agua. Si la irritación ocular persiste, consulte con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Evitar el contacto con la piel. Si el medicamento veterinario entra en contacto con la piel, lavar inmediatamente el área afectada con agua y jabón.

Lávese bien las manos después de su uso.

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños

No comer, beber o fumar mientras se manipula el medicamento veterinario

Las personas con hipersensibilidad conocida (alergia) a fipronilo, permetrina o cualquiera de los otros componentes deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario, que, en muy raras ocasiones, puede causar irritación respiratoria y reacciones cutáneas en ciertos individuos.

No se debe manipular ni jugar con los animales tratados hasta que la zona de aplicación esté seca y durante unas 12 horas después del tratamiento. Por lo tanto, se recomienda tratar a los animales por la noche o al caer la tarde para minimizar el contacto con el animal tratado. El día del tratamiento, los animales tratados no deben dormir

con su dueño, especialmente si son niños.

Mantenga las pipetas guardadas en su embalaje original. Con el fin de evitar que los niños tengan acceso a las pipetas usadas, desechar inmediatamente las pipetas usadas de forma adecuada.

Uso veterinario

iii) Otras precauciones

El fipronilo y la permetrina pueden afectar adversamente a los organismos acuáticos. Los perros no deben bañarse en cursos de agua durante los dos días siguientes a la aplicación.

El medicamento veterinario puede tener efectos adversos sobre superficies pintadas, barnizadas u otras superficies o muebles de la casa. Deje que el punto de aplicación se seque antes de permitir el contacto con dichos materiales.

Gestación y lactancia:

Los estudios de laboratorio efectuados con fipronilo y permetrina no han demostrado efectos teratogénicos ni tóxicos para el embrión. No se han realizado estudios del uso del medicamento veterinario en perras gestantes o en lactación. Durante la gestación y la lactancia utilícese únicamente previa consulta con un veterinario profesional y de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el mismo.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):

Se ha demostrado la seguridad del medicamento veterinario administrando hasta 5 veces la dosis máxima recomendada en cachorros sanos de 12 semanas de edad tratados 3 veces a intervalos de 3 semanas

El riesgo de sufrir reacciones adversas (ver sección de “efectos adversos”) puede incrementarse con la sobredosificación, por lo tanto, los animales deben siempre tratarse con el tamaño de pipeta correspondiente a su peso corporal.

Incompatibilidades:

Ninguna conocida

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

No contaminar estanques, cursos de agua o acequias con el medicamento veterinario o con el envase vacío, puesto que podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Junio 2021

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

El fipronilo: es un insecticida y acaricida que pertenece a la familia de los fenilpirazoles.

El fipronilo y su metabolito el fipronilo sulfona actúan interaccionando con los canales de cloro regulados por ligando, en particular con los canales del neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico (GABA), así como con los canales desensibilizantes (D) y no desensibilizantes (N) del glutamato (Glu, único ligando de los canales de cloro en los invertebrados) bloqueando así la transferencia pre- y post-sináptica de los iones cloruro a través de las membranas celulares.

Esto genera una actividad descontrolada del sistema nervioso central y la muerte de los insectos o acáridos

La permetrina: pertenece a la clase I de los piretroides que son acaricidas e insecticidas y también con actividad repelente. Los piretroides interrumpen los canales de sodio voltaje-dependientes de los vertebrados y no vertebrados. Los piretroides también se llaman “bloqueadores de canal abierto” afectando al canal de sodio enlenteciendo sus propiedades tanto de activación como de inactivación, produciendo una hiperexcitabilidad y muerte del parásito.

El medicamento veterinario proporciona una actividad insecticida persistente e inmediata frente a pulgas (*Ctenocephalides felis*), una actividad acaricida inmediata frente a garrapatas *Ixodes ricinus*, una actividad acaricida persistente frente a garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*) y actividad repelente (anti-alimentación) frente a la mosca flebotomus (*Phlebotomus perniciosus*) y mosquitos (*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*).

Cuando se aplica en perros al menos 2 días antes de la exposición a las garrapatas, el medicamento veterinario demostró experimentalmente que reduce indirectamente el riesgo de *Babesia canis canis* transmitidas por garrapatas *Dermacentor reticulatus* infectadas hasta 28 días después de la aplicación, reduciendo el riesgo de babesiosis canina en perros tratados.

Formatos:

Cajas de 2, 4 o 6 pipetas.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Uso veterinario-Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria

Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización.

Representante del titular:

BEAPHAR IBERICA SL
C/Novelles 12
25245 Vila-Sana
Lleida- España