

ETIQUETA-PROSPECTO

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO - ETIQUETA-PROSPECTO

Frasco de HDPE

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Diptron Aves ornamentales 0,75 mg/ml solución para pulverización cutánea

2. COMPOSICIÓN

Cada ml contiene:

Principio activo:

Fipronilo 0,75 mg

Solución transparente incolora.

3. Tamaño del envase

125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Aves ornamentales.

5. INDICACIONES DE USO

Indicaciones de uso

Tratamiento de las infestaciones por ácaros *Dermanyssus gallinae* en aves ornamentales. En canarios, una aplicación proporciona una eficacia insecticida de hasta 21 días: el medicamento veterinario mostró una eficacia del 74,1 % a los 16-17 días del tratamiento, y del 99,2 % a los 21 días.

6. CONTRAINDICACIONES

Contraindicaciones

No utilizar en aves que vayan a producir carne o huevos destinados para el consumo humano. No usar en animales enfermos o convalecientes.

No usar en conejos, ya que pueden ocurrir reacciones adversas, e incluso la muerte.

No aplicar sobre heridas o piel dañada.

No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

7. ADVERTENCIAS ESPECIALES

Advertencias especiales

Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

Solo para uso externo.

Evitar el contacto con los ojos del animal.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Las personas con hipersensibilidad conocida a fipronilo o a alguno de los excipientes, deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Este medicamento veterinario puede causar irritación de las mucosas y de los ojos. Por consiguiente, evitar el contacto del medicamento veterinario con la boca y los ojos. En caso de contacto con los ojos accidental, o de irritación de los ojos durante la aplicación, lavarlos inmediatamente con abundante agua corriente. Si la irritación persiste, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.

Evitar que el contenido entre en contacto con los dedos. Usar un equipo de protección individual consistente en guantes de PVC o de nitrilo al manipular el medicamento veterinario. Desechar los guantes usados y lavarse las manos con agua y jabón.

En caso de exposición dérmica, lavar inmediatamente las manos con agua y jabón. En caso de irritación, consulte con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta.

No respirar el aerosol. Las personas con sensibilidad conocida o asma pueden ser particularmente sensibles al medicamento veterinario. No usar el medicamento veterinario si se ha experimentado previamente reacción al mismo. Pulverizar a los animales en una habitación bien ventilada.

No aplicar en presencia de niños.

Lavarse las manos después del uso.

No fumar, beber ni comer durante la aplicación.

Los animales tratados no deben manipularse, ni se debe permitir a los niños jugar con ellos, hasta que las plumas estén secas.

Fertilidad y aves en periodo de puesta:

Los estudios de laboratorio efectuados en ratas y conejos no han demostrado efectos teratogénicos.

No se dispone de datos de estudios específicos en aves reproductoras o durante la puesta. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la puesta.

No usar en aves en periodo de puesta ni en aves reproductoras.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No utilizar simultáneamente con otros fármacos acaricidas que se apliquen directamente sobre el animal.

Sobredosificación:

Actualmente, no se dispone de información relativa a sobredosis en las especies de destino.

8. ACONTECIMIENTOS ADVERSOS

Acontecimientos adversos

Ninguno conocido.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en esta etiqueta-prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización utilizando los datos de contacto que encontrará al final de esta etiqueta-prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación:

Tarjeta verde: http://bit.ly/tarjeta_verde

o NOTIFICAVET: <https://sinaem.aemps.es/fvvet/NotificaVet/>

9. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Posología para cada especie, modo y vías de administración

Uso cutáneo.

Método de administración:

Ajustar la boquilla de la bomba a la posición de pulverización. Pulverizar el medicamento veterinario sobre el dorso del ave, a una distancia de, aproximadamente, 5-10 cm.

Posología:

Debe determinarse el peso de las aves con la mayor exactitud posible para garantizar una dosificación correcta, y evitar la infra- o la sobredosificación.

Aplicar una dosis de 10 mg de fipronilo/kg de peso corporal (7,5 mg-15 mg p.c.).

Esta dosis corresponde a:

- En aves pequeñas (canarios, periquitos y similares): 1 a 2 pulsaciones de 0,30 ml, para los formatos de 125 ml y 250 ml.
- En aves grandes (loros, palomas y similares): 1 a 5 pulsaciones de 0,75 ml, para los formatos de 500 ml y 1000 ml.

En ausencia de estudios de seguridad, en particular de datos sobre el margen de seguridad, si la infestación persiste, el intervalo mínimo para repetir el tratamiento debe ser de 21 días.

10. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Instrucciones para una correcta administración

No utilizar Diptron Aves ornamentales 0,75 mg/ml solución para pulverización cutánea si se observan signos visibles de deterioro.

11. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera

No procede.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en el frasco después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN

Precauciones especiales para la eliminación

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Este medicamento veterinario no se deberá verter en cursos de agua, puesto que fipronilo podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos. No contaminar estanques, arroyos o acequias con el medicamento veterinario o con los envases vacíos.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

14. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Clasificación de los medicamentos veterinarios

Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

15. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y FORMATOS

3997 ESP

Formatos

Frasco de 125 ml con bomba pulverizadora de 0,30 ml/pulsación

Frasco de 250 ml con bomba pulverizadora de 0,30 ml/pulsación
Frasco de 500 ml con bomba pulverizadora de 0,75 ml/pulsación
Frasco de 1000 ml con bomba pulverizadora de 0,75 ml/pulsación

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

16. FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN DE LA ETIQUETA-PROSPECTO

Fecha de la última revisión de la etiqueta-prospecto

02/2026

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la base de datos de medicamentos de la Unión (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

17. DATOS DE CONTACTO

Datos de contacto

Titular de la autorización de comercialización, fabricante responsable de la liberación del lote y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

QUÍMICA DE MUNGUÍA S.A.
Derio Bidea, 51
48100 Munguía - Vizcaya
ESPAÑA
Tel. +34 946 741 085
complaints@quimunsa.com
info@quimunsa.com

18. INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional

19. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

20. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Periodo de validez después de abierto el envase primario: 1 año.
Una vez abierto, fecha límite de utilización...

21. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}