

PROSPECTO

1. Denominación del medicamento veterinario

DIPTRON 67 mg solución para unción dorsal puntual para perros pequeños
DIPTRON 134 mg solución para unción dorsal puntual para perros medianos
DIPTRON 268 mg solución para unción dorsal puntual para perros grandes
DIPTRON 402 mg solución para unción dorsal puntual para perros muy grandes

2. Composición

Cada pipeta contiene:

Principio activo:

DIPTRON solución para unción dorsal puntual para perros	Volumen de dosis unitaria (ml)	Fipronilo (mg)
perros pequeños – 2-10 kg	0,67	67
perros medianos – 10-20 kg	1,34	134
perros grandes – 20-40 kg	2,68	268
perros muy grandes – 40-60 kg	4,02	402

Excipientes:

DIPTRON solución para unción dorsal puntual para perros	Butilhidroxianisol (E320) (mg)	Butilhidroxitolueno (E321) (mg)
perros pequeños – 2-10 kg	0,13	0,07
perros medianos – 10-20 kg	0,27	0,13
perros grandes – 20-40 kg	0,54	0,27
perros muy grandes – 40-60 kg	0,80	0,40

Solución transparente.

3. Especies de destino

Perros.

4. Indicaciones de uso

Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) y garrapatas (*Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp.), y como parte de la estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga, cuando haya sido previamente diagnosticada por un veterinario.

5. Contraindicaciones

No usar en animales enfermos (con enfermedad sistémica, fiebre...) o convalecientes.
No usar en conejos, ya que podrían producirse acontecimientos adversos, incluso la muerte.
Este medicamento veterinario se ha desarrollado específicamente para perros. No usar en gatos, ya que podría producirse sobredosificación.
No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

6. Advertencias especiales

Advertencias especiales:

A falta de datos disponibles, el medicamento veterinario no debe utilizarse en cachorros menores de 8 semanas de edad (y/o que pesen menos de 2 kg) [solo para la presentación para perros pequeños en pipeta individual].

El medicamento veterinario no impide que las garrapatas se adhieran a los animales. Si el animal ha sido tratado antes de la exposición a las garrapatas, estas comenzarán a morir en las primeras 24-48 horas tras la adhesión. Habitualmente, esto tiene lugar antes de la ingurgitación, lo que minimiza, pero no excluye, el riesgo de transmisión de enfermedades. Una vez muertas, las garrapatas suelen desprenderse del animal, pero cualquier garrapata que permanezca podrá retirarse con facilidad tirando suavemente de ella.

Evitar bañar/sumergir al animal en agua los 2 días posteriores a la aplicación del medicamento veterinario, así como bañarlo con una frecuencia superior a una vez por semana, al no haber estudios sobre cómo afecta esto a la eficacia del medicamento.

Las pulgas de las mascotas a menudo infestan la cesta, el lecho y las zonas de descanso habitual de los animales, como alfombras y mobiliario blando, que deberán ser tratados en caso de infestación masiva y al inicio de las medidas de control, utilizando un insecticida adecuado y aspirando regularmente.

Como parte de una estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga, se recomienda administrar mensualmente, tanto al perro alérgico como a los demás perros del hogar.

Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

Solo para uso externo.

Evitar el contacto con los ojos del animal.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible antes del tratamiento.

Es importante asegurarse de que el medicamento veterinario se aplica en una zona donde el animal no pueda lamerlo, y de que los animales no puedan lamerse unos a otros después del tratamiento.

Pueden utilizarse champús emolientes antes del tratamiento, pero reducen la duración de la protección frente a pulgas hasta unas 5 semanas si se utilizan semanalmente después de la aplicación del medicamento veterinario. No permitir que los perros naden en cursos de agua los 2 días siguientes a la aplicación.

Pueden adherirse garrapatas de forma aislada. Por este motivo, no puede descartarse por completo la transmisión de enfermedades infecciosas si las condiciones son desfavorables.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Este medicamento veterinario puede causar neurotoxicidad. Mantener las pipetas en el envase original hasta su uso. Para evitar que los niños tengan acceso a las pipetas usadas, eliminarlas inmediatamente.

Las personas con hipersensibilidad conocida a fipronilo o a alguno de los excipientes deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Este medicamento veterinario puede causar irritación de membranas mucosas y ojos. Por consiguiente, debe evitarse el contacto del medicamento veterinario con la boca y los ojos. En caso de contacto con los ojos accidental, o de irritación de los ojos durante la aplicación, lavarlos inmediatamente con abundante agua. Si la irritación ocular persiste, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.

Evitar que el contenido entre en contacto con los dedos. En caso de exposición dérmica, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Lavarse las manos después del uso.

No fumar, beber ni comer durante la aplicación.

Los animales tratados no deben manipularse ni se debe jugar con ellos, especialmente los niños, hasta que el lugar de aplicación esté seco. Por ello, se recomienda tratar a los animales a última hora de la tarde o al anochecer, para minimizar el contacto. Procurar que los animales recién tratados no duerman con sus propietarios, en particular con los niños.

Precauciones especiales para la protección del medio ambiente:

El fipronilo puede afectar adversamente a los organismos acuáticos. No permitir que los animales tratados naden en cursos de agua hasta que hayan transcurrido, al menos, 48 horas desde la administración.

Gestación y lactancia:

Los estudios de laboratorio efectuados en ratas no han demostrado efectos teratogénicos ni tóxicos para el feto.

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Sobredosificación:

En estudios de seguridad en la especie de destino, no se observaron acontecimientos adversos a la dosis recomendada ni a tres y cinco veces la dosis recomendada. El riesgo de acontecimientos adversos (ver sección 7) puede aumentar en caso de sobredosificación, por lo que los animales deben ser siempre tratados con el tamaño de pipeta adecuado a su peso.

7. Acontecimientos adversos

Perros:

Muy raros (<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados):	Reacción cutánea en el punto de aplicación ¹ (decoloración de la piel, alopecia local, prurito, eritema), prurito ² , alopecia ² Hipersalivación, vómitos Signos neurológicos ³ (hiperestesia, depresión, signos nerviosos) Signos respiratorios
--	---

¹ Transitoria.

² General.

³ Reversibles.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con

su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación:

Tarjeta verde: http://bit.ly/tarjeta_verde

o

NOTIFICAVET: <https://sinaem.aemps.es/fvvet/NotificaVet/>

8. Posología para cada especie, modo y vías de administración

Unción dorsal puntual.

Posología:

- * 1 pipeta de 0,67 ml por perro con peso corporal superior a 2 kg y hasta 10 kg
- * 1 pipeta de 1,34 ml por perro con peso corporal superior a 10 kg y hasta 20 kg
- * 1 pipeta de 2,68 ml por perro con peso corporal superior a 20 kg y hasta 40 kg
- * 1 pipeta de 4,02 ml por perro con peso corporal superior a 40 kg y hasta 60 kg

Modo de administración:

Mantener en posición vertical. Dar unos golpecitos en la parte estrecha de la pipeta, con el fin de asegurar que el contenido permanezca en el cuerpo principal de la pipeta.

Partir la punta rompible de la pipeta para unción dorsal puntual siguiendo la línea grabada. Separar el pelaje del animal entre los omoplatos, hasta que la piel quede visible. Colocar la punta de la pipeta contra la piel y apretar ligeramente en uno o dos puntos, hasta vaciar completamente su contenido sobre la piel.

Procurar no humedecer demasiado el pelo con el medicamento veterinario, dado que podría conferir un aspecto pegajoso al pelaje en el punto de aplicación. No obstante, si esto sucediera, desaparece en las 24 horas posteriores a la aplicación.

A falta de estudios de seguridad, el intervalo mínimo entre tratamientos es de 4 semanas.

9. Instrucciones para una correcta administración

Ninguna.

10. Tiempos de espera

No procede.

11. Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Conservar a temperatura inferior a 30 °C.

Conservar en el envase original.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la caja después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

12. Precauciones especiales para la eliminación

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Este medicamento veterinario no se deberá verter en cursos de agua, puesto que el fipronilo podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

13. Clasificación de los medicamentos veterinarios

Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

14. Números de autorización de comercialización y formatos

2991 ESP

Formatos:

Caja con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24, 30, 60, 90, 120 o 150 pipetas.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

15. Fecha de la última revisión del prospecto

09/2026

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la [base de datos de medicamentos de la Unión](https://medicines.health.europa.eu/veterinary) (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Datos de contacto

Titular de la autorización de comercialización y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

QUÍMICA DE MUNGUÍA, S.A
Derio Bidea, 51. 48100 Munguía.
Vizcaya (España)
Tel. +34 94 674 10 85
+ 34 688 75 35 17

n.lopez@quimunsa.com
info@quimunsa.com
complaints@quimunsa.com

Fabricante responsable de la liberación del lote:

QUÍMICA DE MUNGUÍA S.A.
Derio Bidea, 51
48100 Munguía - Vizcaya
ESPAÑA

AB7 SANTE
Chemin des Monges
31450 – Deyme
Francia