

PROSPECTO

1. Denominación del medicamento veterinario

Medicalpet 40 mg solución spot-on para gatos (<4 kg)

Medicalpet 80 mg solución spot-on para gatos (≥4 kg)

2. Composición

Cada pipeta monodosis contiene:

	Unidosis	Imidacloprid
Medicalpet 40 mg para gatos (< 4 kg)	0,4 ml	40 mg
Medicalpet 80 mg para gatos (≥ 4 kg)	0,8 ml	80 mg

Excipientes:

832,0 mg/ml de alcohol bencílico (E1519), 1,0 mg/ml butilhidroxitolueno (E321)

Solución transparente de color amarillo a parduzco.

3. Especies de destino

Gatos.



4. Indicaciones de uso

Para la prevención y el tratamiento de las infestaciones por pulgas en gatos. Un tratamiento previene la infestación por pulgas durante tres o cuatro semanas.

El medicamento veterinario puede usarse como parte de la estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP), cuando haya sido diagnosticada previamente por un veterinario.

5. Contraindicaciones

No tratar a gatitos no destetados de menos de 8 semanas de edad.

No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

6. Advertencias especiales

Advertencias especiales:

El uso innecesario de medicamentos antiparasitarios o en condiciones distintas a las indicadas en el RCM, puede aumentar la presión de selección de resistencias y llevar a una disminución de la eficacia. La decisión de usar el medicamento veterinario debe basarse en la confirmación de la especie y la carga parasitarias, o en el riesgo de infestación basado en sus características epidemiológicas, para cada animal individual.

Debe considerarse la posibilidad de que otros animales del mismo hogar puedan ser una fuente de reinfección por pulgas, debiendo tratarse con un medicamento apropiado cuando sea necesario.

La reinfestación por aparición de nuevas pulgas en el entorno, puede continuar durante seis semanas o más tras el inicio del tratamiento. Por lo tanto, puede ser necesario más de un tratamiento, dependiendo del nivel de pulgas en el entorno. Para ayudar a reducir el desafío ambiental, se recomienda un tratamiento ambiental adicional adecuado contra las pulgas adultas y sus estadios de desarrollo, tratando especialmente la cesta del animal, la ropa de cama y las zonas de descanso habituales, como alfombras y mobiliario blando. Para reducir aún más el desafío ambiental, se recomienda tratar a todos los gatos del hogar. El tratamiento de las gatas lactantes controla las infestaciones por pulgas tanto en la madre como en las crías.

El medicamento veterinario continúa siendo eficaz si el animal se moja, por ejemplo, después de exponerse a una lluvia intensa. Sin embargo, puede ser necesario repetir el tratamiento, dependiendo de la presencia de pulgas en el entorno. En estos casos, tratar como máximo una vez por semana.

Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

Este medicamento veterinario es para uso tópico, no debe administrarse por vía oral.

Evitar el contacto del contenido de la pipeta con los ojos o la boca del animal a tratar.

No dejar que los animales recién tratados se laman unos a otros. Retirar cualquier collar antes de aplicar el medicamento veterinario. Antes de volver a colocar el collar, evaluar visualmente la zona tratada para asegurarse de que esté seca.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Este medicamento veterinario contiene alcohol bencílico y, en raras ocasiones, puede causar sensibilización cutánea o reacciones cutáneas transitorias (por ejemplo, irritación, hormigueo).

Las personas con hipersensibilidad conocida a imidacloprid o al alcohol bencílico deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Evitar el contacto del medicamento veterinario con la piel, los ojos o la boca.

No masajear la zona de aplicación.

No comer, beber o fumar durante la aplicación.

Lavar con agua y jabón la piel expuesta al medicamento veterinario.

En caso de contacto ocular accidental, lavar bien los ojos con agua. Si persiste la irritación en los ojos o en la piel, o en caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrelle el prospecto o la etiqueta.

Después de la aplicación, no acariciar ni acicalar a los animales hasta que la zona de aplicación esté seca.

Lavar bien las manos después del uso.

Precauciones especiales para la protección del medio ambiente:

El imidacloprid es tóxico para los organismos acuáticos. Ver sección “Precauciones especiales para la eliminación”.

Otras precauciones:

El disolvente de este medicamento veterinario puede manchar ciertos materiales, como cuero, tejidos, plásticos y superficies acabadas. Dejar secar el lugar de aplicación antes de permitir el contacto con dichos materiales.

Gestación y lactancia:

Los estudios efectuados en ratas no han demostrado efectos tóxicos para la reproducción, y los efectuados en ratas y conejos no han demostrado efectos tóxicos primarios teratogénicos o tóxicos para el embrión. Los estudios efectuados en gatas gestantes y en lactación junto con su camada, son limitados. Hasta el momento, la evidencia sugiere que no se esperan efectos adversos en estos animales.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No se ha observado incompatibilidad entre este medicamento veterinario al doble de la dosis recomendada, y los siguientes medicamentos veterinarios de uso común: lufenuron, pirantel y prazicuantel. También se ha demostrado la compatibilidad de este medicamento veterinario con una amplia gama de tratamientos rutinarios en condiciones de campo, incluida la vacunación.

Sobredosificación:

No se observaron signos clínicos adversos a cinco veces la dosis terapéutica, semanalmente durante ocho semanas consecutivas.

En casos excepcionales de sobredosis o de lamido del pelaje tras el tratamiento, pueden producirse trastornos del sistema nervioso (como espasmos, temblores, ataxia, midriasis, miosis, letargo).

Es poco probable que se produzca intoxicación tras la ingestión accidental en animales. En tal caso, el tratamiento debe ser sintomático, bajo supervisión veterinaria. No se conoce ningún antídoto específico, pero la administración de carbón activado puede ser beneficiosa.

7. Acontecimientos adversos

Gatos:

Muy raros (<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados):
Agitación (hiperactividad). Diarrea ¹ , hipersalivación (babeo) ² , vómitos ¹ . Signos neurológicos (por ejemplo, depresión (letargia), incoordinación, temblor). Reacción en el lugar de aplicación (por ejemplo, pérdida de pelo, picor, enrojecimiento de la piel, lesiones cutáneas).

¹Pueden ocurrir tras la ingestión oral.

²Puede ocurrir si el gato lame el lugar de aplicación inmediatamente después del tratamiento, debido al sabor amargo. No es un signo de intoxicación, y desaparece en unos minutos sin tratamiento.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación:

Tarjeta verde: http://bit.ly/tarjeta_verde

o

NOTIFICAVET: <https://sinaem.aemps.es/fvvet/NotificaVet/>

8. Posología para cada especie, modo y vías de administración

Unción dorsal puntual. Únicamente para uso externo.

Una dosificación insuficiente podría resultar en un uso ineficaz y favorecer el desarrollo de resistencias. Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para garantizar una dosificación correcta.

Deben seguirse todas las instrucciones dadas por un veterinario para el uso de este medicamento veterinario.

Dosificación y pauta de tratamiento:

La dosis mínima recomendada es de 10 mg de imidacloprid por kg de peso corporal (pc), equivalentes a 0,1 ml/kg pc del medicamento veterinario.

Peso del gato (kg)	Tamaño de pipeta a utilizar	Volumen de la pipeta (ml)	Imidacloprid (mg/kg pc)
<4 kg	Medicalpet 40 mg para gatos	0,4	mínimo de 10
≥4 kg	Medicalpet 80 mg para gatos	0,8	mínimo de 10

Seleccionar el tamaño de pipeta adecuado al peso del gato a tratar.

Para el tratamiento o prevención de infestaciones con pulgas, la necesidad y frecuencia de tratamientos posteriores deben basarse en el asesoramiento profesional, y tener en cuenta la situación epidemiológica local y el estilo de vida del animal.

9. Instrucciones para una correcta administración

Extraiga una pipeta del envase. Mantenga la pipeta en posición vertical, gire el tapón y retírelo. Use el tapón colocado en sentido inverso para, mediante un giro, perforar la pipeta, como muestra la figura 1.

Separe el pelo del cuello del gato en la base del cráneo, hasta que la piel sea visible. Coloque la punta de la pipeta sobre la piel y apriete firmemente la pipeta varias veces para vaciar su contenido directamente sobre la piel, como muestra la figura 2.

La aplicación en la base del cráneo minimizará el riesgo de que el gato pueda lamer el medicamento veterinario.

Aplicar únicamente sobre piel sana.

Sólo para envases monolingües:

Las figuras se muestran a continuación.

Sólo para envases multilingües:

Las figuras se muestran al final del prospecto.

Con el fin de facilitar los prospectos multilingües, las figuras han sido numeradas y este texto añadido para que los gráficos puedan imprimirse sólo una vez al final del prospecto para prospectos multilingües.




Figura 1




Figura 2

10. Tiempos de espera

No procede.

11. Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

Conservar el blíster en el embalaje exterior.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la caja y en la pipeta después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

12. Precauciones especiales para la eliminación

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Este medicamento veterinario no se deberá verter en cursos de agua, puesto que el imidacloprid podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

13. Clasificación de los medicamentos veterinarios

Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

14. Números de autorización de comercialización y formatos

Medicalpet 40 mg para gatos: 1179 ESP

Medicalpet 80 mg para gatos: 1180 ESP

Caja de cartón que contiene un total de 1, 2, 3, 4 o 6 pipetas monodosis en un blíster.

Cada pipeta monodosis contiene 0,4 o 0,8 ml de solución.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

15. Fecha de la última revisión del prospecto

11/2025

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la [Base de Datos de Medicamentos de la Unión](https://medicines.health.europa.eu/veterinary) (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Datos de contacto

Titular de la autorización de comercialización y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Strabbe 4
27472 Cuxhaven
Alemania
Tel: +34 518890402
PV.ESP@elancoah.com

Fabricante responsable de la liberación del lote:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel
Alemania

Representante local:

Elanco Spain S.L.
Av. de Bruselas N13
28108 Alcobendas (España)

Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización.

17. Información adicional

Además de la eficacia como adulticida frente a pulgas de imidacloprid, estudios adicionales demuestran su eficacia como larvicida en el entorno del animal tratado. Los estadios larvarios presentes en el entorno del animal, mueren tras el contacto con el animal tratado.