

ETIQUETA-PROSPECTO

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO - ETIQUETA-PROSPECTO

Envase de polipropileno

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

APIGUARD MULTIDOSIS 0,25 g/g gel colmena

2. COMPOSICIÓN

Cada gramo contiene

Principios activos:

Timol 0,25 g

Gel granular ligeramente opalescente, de incoloro a rosado.

3. TAMAÑO DEL ENVASE

Un envase de 3000 g, 1 jeringa y 2 paquetes sellados de 30 tarjetas dosificadoras.

Caja de cartón que contiene 2 envases de 3000 g, 2 jeringas y 4 paquetes sellados de 30 tarjetas dosificadoras.

4. ESPECIES DE DESTINO

Abejas melíferas (*Apis mellifera*).

5. INDICACIONES DE USO

Indicaciones de uso

Tratamiento de la varroosis causada por *Varroa destructor*.

6. CONTRAINDICACIONES

Contraindicaciones

Ninguna

7. ADVERTENCIAS ESPECIALES

Advertencias especiales

Se deberá tener cuidado para asegurarse de ceñirse a la pauta posológica, ya que una dosificación inapropiada podría tener un efecto perjudicial sobre la colonia.

El medicamento veterinario debe ser usado como parte del programa de control integrado de Varroa.

Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

No aplicar durante la floración para evitar posibles alteraciones en el sabor.

El tratamiento puede realizarse inmediatamente después de retirar las alzas.

No utilizar el medicamento veterinario si la temperatura máxima diaria prevista durante el tratamiento es inferior a 15 °C, si la actividad de la colonia es muy baja o si la temperatura supera los 40 °C.

Agrupar las colonias débiles antes del tratamiento.

Todas las colonias de un apiario deben tratarse simultáneamente.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Usar un equipo de protección individual consistente en guantes impermeables al manipular el medicamento veterinario.

Debido a la posible dermatitis de contacto e irritación de la piel y los ojos, debe evitarse el contacto directo con la piel y los ojos.

Tras la aplicación, lávese las manos y el material que haya estado en contacto con el gel con agua y jabón.

En caso de contacto con la piel, lavar minuciosamente el área afectada con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos minuciosamente con cantidades abundantes de agua limpia y corriente y consultar a un médico.

No inhalar.

Las personas con hipersensibilidad conocida al timol deben evitar el contacto con este medicamento veterinario.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Sobredosificación:

El uso de una dosis superior a la recomendada (50 g de gel por aplicación, equivalentes a 12,5 g de timol) podría causar alteraciones en el comportamiento de la colonia (agitación, fuga o aumento de la mortalidad).

En caso de sobredosis, retire el exceso de medicamento veterinario de la colonia.

8. ACONTECIMIENTOS ADVERSOS

Acontecimientos adversos

Abeja Melífera (*Apis mellifera*).

Raros (1 a 10 animales por cada 10 000 animales tratados):	Agitación ¹ Mortalidad de crías de abejas ² , eliminación de crías ³
---	--

--	--

1. Leve, durante el tratamiento.
2. A altas temperaturas, puede producirse una ligera reducción de crías jóvenes durante el periodo de tratamiento; esto es transitorio y no afecta al desarrollo de la colonia.
3. Localizada. El comportamiento normal de las abejas consiste en retirar o limpiar el gel del recipiente situado sobre los panales de cría sin afectar a la colonia; sin embargo, especialmente en cepas más higiénicas, algunas abejas pueden retirar ocasionalmente crías sin sellar de las proximidades del medicamento veterinario. Si se observa esto, retire el medicamento veterinario de la colonia.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización o a su representante local utilizando los datos de contacto que encontrará al final de esta etiqueta-prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación.

Tarjeta verde: http://bit.ly/tarjeta_verde o

NOTIFICAVET: <https://sinaem.aemps.es/fvvet/NotificaVet/>

9. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Posología para cada especie, modo y vías de administración

Uso en colmenas.

Tratamiento en la colmena: dos aplicaciones de 50 g de gel (12,5 g de timol/dosis) por colonia, con un intervalo de dos semanas.

Máximo de dos tratamientos al año.

Método de administración:

Abrir la colmena. Coloque la tarjeta de dosificación (suministrada) en el medio sobre los marcos de cría. El medicamento veterinario debe mezclarse bien antes de su uso con una espátula de apicultor para colmenas o similar durante 10 segundos. Utilizar la jeringa dosificadora (suministrada), transfiera la primera dosis de 50 g de gel del envase a la tarjeta dosificadora de la siguiente manera:

Retire la jeringa dosificadora de su envase sellado. Introduzca la boquilla de la jeringa hasta el fondo en el gel, asegurándose de que no entre aire en la jeringa. Tire lentamente del émbolo para aspirar 52 ml (equivalente a 50 g) de gel. Saque la jeringa del gel. Empuje suavemente el émbolo para liberar el gel de la jeringa progresivamente a toda la superficie de la tarjeta de dosificación.

Asegúrese de que haya un espacio libre de al menos 0,5 cm entre la parte superior del gel y la tapa de la colmena. Cierra la colmena.

Después de completar la administración del tratamiento a las colmenas, lave la jeringa con agua tibia. Extraiga completamente el émbolo y lave bien la jeringa para eliminar los restos de gel. Deje secar y conservar en un envase sellado hasta el próximo uso.

Transcurridas 2 semanas sustituir la primera tarjeta dosificadora por una nueva y aplicar la segunda dosis de 52ml (equivalente a 50g) de gel siguiendo el mismo procedimiento.

Dejar el medicamento veterinario en la colonia durante 2 semanas más hasta que desaparezca totalmente de la tarjeta dosificadora. Retire el medicamento veterinario al instalar las alzas en la colonia.

Por favor, vea los pictogramas a continuación:



La eficacia del producto se potencia si el producto se utiliza al final del verano después de la cosecha de miel (cuando la cantidad de generaciones de abejas presentes se reduce). Sin embargo, en el caso de infestaciones graves, el producto también puede utilizarse durante la primavera, cuando las temperaturas estén por encima de los 15°C.

La eficacia puede variar entre colonias debido a la naturaleza de la aplicación. Por lo tanto, el medicamento veterinario debe usarse como un tratamiento entre otros dentro de un programa de control integrado de varroa, y la caída de ácaros debe monitorearse regularmente. Si se observa una caída significativa de ácaros durante el siguiente invierno o primavera, se recomienda usar un tratamiento secundario adicional de invierno o primavera para la varroa.

10. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Instrucciones para una correcta administración

El tratamiento puede realizarse inmediatamente después de retirar las alzas.

Agrupar las colonias débiles antes del tratamiento.

Todas las colonias de un apiario deben tratarse simultáneamente.

11. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera

Miel: cero días.

No utilizar durante la mielada.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Precauciones especiales de conservación

No conservar a temperatura superior a 30 °C.

No congelar.

Mantener sin abrir en el embalaje original.

Proteger de la luz directa del sol.

No conservar el producto en la proximidad de pesticidas u otras sustancias químicas que puedan contaminar el medicamento veterinario.

Conservar lejos de productos alimenticios.

Las tarjetas de dosificación restantes deben guardarse en un lugar seco y limpio.

Cargue siempre las tarjetas con gel en un área bien ventilada.

Guarde las tarjetas de dosificación restantes en la caja de cartón exterior.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad indicada en la caja después de la caducidad. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN

Precauciones especiales para la eliminación

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Este medicamento veterinario no se deberá verter en cursos de agua, puesto que el timol podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

14. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Clasificación de los medicamentos veterinarios

Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

15. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y FORMATOS

4075 ESP

Formatos

Un envase de 3000 g, 1 jeringa y 2 paquetes sellados de 30 tarjetas dosificadoras.

Caja de cartón que contiene 2 envases de 3000 g, 2 jeringas y 4 paquetes sellados de 30 tarjetas dosificadoras.

16. FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN DE LA ETIQUETA-PROSPECTO

Fecha de la última revisión de la etiqueta-prospecto

06/2026

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la Base de Datos de Medicamentos de la Unión (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

17. DATOS DE CONTACTO

Datos de contacto

Titular de la autorización de comercialización:

Vita Bee Health Limited,
1 Castlewood Avenue,
Rathmines,
Dublin 6,
D06 H685
Irlanda
+44 1256 473 175
info@vita-europe.com

Fabricante responsable de la liberación del lote:

Cicieffe s.r.l.,
Via. G. Marconi n. 13,
24040 Fornovo San Giovanni (BG),
Italia

Representante local y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

HIFARMAX, S.L.
C/Hartzenbusch, 17 bajo izda
Madrid - 28010 – España,
Tel. +351 214 571 110,
Email - geral@hifarmax.com

Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización.

18. INFORMACIÓN ADICIONAL

19. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

20. FECHA DE CADUCIDAD

Exp {mm/yyyy}

21. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}