

PROSPECTO

1. Denominación del medicamento veterinario

Effipro 2,5 mg/ml solución para pulverización cutánea para gatos y perros.

2. Composición

Cada ml contiene:

Principio activo:

Fipronilo 2,5 mg

Solución transparente, de incolora a amarilla.

3. Especies de destino

Perros y gatos.

4. Indicaciones de uso

Tratamiento de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) en perros y gatos.

Tratamiento de la infestación por garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) en perros y gatos.

Tratamiento de infestaciones por piojos mordedores en perros (*Trichodectes canis*) y gatos (*Felicola subrostratus*).

El medicamento veterinario se puede usar como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la Dermatitis Alérgica a la Picadura de Pulga (DAPP).

La eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones por pulgas adultas dura hasta 6 semanas en gatos y hasta 3 meses en perros, según el impacto del entorno.

El medicamento veterinario tiene una eficacia acaricida persistente de hasta 4 semanas contra garrapatas, según el nivel de impacto del entorno.

5. Contraindicaciones

No usar en animales enfermos (enfermedades sistémicas, fiebre...) o convalecientes.

No usar en conejos, pues pueden producirse reacciones adversas al medicamento e incluso la muerte.

No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

6. Advertencias especiales

Advertencias especiales:

Cuando se usa como parte de una estrategia de tratamiento de dermatitis alérgica a la picadura de pulga, se recomienda realizar aplicaciones al animal alérgico, así como a los demás gatos y perros del hogar todos los meses.

Para una eficacia óptima, no se recomienda bañar o lavar con champú a los animales durante los dos días anteriores o posteriores al tratamiento con el medicamento veterinario. Ha quedado demostrado que, el hecho de bañar o lavar con champú a los animales hasta cuatro veces en dos meses, no presenta efectos

significativos en la eficacia residual del medicamento veterinario. Si se lava a los animales con champú con una frecuencia superior, se recomienda aplicar el tratamiento cada mes.

El tratamiento de lechos, alfombras y colchones con un insecticida adecuado ayudará a reducir el impacto en el entorno, maximizando la duración de la protección que ofrece el medicamento veterinario contra nuevas infestaciones.

Para un control óptimo de los problemas de pulgas en un hogar con varios animales domésticos, todos los perros y gatos del hogar deben tratarse con un insecticida adecuado.

Puede quedar alguna garrapata enganchada. Por esta razón, no puede excluirse por completo la transmisión de enfermedades infecciosas si las condiciones son desfavorables

El medicamento veterinario no es adecuado para el tratamiento directo del medio.

Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

No exceder la dosis recomendada.

Evitar el contacto con los ojos del animal.

No pulverizar directamente en áreas dañadas de la piel.

Permitir que los animales tratados se sequen en una habitación bien ventilada.

No confinar a los animales en espacios cerrados ni en transportines hasta que el pelo esté bien seco.

Es importante asegurarse de que los animales no se laman unos a otros después del tratamiento.

Mantenga a los animales tratados alejados del fuego o de otras fuentes de calor, así como de superficies susceptibles de verse afectadas por el spray alcohólico, como mínimo durante 30 minutos después de la pulverización y hasta que la piel esté totalmente seca.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Este medicamento veterinario puede causar irritación en las membranas mucosas y en los ojos. Por consiguiente, debe evitarse el contacto del medicamento veterinario con la boca y los ojos.

Las personas con hipersensibilidad conocida al fipronilo o a alguno de los excipientes deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. Evitar que el contenido entre en contacto con los dedos. Si esto se produce, lavarse las manos con agua y jabón.

En caso de exposición ocular accidental, lavarse los ojos cuidadosamente con abundante agua.

Los animales tratados no deben manipularse hasta que la piel esté seca, y no se les debe permitir a los niños que jueguen con los animales tratados hasta que la piel esté seca. Por consiguiente, se recomienda evitar tratar a los animales durante el día, y tratarlos preferentemente al anochecer, procurando también que los animales recién tratados no duerman con los propietarios, en particular con los niños.

Pulverizar a los animales al aire libre o en un local correctamente ventilado.

No respirar el spray. No fumar, beber ni comer durante la aplicación.

Usar guantes de PVC o nitrilo durante el tratamiento de los animales. Se recomienda llevar un delantal resistente al agua para proteger la ropa. Si se moja mucho la ropa con el medicamento veterinario, debe ser retirada y lavada antes de volver a utilizarse.

Desechar los guantes después de su uso y lavarse las manos con agua y jabón.

Lavar inmediatamente cualquier salpicadura en la piel con agua y jabón. En caso de irritación, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.

Las personas con sensibilidad conocida o asma pueden ser particularmente sensibles al medicamento veterinario. No utilizar el medicamento veterinario si se ha tenido una reacción al mismo.

Tratamiento de varios animales: es particularmente importante ventilar correctamente el local donde deban tratarse varios animales. Tratar a los animales en el exterior, o reducir la acumulación de vapor sacando a los animales del local de tratamiento mientras se evapora el alcohol, y asegurarse de que el local de tratamiento está bien ventilado entre cada tratamiento individual. Además, asegurarse de que el local donde se secan los animales está correctamente ventilado y evitar mantener a varios animales recién tratados en el mismo espacio.

Precauciones especiales para la protección del medio ambiente:

El fipronilo puede afectar adversamente a los organismos acuáticos. Los perros no deben bañarse en corrientes de agua durante los dos días siguientes a la aplicación del medicamento veterinario.

Gestación y lactancia:

Los estudios de laboratorio efectuados en ratas y conejos no han demostrado efectos teratogénicos del fipronilo. Tras el tratamiento de perras en lactación, se comprobó una muy buena tolerancia de los cachorros al fipronilo.

No existen datos disponibles de estudios específicos durante la gestación en perras, la gestación en gatas o en gatas en lactación. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario, utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

Sobredosificación:

En casos de sobredosis, puede aumentar el riesgo de reacciones adversas.

En caso de sobredosis, se debe iniciar un tratamiento sintomático apropiado.

7. Acontecimientos adversos

Perros y gatos:

Muy raros (< 1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados):
Trastornos cutáneos (p. ej., eritema, prurito, alopecia) ¹
Hipersalivación ² , vómitos
Trastornos neurológicos (p. ej., hiperestesia, depresión del sistema nervioso central, signos neurológicos) ³
Trastornos del tracto respiratorio

¹Reacciones cutáneas transitorias.

²Si el animal se lame, puede observarse un periodo breve de hipersalivación debido, principalmente, a la naturaleza del excipiente.

³Síntomas reversibles.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización o al representante local del titular de la autorización de comercialización utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación:

Tarjeta verde: http://bit.ly/tarjeta_verde o

NOTIFICAVET: <https://sinaem.aemps.es/fvvet/NotificaVet/>

8. Posología para cada especie, modo y vías de administración

Uso cutáneo.

Vía de administración:

Bomba pulverizadora mecánica sólo para uso cutáneo.

La bomba proporciona pulverizaciones de 0,5 ml (frasco de 100 ml) o 1,3 ml (frascos de 250 y 500 ml), según la bomba.

Dosis:

Frasco de 100 ml: Para humedecer el pelaje hasta la piel, aplique de 3 a 6 ml por kg de peso corporal (7,5 a 15 mg de principio activo por kg de peso corporal), según la longitud del pelo.

Puede alcanzarse la dosis con 6 a 12 pulverizaciones por kg de peso corporal del formato de 100 ml.

Frascos de 250 y 500 ml: Para humedecer el pelaje hasta la piel, aplique de 3,9 a 5,2 ml por kg de peso corporal (9,8 a 13 mg de principio activo por kg de peso corporal), según la longitud del pelo.

Puede alcanzarse la dosis con 3 a 4 pulverizaciones por kg de peso corporal del formato de 250 o 500 ml.

Según la longitud del pelaje,

con el formato de 100 ml pueden realizarse entre 4 y 8 tratamientos de un gato de 4 kg, o hasta 3 tratamientos de un perro de 10 kg,

con el formato de 250 ml pueden realizarse entre 2 y 3 tratamientos de un perro de 20 kg,

con el formato de 500 ml pueden realizarse entre 2 y 3 tratamientos de un perro de 40 kg.

Una dosis insuficiente podría dar lugar a un uso ineficaz y podría favorecer el desarrollo de resistencia.


Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para garantizar una dosificación correcta.

9. Instrucciones para una correcta administración

Para los frascos de 250 y 500 ml, coloque la boquilla de la bomba en el pulverizador.

Pulverice el medicamento veterinario sobre la totalidad del cuerpo del animal a una distancia de, aproximadamente, 10-20 cm. Aplique en el sentido contrario al del pelo y asegúrese de que se haya humedecido la totalidad del pelaje. Separe el pelaje, en particular en los animales con mucho pelo, con el fin de que el medicamento veterinario penetre hasta la piel. Para tratar la zona de la cabeza, y para tratar a animales jóvenes o nerviosos, la aplicación puede efectuarse pulverizando sobre una mano con guantes y frotando luego la mano con el medicamento veterinario por el pelaje. Dejar secar naturalmente. No secar con toalla.

Frascos de 250 ml y 500 ml:



1 Coloque la boquilla



2 Pulverice en contra de la dirección del crecimiento del pelo, sujetando al animal



3 Chorro ancho para lomo y lados, de pie


4 Chorro ancho para pecho y vientre, sentado o acostado






5 Chorro estrecho para patas y pliegues de piel, de pie

6 Poner el medicamento veterinario en un guante para la cara

Frasco de 100 ml:



Poner el anillo de seguridad en posición "abierto".



(NOTA: el prospecto que se comercialice deberá mencionar la serie de pictogramas para el envase de 100 ml o la serie de pictogramas para el envase de 250 ml o 500 ml según corresponda.)

Propiedades:

La formulación incluye un agente de recubrimiento. Por consiguiente, la pulverización genera una película y el pelo queda brillante.

Pauta de tratamiento:

Para un control óptimo de la infestación por pulgas y/o garrapatas, la pauta de tratamiento puede basarse en la situación epidemiológica local.

En ausencia de estudios de seguridad, el intervalo mínimo entre dos tratamientos es de 4 semanas.

Cachorros y gatitos desde los 2 días de edad ya pueden recibir un tratamiento con toda seguridad.

10. Tiempos de espera

No procede.

11. Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Altamente inflamable.

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

Proteger de la luz directa del sol.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en el frasco después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

Periodo de validez después de abierto el envase primario: 1 año.

12. Precauciones especiales para la eliminación

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Este medicamento veterinario no se deberá verter en cursos de agua, puesto que el fipronilo podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos. No contaminar estanques, canales o zanjas con el medicamento veterinario o el envase vacío.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

13. Clasificación de los medicamentos veterinarios

Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

14. Números de autorización de comercialización y formatos

Formatos:

1 x frasco de 100 ml

1 x frasco de 250 ml

1 x frasco de 500 ml

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

15. Fecha de la última revisión del prospecto

14/11/2025

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la base de datos de medicamentos de la Unión (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Datos de contacto

Titular de la autorización de comercialización y fabricante responsable de la liberación del lote:

VIRBAC
1^{ère} avenue 2065m LID
06516 Carros
Francia

Representante local y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

VIRBAC ESPAÑA SA
Angel Guimerá 179-181
ES-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel: +34 93 470 79 40

Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización.