

PROSPECTO

1. Denominación del medicamento veterinario

Diptron Fipronilo 50 mg solución para unción dorsal puntual para gatos

2. Composición

Cada pipeta (0,5 ml) contiene:

Principios activos:

Fipronilo.....50 mg

Excipientes:

Butilhidroxianisol (E320).....0,10 mg

Butilhidroxitolueno (E321).....0,05 mg

Solución transparente, de incolora a amarilla.

3. Especies de destino

Gatos.

4. Indicaciones de uso

Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*). Las pulgas presentes en el animal en el momento de la aplicación del medicamento veterinario, morirán en 48 horas. El medicamento veterinario tiene eficacia insecticida persistente durante 4 semanas frente a las pulgas *Ctenocephalides felis*.

Tratamiento y prevención de infestaciones por garrapatas (*Rhipicephalus turanicus*). Las garrapatas presentes en el animal en el momento de la aplicación del medicamento veterinario, morirán en 48 horas. El medicamento veterinario tiene eficacia acaricida persistente durante 4 semanas frente a las garrapatas *Rhipicephalus turanicus*

5. Contraindicaciones

No aplicar en gatitos de menos de 9 semanas de edad y/o que pesen menos de 1 kg.

No usar en animales enfermos (enfermedades sistémicas, fiebre...) o convalecientes

No usar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas e incluso la muerte.

No aplicar sobre heridas o piel dañada.

No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

6. Advertencias especiales

Advertencias especiales:

Durante el periodo de eficacia prevista, las garrapatas morirán y se desprenderán del hospedador, en las 48 horas posteriores a la infestación, normalmente sin haber ingerido sangre. Sin embargo, es posible la adhesión de garrapatas aisladas después del tratamiento, por lo que no se puede descartar la transmisión de enfermedades infecciosas por garrapatas. Una vez muertas, las garrapatas normalmente se desprenderán del animal, pudiéndose eliminar alguna que quede con cuidado.

No hay datos disponibles sobre el impacto del baño/inmersión en agua o el lavado con champú en la eficacia del medicamento veterinario; por tanto, no es recomendable, especialmente durante los 2 días posteriores a la aplicación del medicamento veterinario.

Para un control óptimo de la infestación por pulgas en un hogar con varias mascotas, todos los perros y gatos de la casa deben tratarse con un insecticida adecuado.

Las pulgas de los animales a menudo infestan la cesta, el lecho y las zonas de descanso habitual, como alfombras y colchones que deberían ser tratados, en caso de infestación masiva y al principio de las medidas de control, utilizando un insecticida adecuado y aspirando regularmente.

Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

Solo para uso externo.

Evitar el contacto con los ojos del animal.

Los animales deben pesarse de forma precisa antes del tratamiento.

Es importante asegurar de que el medicamento veterinario se aplica en una zona que el animal no pueda lamer, y que los animales no se pueden lamer unos a otros después del tratamiento.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Este medicamento veterinario puede causar neurotoxicidad. Mantenga las pipetas en el envase original hasta su uso. Para evitar que los niños tengan acceso a las pipetas usadas, desecharlas inmediatamente.

Las personas con hipersensibilidad conocida a fipronilo o a alguno de los excipientes deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Este medicamento veterinario puede causar irritación en membranas mucosas y ojos. Por consiguiente, debe evitarse el contacto del medicamento con la boca y los ojos. En caso de exposición ocular accidental o irritación de los ojos durante la aplicación, lavar inmediatamente con abundante agua. Si la irritación ocular persiste, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.

Evitar que el contenido entre en contacto con los dedos. En caso de exposición cutánea, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Lavarse las manos después del uso.

No fumar, beber ni comer durante la aplicación.

Los animales tratados no deben manipularse hasta que el punto de aplicación esté seco, y tampoco se debe permitir a los niños jugar con los animales tratados hasta que el punto de aplicación esté seco. Por consiguiente, se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino al anochecer, procurando también que los animales recién tratados no duerman con los dueños, especialmente con los niños.

Precauciones especiales para la protección del medio ambiente:

El fipronilo puede afectar adversamente a los organismos acuáticos. No contaminar estanques, arroyos o acequias con el medicamento veterinario o con el envase vacío.

Gestación y lactancia:

Los estudios de laboratorio efectuados en ratas no han demostrado efectos teratogénicos ni tóxicos para el feto.

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia.

Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Sobredosificación:

No se observaron reacciones adversas en la especie de destino en estudios de seguridad llevados a cabo en gatos y gatitos de 9 semanas de edad, y con un peso aproximado de 1 kg, a la dosis recomendada, y a tres y cinco veces la dosis recomendada. El riesgo de reacciones adversas puede, sin embargo, aumentar en caso de sobredosis (ver sección Acontecimientos adversos). Después del tratamiento puede aparecer picor.

Incompatibilidades principales:

No procede.

7. Acontecimientos adversos

Gatos:

Raros (1 a 10 animales por cada 10 000 animales tratados):
Hipersalivación ¹ /babeo ¹
Muy raros (<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados):
Trastornos en el punto de aplicación ² (cambio de color de la piel, alopecia local, prurito, eritema) Prurito ³ , alopecia Salivación excesiva, vómitos Trastornos neurológicos ⁴ (hiperestesia, depresión, signos neurológicos) Signos respiratorios

¹Si el animal se lame, puede observarse hipersalivación/babeo durante un breve periodo de tiempo, debido, principalmente, a la naturaleza del excipiente.

²Reacciones cutáneas transitorias.

³General.

⁴Reversibles.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación:

Tarjeta verde: http://bit.ly/tarjeta_verde

o NOTIFICAVET: <https://sinaem.aemps.es/fvvet/NotificaVet/>

8. Posología para cada especie, modo y vías de administración

Unción dorsal puntual. 1 pipeta de 0,5 ml por gato.

Modo de administración

Mantener la pipeta en posición vertical. Golpear suavemente la parte estrecha de la pipeta hasta asegurar que el contenido permanece en el cuerpo principal de la pipeta.

Partir la punta rompible de la pipeta spot-on siguiendo la línea grabada. Separar el pelaje del animal entre los omoplatos hasta que la piel quede visible. Colocar la punta de la pipeta contra la piel y apretar ligeramente en uno o dos puntos, hasta vaciar totalmente su contenido sobre la piel.

Procurarse no mojar demasiado el pelaje con el medicamento veterinario, dado que podría darle un aspecto pegajoso en el lugar de aplicación. No obstante, si esto se produjera, desaparecerá en las 24 horas posteriores a la aplicación.

A falta de estudios de seguridad, el intervalo mínimo entre tratamientos es de 4 semanas

9. Instrucciones para una correcta administración

Ninguna.

10. Tiempos de espera

No procede.

11. Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la caja después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

Periodo de validez después de abierto el envase primario: uso inmediato.

12. Precauciones especiales para la eliminación

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Este medicamento veterinario no se deberá verter en cursos de agua, puesto que el fipronilo podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su

farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

13. Clasificación de los medicamentos veterinarios

Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

14. Números de autorización de comercialización y formatos

3964 ESP

Formatos:

Caja de cartón con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24, 30, 60, 90, 120 o 150 pipetas.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

15. Fecha de la última revisión del prospecto

10/2025

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la [base de datos de medicamentos de la Unión](https://medicines.health.europa.eu/veterinary) (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Datos de contacto

Titular de la autorización de comercialización, fabricante responsable de la liberación del lote y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

QUÍMICA DE MUNGUÍA S.A.

Derio Bidea, 51

48100 Munguía - Vizcaya

ESPAÑA

Tel. +34 46 741 08

complaints@quimunsa.com

info@quimunsa.com