

PROSPECTO

1. Denominación del medicamento veterinario

Fiprotec 50 mg solución para unción dorsal puntual para gatos

2. Composición

Cada pipeta de 0,5 ml contiene:

Principio activo:

Fipronilo 50,0 mg

Excipientes:

Composición cualitativa de los excipientes y otros componentes	Composición cuantitativa, si dicha información es esencial para una correcta administración del medicamento veterinario
Butilhidroxianisol (E-320)	0,100 mg
Butilhidroxitolueno (E-321)	0,050 mg
Alcohol bencílico (E-1519)	142,500 mg
Dietilenglicol monoetil éter	

Solución para unción dorsal puntual transparente, de incolora a ligeramente amarilla.

3. Especies de destino

Gatos.



4. Indicaciones de uso

Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*). La duración de la protección frente a infestaciones por pulgas es de 5 semanas.

Tratamiento de infestaciones por garrapatas (*Ixodes ricinus*). Las garrapatas (*Ixodes ricinus*) que se encuentren en el animal en el momento del tratamiento, morirán en 48 horas. El tratamiento no protege frente a nuevas infestaciones por garrapatas.

5. Contraindicaciones

En ausencia de datos disponibles, no usar el medicamento veterinario en gatitos de menos de 8 semanas de edad y/o con un peso inferior a 1 kg.

No usar en animales enfermos (enfermedad sistémica, fiebre...) o en proceso de recuperación.

No usar en conejos, pues pueden ocurrir reacciones adversas e incluso la muerte.

No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

6. Advertencias especiales

Advertencias especiales:

Para un control óptimo de las infestaciones por pulgas en hogares con varias mascotas, todos los animales deben ser tratados con un insecticida adecuado.

Las pulgas de las mascotas a menudo infestan la cesta, la ropa de cama y las zonas de descanso habituales del animal, tales como alfombras y mobiliario blando, los cuales deben tratarse en caso de infestaciones masivas y al inicio de las medidas de control, con un insecticida adecuado, y aspirarse regularmente.

Evitar nadar y lavar frecuentemente al animal, al no haberse probado el mantenimiento de la eficacia del medicamento veterinario en estos casos.

Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

Solo para uso externo. Evitar el contacto con los ojos del animal. En caso de contacto accidental, lavarlos inmediatamente con abundante agua.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible antes del tratamiento.

Es importante asegurar que el medicamento veterinario se aplica en un área que el animal no pueda lamerse, y asegurar también que los animales no puedan lamerse unos a otros después del tratamiento. Puede haber adhesión de garrapatas. Por ello, no se puede excluir completamente la transmisión de enfermedades infecciosas.

No aplicar el medicamento veterinario sobre heridas o piel dañada.

No usar en animales diferentes a la especie de destino, especialmente no usar en conejos.

No se ha establecido la toxicidad potencial del medicamento veterinario en gatitos de menos de 8 semanas de edad, que estén en contacto con gatas tratadas. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación /beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

No utilizar simultáneamente con otros medicamentos veterinarios frente a pulgas que se apliquen directamente en el animal.

No dosificar en exceso.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Mantener las pipetas en el envase original hasta el momento de su uso, y desechar las pipetas utilizadas inmediatamente.

Las personas con hipersensibilidad conocida (alergia) al fipronilo o a alguno de los excipientes, deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Evitar que el contenido entre en contacto con los dedos. Si esto ocurre, lavarse las manos con agua y jabón. Este medicamento veterinario puede causar irritación de mucosas y ojos. Por lo tanto, evitar todo contacto del medicamento veterinario con la boca y los ojos.

En caso de contacto con los ojos accidental, lavar los ojos cuidadosamente con agua corriente.

No ingerir este medicamento veterinario, pues es perjudicial. Evitar que los niños tengan acceso a las pipetas, desechándolas inmediatamente tras su aplicación. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico y muéstrole el prospecto o la etiqueta.

Los animales tratados no deben manipularse hasta que el punto de aplicación esté seco, y no se debe permitir a los niños jugar con los animales tratados hasta que la zona de aplicación esté seca. Por ello, se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino al atardecer, y no se debe permitir que los animales recién tratados duerman con los propietarios, especialmente con los niños.

No fumar, beber o comer durante la aplicación.

Lavarse las manos después del uso.

Precauciones especiales para la protección del medio ambiente:

No procede.

Otras precauciones:

El medicamento veterinario puede dañar superficies barnizadas, pintadas u otras superficies o muebles del hogar.

Gestación y lactancia:

No se ha demostrado la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia en gatas.

Los estudios de laboratorio no han demostrado efectos teratogénicos o tóxicos para el feto del fipronilo. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No utilizar simultáneamente con otros medicamentos veterinarios frente a pulgas que se apliquen directamente sobre el animal.

Sobredosificación:

El riesgo de experimentar acontecimientos adversos puede incrementarse en caso de sobredosificación. Puede aparecer prurito tras el tratamiento.

La excesiva administración de medicamento veterinario provocará un aspecto pegajoso del pelaje en el punto de aplicación. Si ocurre, desaparece en las 24 horas posteriores al tratamiento.

Incompatibilidades principales:

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

7. Acontecimientos adversos

Gatos:

Muy raros (<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados):

Hipersalivación¹ (aumento de la producción de saliva); vómitos

Reacciones en la piel en el punto de aplicación: decoloración de la piel², alopecia² (caída del pelo), prurito² (picor), eritema (enrojecimiento)²

Prurito (picor), alopecia (caída del pelo)

Hiperestesia³ (aumento de la sensibilidad), depresión del sistema nervioso central³, signos neurológicos³

Signos respiratorios

¹ Si el animal se lame, puede observarse un breve periodo de salivación excesiva debido, principalmente, a la naturaleza del excipiente.

² Transitorios.

³ Reversibles.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización o a su representante local utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación:

Tarjeta verde: http://bit.ly/tarjeta_verde

o

NOTIFICAVET: <https://sinaem.aemps.es/fvvet/NotificaVet/>

8. Posología para cada especie, modo y vías de administración

Unción dorsal puntual, mediante aplicación tópica en la piel.




Posología: 1 pipeta de 0,5 ml por gato. En ausencia de estudios de seguridad, no aplicar con una frecuencia mayor de cada cuatro semanas.

9. Instrucciones para una correcta administración

Mantener las pipetas en el embalaje original hasta su utilización.

Desprender la lámina de las esquinas y retirar la pipeta de su blíster. No pinchar la lámina con tijeras, cuchillos u otros instrumentos cortantes, ya que se podría dañar la pipeta en el interior.



Sujetar la pipeta en posición vertical. Golpear la parte estrecha de la pipeta para asegurar que el contenido se encuentra en la parte principal de la pipeta. Cortar la parte superior de la pipeta con unas tijeras. Separar el pelaje entre los omoplatos hasta que la piel sea visible. Situar la punta de la pipeta sobre la piel y apretar ligeramente hasta vaciar su contenido, preferiblemente en dos puntos, uno en la base del cráneo y el segundo 2-3 cm más atrás.

Procurar no humedecer demasiado el pelaje con el medicamento veterinario, dado que podría darle un aspecto pegajoso en el punto de aplicación. Si esto ocurre, desaparece en las 24 horas posteriores al tratamiento.

10. Tiempos de espera

No procede.

11. Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y alcance de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de conservación.

Conservar la pipeta en el blíster y la caja hasta su utilización, con objeto de protegerla de la luz. Usar inmediatamente tras la primera apertura del blíster.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

12. Precauciones especiales para la eliminación

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Este medicamento veterinario no se deberá verter en cursos de agua, puesto que el fipronilo podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

13. Clasificación de los medicamentos veterinarios

Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

14. Números de autorización de comercialización y formatos

3050 ESP

Caja de cartón que contiene 1, 2, 3, 4 o 6 pipetas.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

15. Fecha de la última revisión del prospecto

06/2026

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la [Base de Datos de Medicamentos de la Unión](https://medicines.health.europa.eu/veterinary) (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Datos de contacto

Titular de la autorización de comercialización

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX, Raalte
Países Bajos

Fabricante responsable de la liberación del lote:

Beaphar B.V.
Oude Lindertseweg 9
8102 EV Raalte
Países Bajos

Laboratorios Calier, S.A.
Barcelonès, 26 - Pla de Ramassar
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona
ESPAÑA

Representantes locales y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

Beaphar Ibérica SL.
C/ Pau Claris 94, 1A
08010, Barcelona
España
Tel: +34 931 039 817
atencionalcliente@es.beaphar.com

Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización.

17. Información adicional