

ОКСИТОЦИНВЕТ
(розчин для ін'єкцій)
листівка вкладка

Опис

Прозорий безбарвний розчин.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:
окситоцин - 10 МО.

Допоміжні речовини: хлорбутанол гідрат, пропіленгліколь, вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості

A TC vet класифікаційний код QH01BB2- Окситоцин

Діючою речовиною препарату є окситоцин - гормон задньої долі гіпофіза. Поріг індукованих окситоцином скорочень матки знижується напротязі вагітності, при високому рівні естрогенів, або якщо у тварини уже почалися роди. У ветеринарній медицині окситоцин застосовують для стимуляції скорочень під час родів і у післяродовий період при затримці посліду, для лікування метритів, інволюції матки після мануальної корекції, а також для лікування агалакції. Окситоцин розкладається у шлунково-кишковому тракті, тому його слід призначати парентерально. Після внутрішньом'язового введення дія препарату спостерігається через 3-5 хвилин.

У собак дія препарату після внутрішньовенного, внутрішньом'язового, або підшкірного уведення становить 13 та 20 хвилин. Ступінь абсорбції окситоцину при інтраназальному застосуванню різна. Вважається що препарат у невеликій кількості проникає через плаценту та потрапляє у систему кровообігу плоду.

Застосування

Велика рогата худоба, коні, вівці, кози, свині, собаки та коти:

- для стимуляції, або посилення скорочень матки під час родів, для лікування післяпологової затримки посліду, метритів, для прискорення інволюції матки після родів, а також для стимуляції молоковіддачі при агалакції.

- при маткових кровотечах

- для звільнення молочних залоз від молока або запального ексудату при лікуванні маститів.

Дозування

Препарат вводиться внутрішньом'язово або підшкірно:

велика рогата худоба- 4 - 5 мл (40-50 МО) на голову.

коні - 4 - 5 мл (40-50 МО) на голову.

вівці, кози, свині -1 - 3 мл (10-30 МО) на голову.

собаки - 0,3 - 1 мл (3-10 МО) на голову.

коти - 0,3 - 0,5 мл (3 - 5 МО) на голову.

Протипоказання

Підвищена чутливість до окситоцину.

Окситоцин протипоказаний тваринам з дискординацією родової діяльності, що виникла на фоні неправильного розташування плоду. При введенні окситоцину перед родами необхідно дочекатися релаксації шийки матки звичайним шляхом, або попередньо ввести естроген.

Застереження

Побічна дія (частота і вираженість) при використанні на зазначених тваринах, якщо більше, ніж одна.

При правильному розрахунку дози окситоцин рідко викликає суттєві побічні ефекти. Більшість побічних ефектів є результатами призначення невідповідних індивідуальних, або дуже високих доз препарату. Реакції гіперчутливості виникають переважно при призначенні препаратів одержаних не синтетичним шляхом.

При внутрішньовенному введенні препарат необхідно вводити дуже повільно.

Період виведення (каренції)

М'ясо - 0 діб, молоко - 0 діб.

Форма випуску

Флакони з нейтрального скла марки НС-1, НС-2, УСП-1 закриті гумовими корками під алюмінієву обкатку по 5, 10, 20, 50, 100 та 200 мл. Вторинна упаковка - картонна коробка.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності - 12 місяців.

Термін придатності після першого відбору із флакону становить 7 діб за умови асептичного відбору препарату та зберіганні за температури від 2 до 8 °С.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"
61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30, Україна

Виробник готового продукту:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"
61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30, Україна