

ПРОВЕРАВЕТ
(таблетки)

листівка-вкладка

Опис

Таблетки від білого до сіруватого кольору зі специфічним запахом.

Склад

Одна таблетка препарату містить діючу речовину:

медроксипрогестерону ацетат - 5 мг.

Допоміжні речовини: крохмаль картопляний, лактоза, тальк, кальцію стеарат.

Фармакологічні властивості

АТС vet QG03A гормональні контрацептиви для системного застосування.

Діючою речовиною препарату є медроксипрогестерону ацетат-синтетичний прогестин, аналог прогестинів, що продукуються Жовтим тілом. Його дія полягає у перетворенні проліферативного ендометрія у секреторний, посилює гіпертрофію міометрію та пригнічує скорочення матки. Залежно від дози медроксипрогестерону ацетат пригнічує секрецію гіпофізарних гонадотропінів, володіє антиінсуліновою дією. У тварин медроксипрогестерону ацетат виявляє виражений адренкортикальний ефект, і може пригнічувати виділення адренкортикотропного гормону та кортизолу.

Медроксипрогестерон володіє також антиестрогенною дією і може знижувати рівень тестостерону у плазмі крові самців.

Застосування

Препарат «ПРОВЕРАВЕТ» рекомендується застосовувати кішкам та сукам - для попередження та припинення тічки, у котів та кобелів - для зниження статеві активності та корекції небажаної поведінки (мічення території сечею, внутрішньовидова агресія, підвищена збудливість). Препарат також запобігає виникненню ознак псевдо вагітності і лактації.

Дозування

Препарат «ПРОВЕРАВЕТ» застосовується перорально, примусово на корінь язика, або з невеликою кількістю їжі за 1-2 години до основного годування тварини, у наступних дозах:

Кішки:

- для попередження тічки - 1 таблетка 1 раз на тиждень, застосовувати препарат впродовж періоду, коли бажано відтермінувати тічку. Після припинення застосування препарату охота настає приблизно через 2 тижні. Препарат не можна застосовувати довше ніж 18 місяців.

- для припинення тічки - 1 таблетка 1 раз на добу протягом 3-5 діб до припинення ознак тічки, не пізніше ніж на третій день після початку тічки, а потім 1 таблетка 1 раз на тиждень. Переривати тічку не можна частіше ніж 2 рази на рік.

Коти:

- при появі ознак статевих збудження, для заспокоєння та корекції небажаної поведінки (мічення території сечею, внутрішньовидова агресія, підвищена збудливість) - 1 таблетка 1 раз на добу протягом 8 діб, а потім 1 таблетку - 1 раз на тиждень.

Суки:

- для попередження тічки - 1 таблетка на 10 кг маси тіла тварини 1 раз на добу за 7-15 діб до початку тічки, після припинення застосування препарату охота настає через декілька діб; препарат не можна застосовувати довше ніж 32 доби безперервно;

- для припинення тічки - 1 таблетка на 10 кг маси тіла тварини 1 раз на добу протягом перших 3 діб, а потім 2 таблетки на 10 кг маси тіла тварини 1 раз на добу протягом 7 діб до припинення ознак тічки, не пізніше ніж на третій день після початку тічки. Після припинення застосування

препарату тічка зазвичай починається через 4-9 місяців. Не рекомендується проводити більше ніж 2 курси на рік.

Кобелі:

- при появі ознак статевого збудження, для заспокоєння та корекції небажаної поведінки (мічення території сечею, внутрішньовидова агресія, підвищена збудливість) - 4 таблетки на 10 кг маси тіла тварини на добу протягом 8 діб, а потім 2 таблетки на 10 кг маси тіла тварини на добу протягом 8 діб.

Протипоказання

Препарат не можна застосовувати тваринам у період вагітності та лактації та при псевдо вагітності та лактації.

Не застосовувати при захворюваннях сечостатевої та ендокринної систем, порушенні регулярності статевого циклу, пухлинах молочної залози, у статевонезрілих тварин (до першої тічки).

Не рекомендується застосовувати препарат, якщо після виникнення тічки минуло більш ніж 2 доби.

Застереження

При тривалому застосуванні можливі зміни статевого циклу, збільшення молочних залоз, надмірний апетит і збільшення маси тіла.

Препарат застосовувати під наглядом ветеринарного лікаря, особливо для собак породи хорт (борза).

Форма випуску

Пакети з поліетиленової плівки або блістери по 1, 10 та 50 таблеток, запаковані у картонні коробки.

Зберігання

Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 10 до 25 °С.

Термін придатності - 3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення і виробник готового продукту:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез",
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна