

АЛЬБЕНВЕТ 360**(таблетки)**

листівка-вкладка

Опис

Таблетки округлої форми від білого до світло-сірого кольору.

Склад

1 таблетка (1,8 г) містить діючу речовину:

альбендазол - 0,36 г.

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, лактоза, кальцію стеарат, тальк.

Фармакологічні властивості**ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AC11, альбендазол)**

Діюча речовина препарату альбендазол належить до групи бензімідазолів.

Механізм дії альбендазолу полягає у гальмуванні білкового (тубулярного) синтезу, у результаті чого порушується надходження і внутрішньоклітинне транспортування поживних речовин, обмін субстратів речовин (аденозинтрифосфornoї кислоти і глюкози), а також зниженні мітохондріальних реакцій через гальмування фумаратредуктази, що призводить до зниження рівня глікогенів і загибелі паразитів від виснаження.

Альбендазол також має овоцидну дію (знищує яйця гельмінтів), знижує зараження пасовищ та місця виходу собак, зменшує вірогідність перезараження тварин.

Альбендазол застосовують тваринам без дотримання дієти і застосування послаблюючих засобів.

Фармакокінетика альбендазолу у великої рогатої худоби, собак та кішок мало вивчена. Вважається, що при пероральному застосуванні препарат всмоктується краще, ніж інші бензімідазоли. Приблизно 47% дози, введеної внутрішньо, впродовж 9 діб виводяться із сечею у вигляді метаболітів.

Застосування

Лікування і профілактика великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, собак, котів при інвазійних захворюваннях спричинюваних статевозрілими та личинковими формами нематод травного каналу і дихальних шляхів, цестодами, трематодами:

- у великої рогатої худоби, овець, кіз - нематодами травного каналу: *Haemonchus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Ostertagia spp.*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*, *Cooperia spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Nematodirus spp.*;

нематодами дихальних шляхів: *Dictyocaulus viviparus*, *Dictyocaulus filaria*;цестодами: *Moniezia expansa*, *M. benedeni*; *Thysanitiesia giardi*;трематодами: *Fasciola hepatica* (дорослі особини); *Dicrocoelium lanceatum*;

- у коней - нематодами травного тракту: *Parascaris equorum*, *Strongylus vulgaris*, *S. equinus*, *Oxyuris equi*;

- у м'ясоїдних (собак, котів) - нематодами травного каналу: *Toxocara spp.*, *Toxascaris spp.*, *Ancylostoma spp.*, *Uncinaria spp.*, *Trichuris spp.*,

цестодами: *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum*, *Diphylllobothrium latum*;трематодами: *Opisthorchis felinus*.**Дозування**

Вводиться одноразово перорально з кормом, без дотримання дієти, у дозах: _____

Вид тварин	Гельмінтозні захворювання	Доза за д. р., мг/кг м. т.	Доза препарату, табл/кг м. т.
Велика рогата худоба	Нематодози	7,5	1/50
	Цестодози	7,5	1/50
	Трематодози	10,0	1/35-40
Коні	Нематодози	7,5	1/45-50
	Цестодози	7,5	1/45-50

Вівці, кози	Нематодози	5,0	1/70
	Цестодози	5,0	1/70
	Трематодози	10,0	1/35-40
Свині	Нематодози	10,0	1/35-40
Собаки, коти	Нематодози	25,0	1/15
	Цестодози	25,0	1/15
	Трематодози	25,0	1/15

Протипоказання

Підвищена чутливість до препаратів групи бензімідазолів.

Не застосовувати тваринам із захворюваннями печінки, нирок та системи кровотворення!

Не застосовувати ослабленим та виснаженим тваринам!

Не застосовувати одночасно з іншими антигельмінтними засобами!

Не застосовувати при гострому фасціюльозі!

Препарат не можна застосовувати під час парування, самкам в перший триместр, а вівцям,- в першу половину вагітності!

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 14 діб після останнього застосування препарату, молоко можна вживати в їжу через - 2 доби.

До зазначеного терміну молоко та м'ясо згодують непродуктивним тваринам або утилізують, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

При роботі з препаратом необхідно дотримуватись загальних правил особистої гігієни та правил роботи з ветеринарними препаратами.

Форма випуску

Пакети з поліетиленової, полівінілхлоридної, поліетилентерефталатної плівки по 1 таблетці. В полімерних контейнерах по 10 и 100 таблеток.

Зберігання

Зберігати в оригінальній заводській упаковці. Сухе темне, недоступне для дітей, місце за температури від 10°C до 25 °C.

Термін придатності

1 рік.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Виробник готового продукту:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна