

11 0. 03. 2025

Бровальзен порошок
(порошок для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Порошок білого або світло-сірого кольору зі слабким специфічним запахом.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

альбендазол — 75,0 мг.

Допоміжні речовини: мальтодекстрин.

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код: QP52 — антигельмінтні ветеринарні препарати, QP52AC11 — альбендазол.

Альбендазол — антигельмінтик широкого спектра дії з групи бензімідазолів. Високоєфективний проти статевозрілих нематод та їх личинкових форм, що паразитують у травному каналі та дихальних шляхах свійських і диких тварин. Гальмує білковий синтез, у результаті порушується надходження і внутрішньоклітинне транспортування поживних речовин, обмін субстратів речовин (аденозинтрифосфornoї кислоти і глюкози), через гальмування фумаратредуктази знижуються мітохондріальні реакції, що спричиняє загибель паразитів.

Альбендазол погано всмоктується при прийомі всередину. Максимальна концентрація в крові досягається протягом 2-5 годин. Високі концентрації створюються в сечі, жовчі, спинномозковій рідині, печінці. Добре проникає через гематоенцефалічний бар'єр, проникає через плацентарний бар'єр і виводиться з молоком. Метаболізується в печінці з утворенням активних метаболітів (альбендазолу сульфоксиду та альбендазолу сульфону). З організму альбендазол та його метаболіти виводяться переважно з жовчю, частково — з сечею. Період напіввиведення становить в середньому 8,5 годин. При порушенні функцій печінки цей час може збільшуватись.

Застосування

Профілактика та лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, коней за паразитарних захворювань, спричинених статевозрілими і личинковими формами нематод, деякими видами цестод і трематод.

Дозування

Перед застосуванням препарат змішують з кормом і дають одноразово на початку ранкової годівлі. При груповому методі препарат змішують із двох-трьохдобовою порцією корму і згодовують відповідно до раціону.

Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.

Види тварин та гельмінтів	Доза, г/10 кг маси тіла тварини
Велика рогата худоба	
нематоди травного каналу і дихальних шляхів: <i>Haemonchus placei</i> , <i>Ostertagia spp.</i> , <i>Nematodirus spp.</i> , <i>Oesophagostomum spp.</i> , <i>Cooperia oncophora</i> , <i>Strongyloides spp.</i> , <i>Trichostrongylus spp.</i> , <i>Bunostomum spp.</i> , <i>Chabertia spp.</i> , <i>Dictyocaulus viviparus</i> , <i>Protostrongylus spp.</i> , <i>Muellerius spp.</i> , <i>Neoascaris vitulorum</i> , <i>Trichuris spp.</i>	1,0
цестоди преімагінальні та імагінальні: <i>Moniezia spp.</i> , <i>Thysaniezia giardi</i>	
Трематоди печінки: <i>Fasciola hepatica</i> (статевозрілі), <i>Dicrocoelium lanceatum</i>	1,3-2,0
Вівці, кози	

11.03.2025

нематоди травного каналу і дихальних шляхів: <i>Haemonchus spp.</i> , <i>Ostertagia spp.</i> , <i>Oesophagostomum spp.</i> , <i>Strongyloides spp.</i> , <i>Trichostrongylus spp.</i> , <i>Bunostomum spp.</i> , <i>Dictyocaulus spp.</i> , <i>Chabertia ovina</i> , <i>Muellerius capillaris</i> , <i>Cooperia oncophora</i> , <i>Skrjabinema ovis</i> , <i>Protostrongylus spp.</i> , <i>Nematodirus spp.</i> , <i>Trichuris spp.</i>	0,7
цестоди преімагінальні та імагінальні: <i>Moniezia spp.</i> , <i>Avitellina centripunctata</i> , <i>Thysaniezia giardi</i>	
трематоди печінки: <i>Fasciola hepatica</i> (статевозрілі); <i>Dicrocoelium lanceatum</i>	1,0
Коні	
нематоди травного тракту і дихальних шляхів: <i>Parascaris equorum</i> , <i>Oxyuris equi</i> , <i>Strongylus spp.</i> , <i>Cyathostomum spp.</i> , <i>Cylicocycus spp.</i> , <i>Cylicodontophorus spp.</i> , <i>Cylicostephanus spp.</i> , <i>Strongyloides westeri</i> , <i>Dictyocaulus arnfieldi</i>	
цестоди преімагінальні та імагінальні: <i>Anoplocephala magna</i> , <i>Anoplocephala perfoliata</i> , <i>Paranoplocephala tamillana</i> .	0,7

Для худоби, що пасеться на пасовищах, лікувально-профілактичну дегельмінтизацію проводять на початку і наприкінці стійлового періоду.

При захворюванні жуйних тварин на фасціольоз препарат використовують у будь-яку пору року. Залежно від інтенсивності інвазії (визначають за середньою кількістю яєць фасціол у п'яти пробах фекалій) препарат застосовують у таких дозах на 10 кг маси тіла:

- до 4 яєць (низька інтенсивність) — 1,3 г;
- 5-10 яєць (середня інтенсивність) — 1,5-1,7 г.

Враховуючи, що альбендазол малоефективний проти личинок фасціол, першу профілактичну дегельмінтизацію проводять через 2-2,5 місяці після закінчення пасовищного періоду, а повторну — не пізніше ніж за 10-15 діб до вигону тварин на пасовище.

Протипоказання

Не застосовувати вагітним тваринам, особливо у першу третину вагітності, а також за гострої форми фасціольозу.

Застереження

Побічна дія

При використанні у терапевтичних дозах побічних ефектів не виникає. Індекс безпечності альбендазолу становить 8.

Особливі застереження при використанні

При гострому фасціольозі застосовувати препарат недоцільно.

Не застосовувати коням, м'ясо яких призначено для споживання людьми.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не відомі.

Період виведення (каренції)

Після останнього застосування препарату забій великої рогатої худоби, овець, кіз на м'ясо дозволяється через 14 діб. Людям вживати в їжу молоко корів можна через 4 доби. М'ясо та молоко, отримані раніше вказаного терміну, утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Полімерні контейнери або полімерні пакети по 10, 25, 100, 500, 1000 г.

10.03.2025

Зберігання

У сухому темному, недоступному для дітей місці за температури не вище 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ “БРОВАФАРМА”

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ “БРОВАФАРМА”

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна