

05.04.2023

Бровермектин 2%
(розчин для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин світло-жовтого кольору зі специфічним запахом.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

івермектин — 20,0 мг.

Допоміжні речовини: гліцеролформаль, пропіленгліколь, полісорбат-80.

Фармакологічні властивості

ATCvet класифікаційний код: QP54 — ендектоциди; QP54AA01 — івермектин.

Івермектин — сполука напівсинтетичних похідних авермектинів (продуктів біосинтезу актиноміцетів виду *Streptomyces avermitilis*), які належать до хімічної групи макроциклічних лактонів. Має виражену дію на ендо- та ектопаразитів свиней та кроликів.

Механізм дії на організм паразита полягає у тому, що івермектин стимулює виділення нейромедіатора гальмування гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), у результаті чого відбувається блокування передачі нервових імпульсів через інтернейрони вентрального нервового стовбуру нематод та нервово-м'язові сполучення членистоногих, що призводить до паралічу та загибелі паразитів.

Івермектин швидко всмоктується й досягає максимальної концентрації у плазмі крові — близько 50 мкг/л — через 4 години після введення дози 12 мг. Розподіляється по усіх тканинах, але повільно і в обмеженій кількості проникає в оболонки ока. Період напіввиведення становить 28 годин. Виводиться переважно з калом.

Застосування

Лікування та профілактика тварин при ураженні ендо- та ектопаразитами:

— свині — статевозрілими і личинковими формами нематод *Ascaridae*, *Metastrongylidae*, *Oligacanthohynchidae*, *Ollulanidae*, *Strongyloididae*, *Trichonematidae*, *Trichuridae* (гельмінтози); кліщами *Demodex phylloides*, *Sarcoptes parvula*, *S. suis* (акарози); вошами *Haematopinus suis* (ентомози);

— кролі — нематодами *Oxyuridae*, *Trichostrongylidae*, *Protostrongylidae*, *Trichuridae*; кліщами *Psoroptes cuniculi*, *Cheyletiella parasitovorax*, *Listophorus gibbus* (акарози); блохами *Spilopsyllus cuniculi*.

Дозування

Препарат додають до питної води з розрахунку 1 мл на 50 кг маси тіла й дають тваринам:

Свині — визначену дозу розводять в 1/3 частині добової норми води та випоюють протягом дня.

Кролі — визначену дозу ділять на 5 частин і щоденно додають до 1/2 частини добової норми води.

Обробку тварин всіх видів проводять вранці після відключення на дві години системи водопοїння. За наявності ектопаразитів обробку повторюють через тиждень. Одночасно проводять дезакаризацію приміщень зареєстрованими інсектоакарицидними засобами.

Протипоказання

Немає.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій свиней та кроликів на м'ясо дозволяється через 24 доби.

Форма випуску

Скляні темні або полімерні флакони по 10, 50, 100, 200, 500, 1000 мл.

Зберігання

Сухе темне, добре провітрюване, недоступне для дітей місце, за температури від 4 до 25 °С.

Термін придатності

2 роки. Водний розчин препарату використати протягом 12 годин.

05.04.2023

Для застосування у ветеринарній медицині!

Назва і місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна