



МАЗЬ НОВЕРТИНОВА

(мазь)

листівка-вкладка

Опис

Мазь для зовнішнього застосування від білого до світло-жовтого або світло-сірого кольору із слабким специфічним запахом.

Склад

100 г препарату містить діючу речовину:

абамектин - 0,05 г.

Допоміжні речовини: поліетиленгліколь-400, поліетиленгліколь-1500, пропіленгліколь, гліцерин, бензиловий спирт.

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QP54 Ендектоциди, Макроциклічні лактони, авермектини, QP54AA02 Абамектин.

Абамектин - це хімічна сполука з групи макроциклічних лактонів, яка є акарицидом та інсектицидом. Механізм дії абамектину на організм паразита полягає в тому, що абамектин діє як антагоніст нейромедіатора ГАМК (гамма-аміномасляної кислоти) в нервових клітинах, а також зв'язується з глутамат-хлоридними каналами в нервових та м'язових клітинах безхребетних. В обох випадках він блокує передачу нейронних сигналів, у результаті чого відбувається параліч і загибель членистоногих. У ссавців ці рецептори локалізовані лише в центральній нервовій системі, а абамектин не проникає через гематоенцефалічний бар'єр, тому в рекомендованих дозах є безпечним для ссавців.

Застосування

Лікування собак, котів і декоративних кролів, хворих на акарози: псороптоз (*Psoroptes cuniculi*), отодектоз (*Otodectes cynotis*), нотоєдроз (*Notoedres cati*, *Notoedres cuniculi*), саркоптоз (*Sarcoptes canis*, *Sarcoptes cuniculi*), демодекоз (*Demodex canis*, *Demodex cati*); застосовують при ураженні волоссями (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), вошами (*Linognathus setosus*, *Haemodipsus ventricosus*), блохами (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalus felis*, *Spilopsyllus cuniculi*).



Дозування

При лікуванні отодектозу, псороптозу, нотоєдрозу, саркоптозу, препарат наносять на уражені ділянки з розрахунку 0,2 г/см². Обробку проводять двічі з інтервалом 5-7 діб, за необхідності лікування повторюють.

При лікуванні демодектозу уражені ділянки обробляють препаратом з розрахунку 0,2 г/см². Обробку повторюють п'ять разів з інтервалом 7-10 діб.

Для боротьби з волососідами, блохами, вошами мазь втирають проти шерсті в місця, недоступні для злизування. Обробку проводять двічі з інтервалом в 7-10 діб.

Протипоказання

Не застосовують для ослаблених, виснажених та хворих тварин.

Застереження

Не дозволяти тварині злизувати препарат.

Форма випуску

Туби ламінатні по 30 г.

Зберігання

У сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 2 °С до 27 °С, в упаковці виробника.

Термін придатності після першого відкриття (відбору): 8 місяців за умови зберігання в оригінальній упаковці, в темному місці за температури від 2 °С до 8 °С. Термін придатності препарату - 2 роки.

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1

www.ukrzoovet.com.ua



Для застосування
у ветеринарній
медицині

Виробник готового продукту

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1

www.ukrzoovet.com.ua

