

POLIMUN IB VAR 2, ПОЛІМУН ІБК ВАР 2	
вакцина проти інфекційного бронхіту курей зі штаму VAR2/V2, жива.	
СКЛАД	Активні діючі речовини в дозі: отриманий на ВПФ курячих ембріонах вірус інфекційного бронхіту курей штаму VAR2/V2 $\geq 3,5$ ІД ₅₀ .
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА	Ліофілізат.
ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	Вакцина стимулює, формування специфічного імунітету у птиці впродовж 14 діб після вакцинації і захищає вакцинованих курчат від захворювання на інфекційний бронхіт впродовж (6-8)-ми тижнів. Вакцина лікувальними властивостями не володіє.
ВИД ТВАРИН	Кури.
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ	Профілактика захворювання курей на інфекційний бронхіт починаючи з добового віку.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Забораються вакцинувати птицю яка: - знаходиться в інкубаційному періоді інфекційного захворювання; - знаходиться у стані виснаження; - уражена гельмінтами; - перебуває у стресовому стані, викликаному транспортуванням, впливом зовнішнього середовища, або у іншому імуносупресивному стані. Напруженість імунітету може бути недостатньою у випадках, коли вакцина була застосована не відповідно до листівки-вкладки.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ	Неналежне зберігання, транспортування та поводження з вакциною може спричинити зниження її імуногенної активності. Вакцина має бути захищена від впливу прямих сонячних променів та використана впродовж 2-х годин з моменту її розчинення. Не використовувати вакцину в флаконах з тріщинами, без етикеток, з порушенням укупорювання, а також не використати впродовж 2-х годин з моменту її розчинення або з закінченням терміном придатності.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ	Дозволяється застосування з добового віку у поєднанні з вакциною проти ньюкаслської хвороби.
ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ПРИ ВАГІТНОСТІ, ЛАКТАЦІЇ, НЕСУЧОСТІ	Не застосовувати вакцину птиці за 4 тижні до початку та в період несучості. Вимушена вакцинація в період несучості не викликає зниження продуктивності. Тимчасове зниження кількості відкладених яєць може бути викликане стресом.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ	Кількість доз вакцини у флаконі вказана на етикетці. Вакцинацію та ревакцинацію проводять одним з наступних методів: спрей-методом, інтраокулярно або методом виколювання. Увага! Для профілактики інфекційного бронхіту курей найефективнішими вважаються інтраокулярний та спрей-метод. Пам'ятка перед проведенням вакцинації: Використовувати чисте обладнання в справному стані, що не містить залишків дезінфектантів. Температура води має становити 10-20°C. Вода для розчинення вакцини не повинна містити іонів хлору та заліза, а також антибіотиків та дезінфектантів. Для більш якісного проведення вакцинації рекомендується використовувати індикатор-стабілізатор «ІНДИГО» або інші аналогічні за якістю. Вакцину розчиняють шляхом додавання 5-8 мл охолодженої чистої питної або кип'яченої води у флакон з вакциною та ретельним струшуванням до повного розчинення ліофілізату. Отриманий розчин використовують для приготування робочих розчинів для кожного з наступних методів застосування препарату. Інтраокулярний метод Інтраокулярний метод застосовується курчатам з добового віку. Ліофілізовану вакцинацію розчиняють із розрахунку - 1000 доз вакцини у 30-50 мл води (точна кількість води залежить від типу крапельниці, що застосовують). Тримавши птицю в одній руці, підставити її під крапельницю, щоб в око потрапила одна крапля. Якість застосування вакцини контролюють за забарвленням кон'юнктиви в синій колір. Спрей-метод Для розпилення вакцини використовують автоматичний розпилювач або розпилювач з ручним керуванням. При використанні розпилювача з ручним керуванням важливо нанести вакцину на птахів двічі. Відкалібрувати автоматичний розпилювач (або розпилювач з ручним керуванням) для розпилення крапель відповідного розміру. Перед проведенням вакцинації перевірити відповідність розміру крапель і рівномірність нанесення розчину шляхом розпилення його на будь яку контрастну поверхню. Кількість доз препарату обирають в залежності від кількості птиці, що підлягає вакцинації. Налити розчин вакцини в резервуар розпилювача і обережно розмішати. Розчин з вакциною поповнюють кожні 1,5-2 години. Необхідно слідкувати за роботою випускного отвору та температурою води (10-20°C). Розпилення проводять з висоти близько 40 см над головами птахів. У результаті розпилення птиця повинна бути повністю змоченою.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ	Проведенням вакцинації крупнокрапельним методом: Вакцинують курчат з добового віку. На кожні 1000 доз потрібно 200-300 мл води. Розмір крапель 150-250 μ. Після розпилення утримують птахів 15-20 хвилин в закритому, добре прогрітому приміщенні подалі від протягів до повного висихання. Проведенням вакцинації дрібнокрапельним методом: Вакцинують курчат не раніше 12 добового віку. На кожні 1000 доз потрібно 400-500 мл води. Розмір крапель 100-150 μ. Скупити птахів в одній стороні пташника, вимкнути вентиляцію та обігрів приміщення, увімкнути світло. Провести розпилення вакцини. Увімкнути вентиляцію через 10-20 хв після закінчення процесу розпилення. Перевірка вакцинації Якості вакцинації контролюють за наявністю блакитного барвника на пір'ї птахів, щоб впевнитись, що птахи повністю змочені, проведіть по них рукою. Метод випоювання За добу до застосування вакцини проводять визначення об'єму води в літрах, що випиває птиця продовж 1-1,5 години. Вакцинацію бажано проводити зранку. У день вакцинації вакцину розводять таким чином, щоб у попередньо визначеному об'ємі води для випоювання містилась одна доза вакцини для однієї птиці. Перед вакцинацією перекривають подачу води за 1-3 години.
ПЕРЕДОЗУВАННЯ (СИМПТОМИ, НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ)	Застосування десяти доз вакцини, не має негативного впливу на здоров'я птицю. У 5-7% курчат після вакцинації методом крупнокрапельного спрею можлива незначна реакція у формі слабких респіраторних симптомів, що зникають впродовж 3-5 діб.
ПЕРІОД ВИВЕДЕННЯ	Нуль діб.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ І ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ВІП	Необхідно дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та техніки безпеки при роботі з птицею. При застосуванні препарату спреї-методом рекомендується одягнути респіратори та захисні окуляри, щоб уникнути ураження органів дихання та слизової оболонки очей. У разі випадкового проколювання вакцини необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, маючи при собі листівку-вкладку на цей препарат.
ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З НЕВИКОРИСТАНИМ ВІП, СПОСОБИ ЙОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ	Не використану впродовж 2-х годин після розчинення вакцину і вакцину з закінченим терміном дії необхідно знезаразити кип'ятінням впродовж 30 хвилин.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	24 місяці. Дві години після розчинення.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ	В темному, не доступному для дітей місці, за температури від 2 до 8°C. Заморожування та зберігання вакцини впродовж терміну придатності при температурі мінус 20°C не впливає негативно на якість препарату. Транспортиують всіма видами транспорту за дотриманням вказаних температурних режимів.
УПАКОВКА ТА ФАСУВАННЯ	Флакони зі скла по 50, 100, 300, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 доз.
НАЗВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВЛАСНИКА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ТА ВИРОБНИКА	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» 08601, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 57-А, Україна, тел.: +38 044 339-99-51 www.biotechlab.ua.
ПРАВИЛА ВІДПУСКУ	Без рецепта.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення реклаमाцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії вакцини з розчинником за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.