

11 07. 2025

Азидин-вет
(порошок для розчину для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Світло-жовтий аморфний порошок без запаху, добре розчинний у воді.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини:

диміназону ацетурат - 438,0 мг,

феназон - 562,0 мг.

Фармакологічні властивості

ATCvet класифікаційний код: QP51 – антипротозойні ветеринарні препарати (QP51AF01 – диміназон).

Діючою речовиною препарату є іонний асоціат 4,4-(діазоаміно)-добензамідину з N-ацетилгліцинатом (диміназону ацетуратом), який виявляє активність щодо збудників протозоозів родів *Babesia* та *Trypanosoma*, а також певною мірою проявляє антибактеріальні та фунгістатичні властивості. Механізм дії диміназону ацетурату полягає в зміні процесів аеробного гліколізу та синтезу ДНК найпростіших, що призводить до їх загибелі.

Феназон проявляє анальгетичні та антипіретичні властивості і зменшує проникність судин.

Після введення препарат всмоктується досить швидко. Максимальні рівні препарату в крові після внутрішньом'язової ін'єкції фіксують через 3-5 годин. Ці рівні забезпечують підтримку терапевтично ефективних концентрацій впродовж тривалого часу, достатнього для того, щоб препарат міг гарантовано знищити паразитів крові. Виводиться із організму через нирки. Через 24 години після ін'єкції виводиться більша його частина.

Після застосування препарат здатний забезпечити захисну дію організму тварин до реінвазії і відновлення активності збудників піроплазмідозів впродовж 10-15 діб. Застосування препарату не призводить до розвитку звикання паразитів.

Застосування

Лікування собак і котів за кровопаразитарних захворювань – бабезіозу (піроплазмозу) та трипаносомозу.

Дозування

Препарат використовують у формі 3,5% розчину. Для цього у флакон з порошком (розфасованим по 0,24; 2,4 г), вносять воду для ін'єкцій у об'ємах відповідно – 2,5; 25,0 мл і ретельно струшують до отримання прозорого розчину. Приготовлений розчин препарату вводять внутрішньом'язово або підшкірно із розрахунку 0,1 мл на 2 кг маси тіла. Якщо після одноразового введення препарату загальний стан хворої тварини не покращується, то через 24-30 годин розчин препарату вводять повторно в тій же дозі.

Протипоказання

Не застосовувати препарат тваринам за захворювань нирок.

Застереження

Побічна дія

При застосуванні в рекомендованих дозах побічна дія не спостерігається. Водний розчин препарату добре переноситься тваринами за внутрішньом'язового та підшкірного введення. В деяких випадках у місці введення спостерігається набряк, який проходить самовільно.

Особливі застереження при використанні

Препарат застосовують лише непродуктивним тваринам.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

11.07.2025

Препарат несумісний з гідрокортизоном, гепарином, дициленом, цефалоспоринами, препаратами амфотерицину та аміноглікозидами.

При передозуванні в собак можуть спостерігатися слинотеча, тремор м'язів, судоми та ознаки нервового збудження. Як антидот 40% розчин глюкози (внутрішньовенно) та розчин кофеїну (підшкірно) в загальноприйнятих дозах.

Період виведення (каренції)

Препарат рекомендований лише для непродуктивних тварин і не потребує розрахунку періоду виведення залишків.

Форма випуску

Скляні флакони по 0,24 та 2,4 г.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце при температурі від 8 до 20 °С.

Термін придатності

2 роки.

Приготовлений розчин препарату дозволений для використання впродовж 14 діб за умови зберігання його в холодильнику.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна