



РЕЕСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 «Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів» та на підставі експертного висновку 15.12.2021 № 3930-K/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 14.02.2022 № 73 зареєстровано:

продукт Вектра Феліс

форма Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення

Власник реєстраційного посвідчення:

Сева Санте Анімаль

10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн, ФРАНЦІЯ

зареєстровано в Україні за № АА-07008-03-17 від 14.02.2022

Виробник:

Сева Санте Анімаль

10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн, ФРАНЦІЯ

AB7 САНТЕ

Чемін де Монж, 31450 Дейм, ФРАНЦІЯ

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка препарату (додаток 2);
- етикетка (додаток 3).

Реєстраційне посвідчення дійсне до: 13.02.2027

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного продукту.



14.02.2022

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Вектра Феліс

2. Склад

0,9 мл препарату містять діючі речовини:

динотефуран - 423 мг,

пірипроксифен - 42,3 мг.

Допоміжні речовини: диметилсульфоксид.

3. Фармацевтична форма

Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення.

4. Фармакологічні властивості

ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти

Динотефуран – похідний гуанідину, належить до нейротоксинів класу неонікотиноїдів, діє на постсинаптичні ацетилхолінові рецептори нервової системи, спричиняючи загибель ектопаразитів.

Пірипроксифен – аналог ювенільного гормону, що регулює ріст і розвиток комах, у тому числі і бліх. Механізм його дії полягає в порушенні нормального циклу метаморфози комах: яйце - личинка - лялечка - імаго. При нашкодженні, речовини, що входять до складу препарату, кумулюються в епідермісі, волосяних фолікулах і жирових залозах, що сприяє довготривалій контактній інсектоакарицидній і репелентній дії.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Коти.

5.2 Показання до застосування

Лікування котів при ураженні блохами (*Ctenocephalides felis*) на усіх фазах розвитку комах (яйце-личинка-лялечка-доросла комаха).

Препарат Вектра Феліс може застосовуватися у комплексній програмі лікування і профілактики алергічного дерматиту (FAD).

5.3 Протипоказання

Не застосовують препарат Вектра Феліс кошенятм віком до 7 тижнів і масою тіла до 0,6 кг, при індивідуальній гіперчутливості до компонентів препарату.

З ОБЕРЕЖНІСТЮ застосовують ослабленим, хворим і вагітним тваринам після консультації з лікарем ветеринарної медицини.

5.4 Побічна дія

Іноді на місці нанесення препарату спостерігають злипання шерсті або білий сухий наліт, які проходять через 48 годин і не впливають на ефективність та безпечність препарату.

5.5 Особливі застереження при використанні

Препарат наносять лише на суху і неушкоджену шкіру тварини.

Після обробки тварин їх не рекомендують купати впродовж 48 годин.

Якщо у приміщенні утримують декількох котів, то їх необхідно обробляти препаратом одночасно.

Для профілактики ураження тварин блохами необхідно утримувати місця перебування тварин у чистоті і періодично (через кожні два тижні в теплу пору року) обробляти їх інсектицидними препаратами (напр. Неостомазаном).

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Дослідження щодо впливу препарату Вектра Феліс на котів від час вагітності і лактації не проводилися.

Лабораторні дослідження впливу динотефурану та пірипроксифену на щурах та кролях не виявили тератогенної, ембріотоксичної дії та негативної дії на відтворення.

Динотефуран у щурів виявляли у молоці.

Доцільність (користь/ризик) застосування препарату тваринам під час вагітності та лактації визначає лікар ветеринарної медицини.

14.02.2022

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідома.


5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Препарат Вектра Феліс застосовують зовнішньо шляхом точкового нанесення на суху неушкоджену шкіру в недоступному для злизування твариною місці (між лопатками).


Одна піпетка розрахована для застосування одній тварині відповідно до рекомендованої мінімальної дози – 42,3 мг динотефурану/кг маси тіла тварини та 4,23 мг пірипроксифену/кг маси тіла тварини.

Спосіб застосування:


1. Виймають піпетку з упаковки.
2. Тримавши кришечкою догори, утримують піпетку пальцями нижче більшого диска.



3. Другою рукою натискають вниз на менший диск до притискання обох дисків. Таким чином проколюється захисна мембрана.



4. Розгортають шерсть тварини так, щоб видно було шкіру і наносять препарат, обережно стискаючи стінки піпетки. Тварина повинна знаходитись у зручному положенні для нанесення препарату. Уникати потрапляння препарату на шерсть тварини.



Одноразова обробка тварини препаратом Вектра Феліс попереджає ураження блохами щонайменше впродовж одного місяця. Повторну обробку рекомендують проводити через 30 діб. При сильному ураженні блохами за рекомендацією лікаря ветеринарної медицини обробку можна повторити через 2 тижні.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Ніяких клінічних небажаних симптомів не спостерігали при застосуванні препарату Вектра Феліс здоровим кошеням віком 7 тижнів у дозі, яка перевищувала рекомендовану у 5 разів, якою обробляли тварин 7 разів з інтервалом у 2 тижні.

Після випадкового потрапляння препарату всередину (всмоктування) серйозних наслідків не спостерігали.

5.10 Спеціальні застереження

Немає.

5.11 Період виведення (каренція)

14.02.2022

Для непродуктивних тварин не визначають.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Під час обробки тварин не можна курити, вживати продукти харчування та пити воду. Після закінчення роботи слід ретельно вимити руки теплою водою з милом. Уникати попадання препарату на слизові оболонки. При потраплянні на шкіру або слизові оболонки препарат слід негайно змити проточною водою з милом, при потраплянні всередину – негайно звернутися до лікаря.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Не встановлені.

6.2 Термін придатності

3 роки.

6.3 Особливі заходи зберігання

Сухе темне недоступне для дітей місце за температури від 0 до 25 °С.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Полімерні піпетки по 0,9 мл запаковані у картонні коробки по 1, 3, 6, 12 або 72 шт.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат утилізують відповідно до чинного законодавства.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль (Франція)

Ceva Sante Animale (France)

10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн

10 avenue de la ballastiere, 33500 Libourne

8. Назва і місце знаходження виробників

Сева Санте Анімаль (Франція)

Ceva Sante Animale (France)

10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн

10 avenue de la ballastiere, 33500 Libourne

AB7 SANTE (Франція)

AB7 SANTE (France)

Чемін де Монж, 31450 Дейм

Chemin des Monges, 31450 Deyme

9. Додаткова інформація

14.02.2022

Вектра Феліс
(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин блідо-жовтого кольору.

Склад

0,9 мл препарату містять діючі речовини:

динотефуран - 423 мг,

пірипроксифен - 42,3 мг.

Допоміжні речовини: диметилсульфоксид.

Фармакологічні властивості

ATCvet QR53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти

Динотефуран – похідний гуанідину, належить до нейротоксинів класу неонікотиноїдів, діє на постсинаптичні ацетилхолінові рецептори нервової системи, спричиняючи загибель ектопаразитів.

Пірипроксифен – аналог ювенільного гормону, що регулює ріст і розвиток комах, у тому числі і бліх. Механізм його дії полягає в порушенні нормального циклу метаморфози комах: яйце - личинка - лялечка - імаго.

При нашкодженні, речовини, що входять до складу препарату, кумулюються в епідермісі, волосяних фолікулах і жирових залозах, що сприяє довготривалій контактній інсектоакарицидній і репелентній дії.

Застосування

Лікування котів при ураженні блохами (*Ctenocephalides felis*) на усіх фазах розвитку комах (яйце-личинка-лялечка-доросла комаха).

Препарат Вектра Феліс може застосовуватися у комплексній програмі лікування і профілактики алергічного дерматиту (FAD).


Дозування

Препарат Вектра Феліс застосовують зовнішньо шляхом точкового нанесення на суху неушкоджену шкіру в недоступному для злизування тваринам місці (між лопатками).


Одна піпетка розрахована для застосування одній тварині відповідно до рекомендованої мінімальної дози – 42,3 мг динотефурану/кг маси тіла тварини та 4,23 мг пірипроксифену/кг маси тіла тварини.

Спосіб застосування:

1. Виймають піпетку з упаковки.
2. Тримавши кришечкою догори, утримують піпетку пальцями нижче більшого диска.




3. Другою рукою натискають вниз на менший диск до притискання обох дисків. Таким чином проколюється захисна мембрана.



14.02.2022

4. Розгортають шерсть тварини так, щоб видно було шкіру і наносять препарат, обережно стискаючи стінки піпетки. Тварина повинна знаходитись у зручному положенні для нанесення препарату. Уникати потрапляння препарату на шерсть тварини.



Одноразова обробка тварини препаратом Вектра Феліс попереджає ураження блохами щонайменше впродовж одного місяця. Повторну обробку рекомендують проводити через 30 діб. При сильному ураженні блохами за рекомендацією лікаря ветеринарної медицини обробку можна повторити через 2 тижні.

Протипоказання

Не застосовують препарат Вектра Феліс кошенятам віком до 7 тижнів і масою тіла до 0,6 кг, при індивідуальній гіперчутливості до компонентів препарату.

З ОБЕРЕЖНІСТЮ застосовують ослабленим, хворим і вагітним тваринам після консультації з лікарем ветеринарної медицини.

Застереження

Уникати попадання препарату в очі та на слизові оболонки. Не наносити препарат на вологу або ушкоджену шкіру. Не рекомендують купати тварин впродовж 48 годин після обробки препаратом.

Якщо у приміщенні утримують декількох котів, то їх необхідно обробляти препаратом одночасно.

Для профілактики ураження тварин блохами необхідно утримувати місця перебування тварин у чистоті і періодично (через кожні два тижні в теплу пору року) обробляти їх інсектицидними препаратами (напр. Неостомазаном).

Форма випуску

Полімерні піпетки по 0,9 мл заповнені у картонні коробки по 1, 3, 6, 12 або 72 шт.

Зберігання

Сухе темне недоступне для дітей місце за температури від 0 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль (Франція)
10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн

Ceva Sante Animale (France)
10 avenue de la ballastiere, 33500 Libourne

Виробники готового продукту


Сева Санте Анімаль (Франція)
10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн

Ceva Sante Animale (France)
10 avenue de la ballastiere, 33500 Libourne

AB7 САНТЕ (Франція)
Чемін де Монж, 31450 Дейм

AB7 SANTE (France)
Chemin des Monges, 31450 Deyme

14.02.2022



Standard Tube Template


Albea 00188ABL
12.7 mm diameter

October 2019

MG 00474281-001-000
12.7mm x 39.29mm FPL

PIP VECTRA FELIS 0.6-10KG 3P EN UA	VECTRA FELIS 0.6-10KG 3P EN UA
45x39.29	ID51232
CODE ARTICLE : 5127402	
Black	CORPS : 9 pcs
	MYRIAM 0505202 (2)

14.02.2022



VERSO

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не дозволяється застосовувати препарат кошеням вагом до 7 тижнів і масою тіла менше 0,6 кг (kg).

ЗАСТЕРЕЖЕНИЯ

під час обробки виарин препаратом забороняється палити, вживати продукти харчування та пити воду. Після закінчення роботи слід ретельно вмити руки теплою водою з милом. Не дозволяється палити виарин чи допускати до невеличких дітей протягом 48 годин після обробки препаратом.

CONTRAINDICATIONS

CONTRAINDICATIONS
Do not use in case of hypersensitivity to the active substances or to any of the excipients. Do not use in cats up to 7 weeks of age and weighing less than 0.6 kg.

SPECIAL WARNINGS

Do not smoke, eat or drink when handling the product. Wash hands thoroughly and immediately after use. Treated animals must not be pet by young children within 48 hours after treatment.