

10.03.2025

**Бровальзен емульсія**  
(емульсія для перорального застосування)  
листівка-вкладка

**Опис**

Емульсія білого або світло-сірого кольору, зі слабким специфічним запахом.

**Склад**

1 мл препарату містить діючу речовину:

альбендазол — 75,0 мг.

Допоміжні речовини: тилоза, твін-80, арквад 50, вода високоочищена.

**Фармакологічні властивості**

АТСvet класифікаційний код: QP52 — антигельмінтні ветеринарні препарати, QP52AC11 — альбендазол.

Альбендазол — антигельмінтик широкого спектра дії з групи бензimidазолів. Ефективний проти статевозрілих трематод *Fasciola hepatica* і *Dicrocoelium lanceatum*; нематод, які паразитують у травному каналі та легенях, — *Bunostomum* spp., *Cooperia* spp., *Dictyocaulidae* spp., *Haemonchus* spp., *Nematodirus* spp., *Ostertagia* spp., *Strongyloides* spp., *Trichostrongylus* spp., *Trichuris* spp. тощо, деяких видів цестод — *Avitellina centripunctata*, *Moniezia expansa*, *M. benedebia*, *Thysaniezia giardi*. Гальмує білковий синтез, у результаті порушується надходження і внутрішньоклітинне транспортування поживних речовин, обмін субстратів речовин (аденозинтрифосфornoї кислоти і глюкози), через гальмування фумаратредуктази знижуються мітохондріальні реакції, що спричиняє загибель паразитів.

Альбендазол погано всмоктується при прийомі всередину. Максимальна концентрація в крові досягається протягом 2-5 годин. Високі концентрації створюються в сечі, жовчі, спинномозковій рідині, печінці. Добре проникає через гематоенцефалічний бар'єр, проникає через плацентарний бар'єр і виводиться з молоком. Метаболізується в печінці з утворенням активних метаболітів (альбендазолу сульфоксиду та альбендазолу сульфону). Альбендазол та його метаболіти виводяться з організму переважно з жовчю, частково — з сечею. Період напіввиведення становить в середньому 8,5 годин. При порушенні функцій печінки цей час може збільшуватись.

**Застосування**

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, коней при ураженні нематодами, цестодами, трематодами:

**велика рогата худоба:**

- нематодами травного каналу і дихальних шляхів: *Haemonchus placei*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum* spp., *Trichostrongylus* spp., *Ostertagia* spp., *Cooperia oncophora*, *Chabertia* spp., *Neascaris vitulorum*, *Strongyloides papillosus*, *Dictyocaulus viviparus*, *Muellerius* spp., *Protostrongylus* spp., *Nematodirus* spp., *Trichuris* spp.;

- цестодами преімагінальні та імагінальні: *Moniezia* spp., *Thysaniezia giardi*;

- трематодами печінки: *Fasciola hepatica* (статевозрілі), *Dicrocoelium lanceatum*.

**вівці, кози:**

- нематодами травного каналу і дихальних шляхів: *Haemonchus contortus*, *Bunostomum trigonocephalum*, *Oesophagostomum* spp., *Trichostrongylus* spp., *Ostertagia* spp., *Cooperia oncophora*, *Skrjabinema ovis*, *Chabertia ovina*, *Nematodirus* spp., *Strongyloides papillosus*, *Dictyocaulus filaria*, *Muellerius capillaris*, *Protostrongylus* spp., *Trichuris* spp.;

- цестодами преімагінальні та імагінальні: *Moniezia* spp., *Avitellina centripunctata*, *Thysaniezia giardi*;

- трематодами печінки: *Fasciola hepatica* (статевозрілі), *Dicrocoelium lanceatum*.

**коні:**

- нематодами травного тракту і дихальних шляхів: *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Strongylus* spp., *Cyathostomum* spp., *Cylicocycclus* spp., *Cylicodontophorus* spp., *Cylicostephanus* spp., *Strongyloides westeri*, *Dictyocaulus arnfieldi*;

- цестодами преімагінальні та імагінальні: *Anoplocephala magna*, *Anoplocephala perfoliata*, *Paranoplocephala tamillana*.

10.03.2025

### Дозування

Перед застосуванням препарат ретельно збовтують й додають у воду або корм. Лікувальну суміш дають на початку ранкової годівлі індивідуально або груповим методом, одноразово.

Жуйним тваринам суміш примусово випоюють із гумової або пластикової пляшки, в яку попередньо додають дві третини теплої води, препарат і збовтують. Іншим видам тварин дозу препарату змішують із вологим кормом або додають до третини добової норми води й випоюють груповим методом.

Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.

| Види тварин              | Види гельмінтів   | Доза,<br>мл/10 кг маси тіла |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Велика рогата худоба     | нематоди, цестоди | 1,0                         |
|                          | трематоди         | 1,3-2,0                     |
| Вівці, кози              | нематоди, цестоди | 0,7                         |
|                          | трематоди         | 1,0                         |
| Коні та інші однокопитні | нематоди, цестоди | 0,7                         |

При захворюванні жуйних тварин на фасціольоз препарат використовують у будь-яку пору року. Враховуючи, що альбендазол малоефективний проти личинок фасціол, першу профілактичну дегельмінтизацію проводять через 2-2,5 місяці після закінчення пасовищного періоду, а повторну — не пізніше ніж за 10-15 діб до вигону тварин на пасовище.

### Протипоказання

Не застосовувати самкам у першій третині вагітності, вівцематкам у період парування та протягом одного місяця після виведення баранів із отари.

Не застосовувати коням, м'ясо яких призначено для споживання людьми.

### Застереження

#### Побічна дія

При використанні у терапевтичних дозах препарат не спричиняє побічних ефектів. Індекс безпечності альбендазолу становить 8.

#### Особливі застереження при використанні

При гострому фасціольозі застосовувати препарат недоцільно.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не відомі.

#### Період виведення (каренції)

Після останнього застосування препарату забій великої рогатої худоби, овець, кіз на м'ясо дозволяється через 14 діб. Людям вживати в їжу молоко корів можна через 4 доби. М'ясо та молоко, отримані раніше вказаного терміну, утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

### Форма випуску

Скляні або полімерні флакони по 50, 100, 1000 мл.

### Зберігання

У сухому темному, недоступному для дітей місці за температури не вище 25 °С.

### Термін придатності

3 роки.

### Для застосування у ветеринарній медицині!

#### Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

#### Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна