



**АСД-2У
(розчин)**
листівка-вкладка

Склад

Препарат містить гідрофільну фракцію продуктів піролізу м'ясо-кісткового борошна, до складу якої входять: низькомолекулярні органічні сполуки, включаючи нижчі карбонові кислоти; їх амідні та амонійні солі, холінові ефіри карбонових кислот, холін, первинні та вторинні аміни, пептиди, а також солі амонію вуглекислого та амонію оцтовокислого, вода.

Фармацевтична форма

Розчин для перорального застосування

Рідина від жовтого до червоно-коричневого кольору зі специфічним запахом, може містити осад від сірого до чорного кольору.

Фармакологічні властивості

Препарат містить продукти піролізу м'ясо-кісткового борошна. Даний комплекс органічних сполук і обумовлює протизапальний та імуномодуючий ефект препарату.

АСД-2У впливає на ендокринну, імунну, вегетативну нервову систему. Активний вплив на імунну систему значно підвищує імунітет, що дозволяє організму самому боротися з багатьма захворюваннями шкіри: екземами, грибковими ураженнями, дерматитами, трофічними виразками; кон'юнктивітами, отитами; запаленням лімфатичних вузлів, ендокринних залоз, слизових оболонок сечостатевої шляхів; атонією шлунку, випадінням шерсті та ін.

Препарат має нейротропну холіноміметичну дію на центральну та вегетативну нервову систему; стимулює моторну функцію шлунково-кишкового тракту, секрецію травних залоз та активність травних ферментів, покращує процеси травлення та засвоєння поживних речовин, підвищує активність тканинних ферментів, які беруть активну участь у транспорті іонів та поживних речовин через клітинні мембрани, у процесах фосфорилування, синтезу білкових речовин. Внаслідок такої дії АСД-2У покращує трофіку тканин, нормалізує обмінні процеси при різних дистрофічних станах.

Препарат має антисептичну дію. Він практично нетоксичний.

Вид тварин

Велика рогата худоба, коні, вівці, кози, свині, собаки, кролі, кури.

Показання до застосування

Призначають сільськогосподарським тваринам (у тому числі птиці) та собакам, з лікувальною та профілактичною метою за розвитку хвороб шлунково-кишкового тракту, органів дихання, сечостатевої системи, ураженнях шкірних покривів, порушеннях обміну речовин, для стимуляції діяльності центральної та вегетативної нервової системи, підвищення природної резистентності. У ослаблених і перехворілих на інфекційні та інвазійні хвороби тварин, а також для стимуляції росту та розвитку поросят, курчат і підвищення несучості курей.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Підвищений артеріальний тиск, серцево-судинні захворювання.

Застереження при застосуванні

У окремих особин може спостерігатися непереносимість препарату. З цієї причини бажано уважно стежити за станом тварин під час курсу лікування. У разі погіршення стану слід перервати курс до виявлення причин.

Взаємодія з іншими засобами

Добре поєднується в комплексі з іншими лікувальними препаратами: протимікробними засобами, зокрема з антибіотиками групи аміноглікозидів, нітрофуранів, препаратами бурштинової кислоти, бентонітом, розчином новокаїну. Не використовувати одночасно із серцево-судинними препаратами, що містять ізосорбід динітрат.

Особливі вказівки при вагітності, лактації, несучості

Не застосовувати вагітним тваринам.

Спосіб застосування та дози

Дозування всередину препарат АСД-2У призначають тваринам з питною водою перед годуванням або в суміші з комбікормом під час ранкового годування.

Зовнішньо АСД-2У застосовують у вигляді 2-20% розчинів, приготованих на стерильному фізіологічному розчині або кип'яченій воді. Для приготування лікувального розчину необхідної концентрації, вихідний стерильний розчин приймають за 100%. Лікувальний розчин готують в асептичних умовах.

За диспепсії, гастроентероколітів, гастроентеритів, а також дистрофічних станів, спричинених розладами травлення та порушеннями обміну речовин, препарат призначають внутрішньо один раз на добу, у разових дозах, зазначених нижче. Лікування проводять курсами по 5 днів з інтервалом 2-3 дні до одужання тварини.

За розвитку тимпанії великої рогатої худоби препарат випоюють тварині або вводять в рубець через шлунковий зонд, один-два рази на добу в разовій дозі, зазначеній нижче. В процесі лікування призначають теплі клізми, масаж рубця та інші процедури, рекомендовані за зазначеної патології.

У разі метеоризму кишечника у коней препарат випоюють тваринам або вводять через шлунковий зонд одноразово в дозах, зазначених нижче. В процесі лікування призначають теплі клізми, масаж живота та інші процедури, рекомендовані за зазначеної патології. За необхідності лікування повторюють.

За катаральної пневмонії поросят поряд з етіотропним лікуванням препарат призначають один раз на день з питною водою за 30-40 хвилин до годування або під час ранкового годування з комбікормом у дозах, зазначених нижче. Лікування проводять до одужання курсами по 5 днів з інтервалом 2-3 дні.

За розвитку вагітності і затримці посліду у корів (після його видалення) застосовують 3-5% розчин препарату, підігрітий до 40°C, яким промивають піхву



один раз на добу протягом 4-5 днів, витрачаючи по 1,5-2 л розчину на кожну обробку. Якщо шийка матки відкрита, то 200-300 мл розчину вводять в матку. За гострих і хронічних ендометритів, міометритів чи піометри у корів, якщо шийка матки відкрита, в порожнину матки вводять 15% розчин препарату, підігрітий до 40°C в кількості 200-300 мл і відразу ж його видаляють. З цієї метою використовують катетер зі зворотним струмом рідини. Обробку проводять один раз на добу до одужання.

З метою стимуляції центральної та вегетативної нервової системи, підвищення резистентності у перехворілих інфекційними та інвазійними хворобами тварин, прискорення процесів загоєння шкірних покривів, за некробактеріозу, екзем, дерматитів, розвитку трофічних виразок препарат застосовують з питною водою або в суміші з кормом один раз на добу в дозах, зазначених нижче. Лікування проводять до одужання курсами по 5 днів з інтервалом 3 дні.

З метою стимуляції росту і розвитку телят, поросят і курчат, препарат застосовують способом групового згодовування з розрахунку 0,1 мл АСД-2У на 1 кг маси тіла через день протягом 1-2 місяців.

Інфіковані рани, що мляво загоюються промивають 15-20% розчином препарату і після цього накладають змочену цим розчином пов'язку. Лікування проводять один раз на добу до очищення рани від гною. За наявності нориць, розкритих порожнин абсцесів, флегмон, в їх порожнину вводять марлеві дренажі, змочені розчином препарату і зверху накладають стерильну пов'язку. Дренаж змінюють щодня до утворення грануляційного валу.

Дозування

Денна норма:

для великої рогатої худоби:

- молодняку до року - 5-7 мл на 0,4-1 л питної води;
- коровам у віці 1-3 роки - 10-15 мл / 1-4 л;
- тварини старше 3 років - 20-30 мл / 2-4 л.

для коней:

- лошатам до 1 року - 5 мл на 1 л питної води;
- 1-3 роки - 10-15 мл / 2-4 л;
- старше 3 років - 20 мл / 6 л.

для овець і кіз:

- у віці до півроку - 0,5-2 мл на 10-40 мл питної води;
- до 1 року - 1-3 мл / 20-80 мл;
- від 1 року - 2-5 мл / 0,4-1 л.

для свиней дають тільки з 3-го місяця життя:

- до 6 міс. - 1-3 мл на 20-80 мл питної води;
- до 1 року - 2-5 мл / 0,4-1 л;
- після 1 року - 5-10 мл / 1-2 л.

для домашньої птиці:

- молодняк - 0,1 мл води на 1 кг маси;
- дорослі особини - розчин в співвідношенні 35 мл / 100 л води або ж 100 кг корму.

Для собак

від 10 місяців – 2 мл на 40 мл питної води.

Для прийому всередину собакам дають розчин препарату 5 днів поспіль, потім 2 дні перерва, потім схему повторюють.

Для кролів

2 мл на 100 мл питної води.

Побічні ефекти

Алергічні реакції: застосовують антигістамінні лікарські засоби.

Період виведення (каренції)

Молоко дійних тварин, яйце птиці, м'ясо тварин після застосування препарату використовується без обмежень.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ветеринарний імунобіологічний препарат (ВІП)

Препарат відноситься до помірно небезпечних речовин. При роботі з препаратом слід користуватися гумовими рукавичками. Після закінчення роботи обличчя і руки слід вимити теплою водою, вимити і просушити рукавички.

Порожні ємності з-під препарату забороняється використовувати для побутових цілей, їх викидають в контейнери для сміття. У разі випадкового застосування препарату людині та послідуєчого прояву побічних ефектів негайно звернутися до лікаря та пред'явити йому маркування чи листівку-вкладку цього препарату

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Знешкоджують способом, передбаченим чинними державними нормативними документами щодо медичних та побутових відходів.

Термін придатності

4 роки. Після першого відкриття первинного упакування використати протягом 14 діб.

Умови зберігання і транспортування

Препарат зберігають у темному місці за температури від 2 °C до 25 °C; не заморожувати.

Упаковка

Флакони з темного скла, закупорені гумовими пробками і закатані алюмінієвими ковпачками по 10 мл, 50 мл або 100 мл, вкладені в коробку.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпоча», вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка, Бучанський

р-н., Київська обл., 08030, Україна. www.ukrzoovet.com.ua

Правила відпуску

Без рецепту.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії препарату негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98, №2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.

Тільки для ветеринарної медицини!

