

12.07.2021

Брованол Д
(таблетки)
листівка-вкладка

Опис

Таблетки двоопуклої продовгуватої форми з насічкою для поділу на одній стороні та логотипом виробника – на іншій, жовтуватого кольору зі слабким характерним запахом.

Склад

1 таблетка (0,5 г) містить діючі речовини:

ніклозамід – 230 мг;

оксибендазол – 30 мг;

левамізолу гідрохлорид – 40 мг.

Допоміжні речовини: лактоза, глюкоза, крохмаль картопляний, орісіл, кроскармелоза натрію, кальцію стеарат.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AE01, левамізол).

Препарат має сукупні фармакологічні властивості трьох компонентів, які забезпечують широкий спектр протипаразитарної дії проти цестод і нематод, а саме:

-ніклозамід – синтетичний протигельмінтний препарат, який є похідним саліцилової кислоти, активний відносно кишкових цестод; порушує процеси окисного фосфорилування, що призводить до переривання анаеробного гліколізу в організмі стовжкових гельмінтів, в результаті чого останні втрачають рухливість, гинуть і перетравлюються в кишечнику;

-оксибендазол є похідним бензimidазолу, володіє широким антигельмінтним спектром дії проти нематод і цестод. Механізм дії полягає в блокуванні фумаратредуктази і порушенні енергетичного метаболізму у гельмінта, що спричиняє параліч і загибель паразитів на всіх стадіях розвитку через кілька годин після введення;

-левамізолу гідрохлорид – синтетичний протигельмінтний препарат та імуностимулятор, що є похідним імідазотіазолу, вузького спектру дії. Антигельмінтна дія препарату зумовлена блокадою ферменту сукцинатдегідрогенази, що викликає порушення енергетичного обміну в паразитів та деполаризацію мембран м'язових клітин гельмінтів. До левамізолу чутливі виключно деякі нематоди.

Ніклозамід при пероральному застосуванні справляє дію в порожнинах тонкого і товстого кишечника. Не піддається метаболізму. Період напіввиведення становить 2,5-5 годин. Елімінація з фекаліями.

Поглинений оксибендазол розщеплюється в печінці до метаболітів без глистогінної активності.

Левамізол добре всмоктується при прийомі всередину. Максимальна концентрація в крові досягається протягом 1,5-2 годин. Виділяється в молоко корів. Метаболізується препарат в печінці з утворенням неактивних метаболітів. Виводиться левамізол з організму переважно нирками (95%), а також частково з калом в незміненому вигляді. Період напіввиведення препарату складає 3-4 годин.

Застосування

Лікування і профілактика гельмінтозів у собак, котів та декоративної птиці при змішаних інвазіях, спричинених:

у собак і котів: личинками та дорослими гельмінтами травного тракту: анкілостомоз (*Ancylostoma caninum*), дипілідіоз (*Dipylidium caninum*), дифілоботріоз (*Diphyllbothrium latum*, *D. minus*), токсокароз (*Toxocara canis*, *T. cati*), токскарідоз (*Toxascaris leonina*), трікурроз (*Trichuris vulpis* та *T. nutria*), теніози (*Taenia hydatigena*, *T. multiceps*);

у декоративної птиці: аскаридіоз (*Ascaridia galli*, *A. dissimilis*, *A. columbae*), капіляріоз (*Capillaria anseris*, *C. anatis*, *C. contorta*), сингамоз (*Syngamus trachea*), стрептокароз (*Streptocara crassicauda*), гіменолепідози (*Hymenolepis gracilis*, *H. paracompressa*, *Fimbriaria fasciolaris*), тетрамероз (*Tetrameres fissispina*).

12.07.2021

Дозування

Собакам і котам – задають одноразово в подрібненому вигляді з кормом або примусово на корінь язика.

Маса тварини:	Кількість препарату:
до 2 кг	1/4 таблетки
2-5 кг	1/2 таблетки
5-10 кг	1 таблетка
10-20 кг	2 таблетки
20-30 кг	3 таблетки
30-40 кг	4 таблетки
40-50 кг	5 таблеток

Декоративним птахам родини курячих – 1 таблетка на 10 кг маси тіла щоденно три доби поспіль у суміші з комбікормом; **родини гусячих і качиних** – (добова доза) 1 таблетка на 2 кг маси тіла дві доби поспіль, у суміші з кормом.

Протипоказання

Не використовувати для лікування домашньої птиці, продукція якої може використовуватися для споживання людьми!

Не застосовувати тваринам при атонії кишечника!

Застереження

Не перевищувати рекомендованих доз. У незначній частини тварин при сильній інвазії можливі ускладнення внаслідок інтоксикації (перетравлення мертвих гельмінтів): кропивниця і свербіж у ділянці прямої кишки, занепокоєння, діарея, блювота. Всі ці ознаки швидко зникають без спеціального втручання.

Форма випуску

Блістери по 10 таблеток, по 1, 2 або 3 блістера в картонній коробці; контейнери з полімерних матеріалів по 20, 50 або 100 таблеток.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту:

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИЙ № 1