

АНТИ СТРЕС valeriana

(краплі для перорального застосування, розчин)

листівка-вкладка

Опис

Рідина коричневого кольору зі специфічним запахом складників, допускається осад.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

фенібут - 100 мг.

Допоміжні речовини: валеріани кореневища екстракт сухий, м'яти екстракт сухий, кропиви собачої екстракт сухий, хмелю шишок екстракт сухий, ялівцю екстракт сухий, натрію бензоат, сукралоза, гліцерин, вода очищена.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код: QN06BX Інші ветеринарні препарати, які виявляють психостимулювальну і ноотропну дії. QN06BX22 Фенібут.

Фенібут є фенільним похідним гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК) і фенілетиламіну — аміно-фенілмасляної кислоти гідрохлорид. Посилюючи гальмівні ГАМК-ергічні процеси, він впливає на функціональний стан завдяки нормалізації метаболізму та впливу на мозковий кровообіг шляхом збільшення швидкості кровотоку і зменшення тону судин. Має виражену стрес-корегуючу дію, забезпечує нормалізацію процесів збудження і гальмування в центральній нервовій системі. Фенібут застосовують і для профілактики кінетозу (синдрому захитування).

Комплекс екстрактів лікарської рослинної сировини підсилює заспокійливу дію препарату, сприяє зменшенню надмірного напруження, страху, покращенню відновлювальних та адаптивних процесів, підвищенню стійкості до впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Препарат за ступенем впливу на організм відноситься до малонебезпечних речовин, у рекомендованих дозах не чинить мутагенної, канцерогенної та сенсibilізуючої дій.

Застосування

Препарат застосовують котам та собакам для зниження збудження і корекції психогенних порушень поведінки при стресах, фобіях, агресії без видимих причин та за підвищеного статевго збудження (одночасно із контрацептивними засобами).

Препарат застосовують задля покращення відновних і адаптивних процесів організму тварин, підвищення стійкості до впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Застосовують також для профілактики кінетозу (синдрому захитування).

Дозування

Застосовують котам і собакам перорально примусово на корінь язика, в защічний мішок або з невеликою кількістю ласощів, з урахуванням маси тіла, нервового стану та ступеню збудження тварини, у добових дозах:

коти (дорослі тварини та кошенята) - 1 крапля (0,05 мл) препарату (що еквівалентно 5 мг фенібуту) на 1 кг маси тіла тварини;

собаки (дорослі тварини) - 2 краплі (0,1 мл) препарату (що еквівалентно 10 мг фенібуту) на 1 кг маси тіла тварини;

цуценята - 1 крапля (0,05 мл) препарату (що еквівалентно 5 мг фенібуту) на 1 кг маси тіла тварини.

Добову дозу препарату ділять на два прийоми і задають тварині вранці та ввечері.

Курс застосування препарату становить 15-20 діб.

За ознак надмірного збудження, психогенних порушень поведінки (агресія, страх, гіперактивність, надмірна вокалізація (гавкіт, нявкання), підвищення статевої активності, мічення приміщення сечею курс лікування може бути продовжений до 4-х тижнів.

При повторних проявах у тварин порушення поведінки курс застосування препарату повторюють у тих же дозах по тій же схемі.

З метою профілактики стресів (транспортування, прихід гостей, зміна обстановки, від'їзд господаря,

інтенсивне дресирування, участь у виставках і змаганнях) препарат застосовують за 3-5 діб до передбачуваного заходу і протягом 1-4 діб після його закінчення.

Для профілактики захитування призначають одноразово в вищевказаних дозах за 1-2 години до передбачуваного початку транспортування тварини. За наявності виражених проявів захитування (блювота) прийом препарату малоефективний.

Для корекції поведінки при підвищеній статевій активності препарат застосовують в тих же дозах разом із контрацептивними засобами. Тривалість курсу лікування залежить від індивідуальної чутливості тварин і ступеня її збудження.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість тварини до компонентів препарату (у тому числі в анамнезі).

Не застосовувати тваринам із розладами сечостатевої системи, за онкологічних захворювань та при діабеті.

Не застосовувати препарат вагітним і лактуючим самицям.

Застереження

Побічна дія

У рідких випадках при першому прийомі препарату у тварини може спостерігатися сонливість або збудження, дратівливість, нудота, алергічні реакції. Застосування препарату припиняють і призначають симптоматичну та десенсибілізуючу терапію.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

За одночасного застосування із транквілізаторами, нейролептиками та протисудомними засобами препарат підсилює і пролонгує дію останніх.

Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

У рідких випадках у окремих тварин можливі сонливість або збудження, дратівливість, нудота, алергічні реакції. У таких випадках застосування препарату припиняють і призначають симптоматичну і десенсибілізуючу терапію. Слід дотримуватися рекомендованих доз.

Форма випуску

Флакони полімерні або скляні по 10 або 15 мл, вкладені у картонні пачки із шприцем-дозатором.

Зберігання

Суше темне, недоступне для дітей, місце за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності — 2 роки.

Після першого відбору з флакону препарат необхідно використати протягом 30 діб, за умови зберігання в темному місці за температури від 5 до 10 °С

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ветсинтез»

61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Телефон: +38 (057) 757-84-71

Факс: +38 (057) 714-37-51

E-mail: info@vetsintez.com