

12.03.2022

Брованол-С
(суспензія для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Суспензія світло-жовтого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини:

празиквантел - 15 мг,

пірантелу памоат - 45 мг.

Допоміжні речовини: твін-80, гліцерин, тилоза, аспартам, натрію бензоат, арквад-50, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP52A, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51 празиквантел, комбінації).

Комбінований антигельмінтний препарат широкого спектра дії на круглих та стрічкових гельмінтів на всіх фазах розвитку, що паразитують у собак і котів - *Toxocara canis*, *Toxocara mystax*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria spp.*, *Trichuris vulpis*, *Ancylostoma spp.*, *Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*, *Mesocystoides lineatus*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllobotrium latum*, *Multiceps multiceps*, *Taenia spp.*

Празиквантел - синтетична сполука, похідна хіноліну. Механізм дії базується на порушенні проникності клітинних мембран гельмінтів для іонів кальцію, що призводить до пригнічення метаболізму глюкози, руйнування клітинних оболонок у паразитів та їх швидкого паралічу. Це спричиняє загибель паразитів та їх виведення зі шлунково-кишкового тракту.

Празиквантел добре всмоктується в ШКТ та досягає максимальної концентрації в плазмі крові через 1-3 години, його біодоступність становить близько 80%. Розподіляється по органах і тканинах організму та зв'язується з білками крові на 70-80%. Метаболізується в печінці з утворенням неактивних метаболітів, виводиться з організму з сечею, незначна кількість - з калом. Період напіввиведення становить близько 1,5 годин.

Пірантелу памоат - похідна сполука тетрагідропіримідину. Активний проти нематод всіх форм розвитку. Блокує передачу нервових імпульсів у нервово-м'язових синапсах шляхом деполаризації мембран м'язових клітин, завдяки чому спричиняє параліч м'язової системи нематод.

Пірантелу памоат майже не всмоктується з кишечника, через що його антигельмінтна дія пролонгується. Виводиться з організму переважно у незміненому вигляді (до 93%) з калом.

Застосування

Профілактика та лікування собак і котів при нематодозах (токсокарозах, токскарідозах, унцинаріозах, трихоцефальозах, анкілостомозах), цестодозах (теніїдозах, діпілідіозах, ехінококозах, діфілоботріозах, мезоцестодозах) та змішаних нематодозно-цестодозних інвазіях.

Дозування

Перед застосуванням суспензію збовтують і дають до початку ранкової годівлі індивідуально, одноразово, з невеликою кількістю корму або примусово на корінь язика за допомогою мірної мензурки, шприца без голки або шприц-туби..

Доза становить 1 мл на 2 кг маси тіла, для малих тварин - 0,33 мл (14-15 крапель) на 1 кг маси тіла. При сильній інвазії дегельмінтизацію рекомендується повторити через 10 діб.

Профілактичну дегельмінтизацію проводять щокварталу, а також за 12-14 діб перед щепленням.

Застосовувати голодну дієту або послаблюючі засоби перед введенням препарату не потрібно.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до діючих речовин препарату, самкам в першу половину вагітності та протягом двох тижнів після родів, цуценят та кошенят віком до 3 тижнів, виснаженим тваринам та тваринам з інфекційними захворюваннями.

Застереження

Препарат застосовують відповідно до листівки-вкладки.

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1

12.03.2022

У деяких тварин при сильній інвазії можливі ускладнення через інтоксикацію під час перетравлення загиблих гельмінтів — кропивниця, свербіння в області анусу, занепокоєння, діареї, іноді блювання. Ці симптоми зникають без спеціального лікування.

Форма випуску

Шприц-туби з дозатором, скляні або полімерні флакони (у комплекті зі шприцом) по 5,0; 10,0 та 15,0 г.

Зберігання

Сухе, темне, недоступне для дітей місце, окремо від харчових продуктів і кормів за температури від 4 °С до 25 °С.

Після відкриття флакона препарат зберігати у холодильнику.

Термін придатності

2 роки.

Термін придатності після першого відкриття (відбору) - 30 діб.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ «БРОВАФАРМА», б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна.

Виробник готового продукту:

ТОВ «БРОВАФАРМА», б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна.

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1