

11.07.2025

Бронтел 10%
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Розчин світло-жовтого або світло-коричневого кольору, прозорий.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину (мг):

клозантел — 100,0.

Допоміжні речовини: пропіленгліколь, полівінілпіролідон, новокаїну гідрохлорид, натрію гідроксид, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код: QP52 — антигельмінтні ветеринарні препарати. (QP52AG09 — Клозантел).

Клозантел — синтетичний засіб, похідний з групи саліціланіду. Його специфічна протипаразитарна дія спричиняє гальмування і зупинку процесу фосфорилювання і переносу електронів, що змінює енергетичний метаболізм паразитів з послідуною їх загибеллю. Клозантел володіє широким спектром протипаразитарної дії, активний до трематод, нематод, кліщів, вошей, овечого рунця і личинок оводів.

За внутрішньом'язового введення швидко всмоктується і проникає в органи і тканини організму. Максимальна концентрація препарату в крові досягається через 12 годин після введення і зберігається протягом 24-36 годин, а терапевтична концентрація - впродовж 10-11 діб. Клозантел не біотрансформується в організмі і виділяється переважно в незміненому вигляді з екскрементами, а у лактуючих корів — частково з молоком.

Застосування

- . Профілактика та лікування великої рогатої худоби та овець, при ураженні:

- велика рогата худоба - нематодами травного каналу - *Bunostomum spp.*, *Haemonchus placei*, *Oesophagostomum spp.*, *Strongyloides papillosus*; трематодами (статевозрілі, молоді трематооди віком понад 6 тижнів, личинки 1 та 2 стадії) *Fasciola spp.*; личинками підшкірного оводу - *Hypoderma spp.*; саркоптоїдозними кліщами - *Sarcoptes bovis*, *Psoroptes bovis*, *Chorioptes bovis*; тромбідіформними кліщами *Demodex bovis*; личинками м'ясної мухи (*Sarcophagidae*, *Calliphoridae*).

- вівці - нематодами травного каналу *Bunostomum spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Ostertagia circumcincta*, *Haemonchus contortus*, *Nematodirus spathiger*, *Chabertia ovina*, трематодами (статевозрілі, молоді трематооди віком понад 6 тижнів) *Fasciola spp.*; личинками порожнинного овода - *Oestrus ovis*; саркоптоїдозними кліщами *Psoroptes ovis*, *Chorioptes ovis*, *Sarcoptes ovis*; тромбідіформними кліщами *Demodex ovis*; личинками вольфартової мухи - *Wohlfahrtia spp.*

Дозування

Обробку проти гельмінтозів здійснюють на початку та наприкінці стійлового періоду, проти гіподерматозу — відразу після закінчення льоту гедзів або при виявленні жовен навесні.

Препарат вводять підшкірно, великій рогатій худобі допускається внутрішньом'язове введення. Ін'єкції більше як 3 мл ділять на дві частини і вводять у різні місця.

Перед груповою дегельмінтизацією кожну партію препарату попередньо перевіряють на невеликій кількості тварин, за якими спостерігають протягом доби. За відсутності ускладнень препарат використовують всьому поголів'ю.

Препарат вводять одноразово у таких дозах:

11.07.2025

Вид тварин і захворювання	Добова доза, мл/10 кг маси тіла	Курс застосування
Велика рогата худоба. Нематодози травного каналу - <i>Bunostomum</i> spp., <i>Haemonchus placei</i> , <i>Oesophagostomum</i> spp., <i>Strongyloides papillosus</i> .	0,25	одноразово
Трематодози - <i>Fasciola</i> spp. (статевозрілі).	0,25	одноразово
Трематодози - <i>Fasciola</i> spp. (статевозрілі та молоді трематоди віком понад 6 тижнів). Личинки підшкірного оводу - <i>Hypoderma</i> spp. (личинки 1 та 2 стадії).	0,5	одноразово
Кліщі <i>Sarcoptes bovis</i> , <i>Psoroptes bovis</i> , <i>Chorioptes bovis</i> , <i>Demodex bovis</i> .	1,0	2 рази через 7 діб.
Личинки м'ясної мухи (<i>Sarcophagidae</i> , <i>Calliphoridae</i>).	0,25	одноразово
Вівці. Нематодози травного каналу - <i>Bunostomum</i> spp., <i>Oesophagostomum</i> spp., <i>Trichostrongylus</i> spp., <i>Ostertagia circumcincta</i> , <i>Haemonchus contortus</i> , <i>Nematodirus spathiger</i> , <i>Chabertia ovina</i> .	0,25	одноразово
Трематодози - <i>Fasciola</i> spp. (статевозрілі та молоді трематоди віком понад 6 тижнів).	0,5	одноразово
Личинки овода - <i>Oestrus ovis</i> ; личинки мух - <i>Wohlfahrtia</i> spp.	0,25	одноразово
Кліщі - <i>Demodex ovis</i> , <i>Sarcoptes</i> spp., <i>Psoroptes ovis</i> , <i>Chorioptes</i> spp.	1,0	2 рази через 7 діб

Протипоказання

Не призначати ослабленим, виснаженим і хворим на інфекційні захворювання тваринам.

Застереження

Побічна дія

В окремих випадках на місці введення препарату виникає незначна припухлість, яка зникає через 2-3 доби без лікування.

У тварин, чутливих до компонентів препарату, можливі алергічні реакції (висипи на шкірі, свербіж, набряки). **За виникнення** таких ускладнень застосування препарату припиняють і призначають десенсибілізуючу терапію.

Особливі застереження при використанні

Особливо чутливі до препарату деякі породи великої рогатої худоби (шароле та її гібриди) — приблизно у 2% тварин виникають анафілактичні реакції.

Використання під час вагітності та лактації

Не застосовувати в останню третину вагітності та у період лактації.

11.07.2025

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з фосфорорганічними і хлорорганічними засобами!

Період виведення (каренції)

Після останнього застосування препарату забій тварин на м'ясо дозволяється через 28 діб, людям вживати в їжу молоко корів можна через 14 діб. М'ясо, отримане раніше вказаного терміну, використовують для годування м'ясоїдних тварин і виготовлення м'ясо-кісткового борошна залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини, молоко — випоюють непродуктивним тваринам.

Форма випуску

Скляні флакони по 10, 100, 200, 250 мл з гумовими пробками та алюмінієвою обкаткою.

Зберігання

У сухому темному, недоступному для дітей місці за температури від 0 до 25 °С.

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна