

06.05.2025

Реверсон
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Розчин безбарвний прозорий.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

атіпамезолу гідрохлорид — 5,0 мг.

Допоміжні речовини: метилпарабен, натрію хлорид, пропілпарабен, пропіленгліколь, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код: QV03A — Інші терапевтичні засоби. QV03AB90 — Атіпамезол.

Атіпамезол — селективний блокатор α_2 -адренорецепторів, який стимулює виділення норадреналіну — головного нейромедіатора у центральній і периферичній нервовій системі. Це призводить до стимуляції симпатичної нервової системи та зупинення седативної, анальгезивної та сторонньої дії медетомідину гідрохлориду або дексмедетомідину гідрохлориду на серцево-судинну та дихальну системи.

Після внутрішньом'язового введення атіпамезолу гідрохлорид швидко абсорбується, його максимальна концентрація у плазмі крові досягається через 10-15 хвилин після введення. Обсяг розподілу (Vd) становить 1-2,5 л/кг, період напіввиведення — 1 годину.

Більша частина атіпамезолу гідрохлориду метаболізується у печінці, невелика частина метилюється в нирках. Метаболіти виводяться переважно із сечею.

Застосування

Застосовується собакам і котам для припинення седативної, анальгетичної, а також побічної дії на серцево-судинну та дихальну системи препаратів на основі медетомідину гідрохлориду.

Дозування

Препарат вводять внутрішньом'язово або підшкірно, одноразово, після операції або маніпуляції для повного припинення дії препарату Медісон чи аналогів. Для нейтралізації дії 1 мкг медетомідину гідрохлориду потрібно ввести атіпамезолу гідрохлориду собакам — 5 мкг, котам — 2,5 мкг, тобто співвідношення препарату для наркозу і антидоту становить: для собак — 1:1, для котів — 2:1 (доза препарату Медісон в два рази більше за дозу препарату Реверсон).

Приклади розрахунку доз для різних видів тварин наведені у таблиці.

Вид тварин	Доза препарату Медісон	Доза препарату Реверсон
Собаки	0,4 мл на 10 кг маси тіла	0,4 мл на 10 кг маси тіла
Коти	0,4 мл на 5 кг маси тіла	0,2 мл на 5 кг маси тіла

Препарат швидко повертає тварину до повної свідомості та зменшує період можливої серцево-судинної депресії і гіпотермії.

Зазвичай препарат діє через 10-15 хвилин після введення. У випадках більш тривалого пригніченого стану тварини можливе повторне введення препарату в тих самих дозах через 15-20 хвилин після першої ін'єкції.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до діючої речовини препарату, вагітним, лактуючим і продуктивним тваринам.

Не застосовувати тваринам із захворюваннями печінки, нирок або серця.

06.05.2025

Застереження

Побічна дія

Дуже рідко може виникнути блювання, слинотеча, важке дихання, мимовільна дефекація.

Можливі поодинокі випадки гіперактивності й тахікардії, які швидко проходять.

У котів можлива гіпотермія.

Особливі застереження при використанні

Після введення препарату тварину розміщують у тихому приміщенні. На етапі одужання тварин не можна залишати без нагляду. Необхідно переконатися, що у тварини відновився нормальний рефлекс ковтання, перш ніж давати їм їжу або воду.

Якщо застосована комбінація медетомідину з буторфанолом чи кетаміном, препарат Реверсон припиняє дію лише медетомідину. Вводять його не раніше, ніж через 40 хвилин після використання препаратів на основі кетаміну та медетомідину. Якщо препарат Реверсон ввести раніше, у тварини можуть розпочатися судоми.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Неспецифічні центральні стимулятори (наприклад, 4-амінопіридин) підсилюють дію препарату, тому їх не рекомендують застосовувати одночасно.

Період виведення (каренція)

Не застосовують для непродуктивних тварин.

Форма випуску

Скляні флакони по 10 мл з гумовими корками і алюмінієвою обкаткою.

Зберігання

У сухому темному, недоступному для дітей місці за температури від 15 до 25 °С.

Після першого відбору із флакона препарат використати протягом 28 діб.

Термін придатності – 2 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ “БРОВАФАРМА”

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400 Україна

Виробник готового продукту:

ТОВ “БРОВАФАРМА”

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400 Україна