

11.08.2025

Бровадазол гель
(гель для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Однорідний гель білого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

фенбендазол - 150 мг.

Допоміжні речовини: тилоза, твін-80, арквад 50, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТСvet код: QP52 - антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AC13 - фенбендазол).

Фенбендазол належить до групи бензімідазолів, має високу антигельмінтну активність і широкий спектр нематодоцидної та цестодоцидної дії, активний проти цестод (дорослі форми, личинки та яйця), нематод травного каналу і легень. Механізм дії фенбендазолу пов'язаний з порушенням енергетичного обміну, руйнуванням мікроканальців травних клітин та появою нейротоксичного ефекту в гельмінтів. Згубно діє на личинки різних стадій та порушує цілісність оболонок яєць гельмінтів, які при потраплянні в навколишнє середовище не спроможні далі розвиватися.

Після перорального застосування швидкість всмоктування фенбендазолу невисока, але в одношлункових тварин вона вища. Залежно від дози і виду тварини вміст фенбендазолу в сироватці крові досягає максимуму через 6-30 годин. Середній період напіввиведення — 10-27 годин. У свиней після введення дози 5 мг/кг максимальний рівень незміненого препарату (0,45 мг/л) відзначається через 6-12 годин. Середній період напіввиведення становить 10 годин. Концентрація падає нижче межі виявлення через 48 годин.

Фенбендазол слабо зв'язується з білками плазми крові. Метаболізується до оксфендазолу (сульфоксиду), оксфендазолсульфонових та оксфендазоламінних метаболітів, що знаходяться в плазмі. Основним метаболітом, який виводиться з сечею, є 4-гідроксифенбендазол, а також оксфендазол та оксфендазол сульфон. Лікувальний ефект досягається завдяки сумарній дії фенбендазолу та його основних метаболітів — фенбендазон сульфоксиду (оксфендазолу) і оксфендазол сульфону. Період напіввиведення дорівнює 2,8-9 годин. Більша частина фенбендазолу виводиться з калом у незміненому вигляді та у вигляді метаболітів, близько 1% — з сечею. Резорбований препарат накопичується, головним чином, у печінці і жировій тканині. Близько 40% препарату, що надходить з жовчю в просвіт тонкого кишечника, реабсорбується, що подовжує контакт антгельмінтика з кишковими паразитами. В організмі перетворюється на фенбендазол, оксфендазол та інші метаболіти.

Фенбендазол практично нешкідливий для організму тварин, не чинить ембріотоксичного, тератогенного, сенсibiliзуючого впливу, не подразнює шкіру і слизові оболонки, не впливає на перебіг вагітності у тварин.

Застосування

Лікування і профілактика коней при інвазійних захворюваннях, які спричинюються збудниками нематодозів: *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Strongylidae tribus*, *Cyathostominae tribus*, *Strongyloides westeri*, *Dictyocaulus arnfieldi*, *Parafilaria multipapillosa*, *Onchocerca spp.* та личинками шлунково-кишкових оводів *Gastrophilus spp.*

Дозування

Доза препарату становить 1 г препарату на 20 кг маси тіла тварини. Препарат вводять за допомогою шприца-туби на корінь язика одноразово. При інвазіях, викликаних личинками нематод *Trichostrongylus axei* та личинками шлунково-кишкових оводів *Gasterophilus spp.*, тваринам вводять препарат двічі з інтервалом в одну добу.

Профілактичну дегельмінтизацію дорослих коней рекомендують проводити систематично кожні 3-4 місяці.

11.08.2025

Протипоказання

Не встановлені.

Застереження

Побічна дія

Добре переноситься тваринами, навіть при багаторазовому передозуванні. Тератогенної, мутагенної, канцерогенної та сенсibiliзуючої дії препарат не виявляє.

Особливі застереження при використанні

Не застосовують тваринам впродовж 7 діб після лікування бромсаланами.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідома.

Період виведення (каренції)

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 11 діб після останнього введення препарату. У випадку забою раніше встановленого терміну м'ясо використовують для годівлі м'ясоїдних тварин або для виготовлення м'ясо-кісткового борошна, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Шприц-туби з дозатором по 20 та 30 г.

Зберігання

Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 1 до 20 °С.

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари

Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари

Київська обл., 07400, Україна