

ПРЕГНЕРОН-ВС®
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Рідина від безбарвного до жовтого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

медроксипрогестерону ацетат - 25 мг

Допоміжні речовини: спирт бензиловий, бавовняна олія.

Фармакологічні властивості

ATCvet QG03A, гормональні контрацептиви для системного застосування.

Діючою речовиною препарату є медроксипрогестерону ацетат - синтетичний прогестин, аналог прогестинів, що продукуються жовтим тілом. Дія полягає у перетворенні проліферативного ендометрія у секреторний, посилює гіпертрофію міометрію та пригнічує скорочення матки. Залежно від дози пригнічує секрецію гіпофізарних гонадотропінів, володіє антиінсуліновою дією. У тварин медроксипрогестерону ацетат виявляє виражений аденокортикальний ефект, і може пригнічувати виділення аденокортикотропного гормону та кортизолу. Медроксипрогестерон володіє також антиестрогенною дією і може знижувати рівень тестостерону у плазмі крові самців.

Застосування

Для тривалого запобігання або переривання тічки у кішок і сук та попередження небажаної вагітності; лікування уявної вагітності і псевдолактації сук; лікування німфоманії кішок.

Дозування

Препарат вводять одноразово підшкірно в область холки або внутрішньом'язово в області стегна у дозах :

для лікування уявної вагітності і псевдолактації: сукам масою тіла до 10 кг- 1,0 мл препарату, від 10 до 20 кг - 2,0 мл, більше 40 кг - 6,0 мл.

для запобігання появи тічки - за 5-10 діб до її появи, для її переривання - протягом 1-2 діб після появи перших ознак (зміна поведінки, початок слизових виділень з домішкою крові, привабливість для осіб протилежної статі):

— сукам масою тіла 2-5 кг — 2,0-3,0 мл препарату; 5-10 кг - 3,0-4,0 мл; 10-20 кг - 4,0-6,0 мл; 20-30 кг - 6,0-8,0 мл; 30-40 кг - 8,0-10,0 мл; більше 40 кг - 10,0-12,0 мл;

- кішкам масою тіла до 3 кг - 1,0 мл препарату, більше 3 кг - 2,0-4,0 мл.

при лікуванні німфоманії кішок - 1,0-2,0 мл препарату.

Для одноразового попередження тічки препарат вводять сукам не пізніше місяця до ймовірної тічки, а кішкам - одразу після чергової тічки.

Для тривалого запобігання тічки вводять препарат за 5-10 діб до початку тічки, повторюють сукам через 5-6 місяців, кішкам - через 4-6 місяців. У випадку, якщо суки, яким вводився препарат проявляють ознаки статевого збудження, необхідно зробити позачергову ін'єкцію препарату.

Для сіамських кішок дозування препарату визначається індивідуально ветеринарним лікарем.

Перед використанням вміст флакону ретельно збовтати до отримання однорідної суспензії.

Протипоказання

Препарат не можна застосовувати у період вагітності, при неправдивій вагітності і лактації, захворюваннях сечостатевої та ендокринної систем, порушенні регулярності статевого циклу, пухлинах молочної залози, у статевонезрілих тварин (до першої тічки).

Не рекомендується застосовувати препарат, якщо після виникнення тічки пройшло більше ніж 3 доби.

Препарат не можна застосовувати тваринам у період вагітності та лактації.

Підвищена чутливість до препарату.

Застереження

Препарат застосовують лише для самок собак та котів (сук та кішок).

Не застосовувати тваринам до першої тічки.

Не вводити препарат в післяопераційний період.

Не рекомендується застосовувати сукам борзих порід.

деяких випадках пригнічення тічки може бути перманентним.

У сук і кішок після введення препарату може зберігатися здатність до запліднення протягом 10 діб.

Після припинення застосування препарату спарювати тварин рекомендується після другої тічки.

Форма випуску

Флакони з нейтрального скла марки НС-1, НС-2, УСП-1, закриті гумовими корками під алюмінієву обкатку по 1,2, 5,10, 20, 50,100 мл. Вторинна упаковка - картонна коробка.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності - 3 роки. Після першого відбору із флакону препарат використати протягом 10 діб, при умові зберігання в темному місці за температури до 8 °С.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення і виробник готового продукту:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез",
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна