

29.03.2024

ФРОНТЛАЙН КОМБО для котів
(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин жовтого кольору.

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини:

фіпроніл – 10 г;

(S)-метопрен – 12 г.

Допоміжні речовини: бутилгідроксипропанол, бутилгідрокситолуол, етанол, полісорбат 80, полівідон, диетиленгліколь моноетилефір.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP53A, ектопаразитарні ветеринарні препарати для місцевого застосування. QP53AX65 – фіпроніл, комбінації.

Препарат ФРОНТЛАЙН КОМБО для котів – контактний інсектоакарицидний розчин для зовнішнього застосування.

Фіпроніл, який входить до складу препарату, похідний фенілпіразолу з інсектицидною і акарицидною дією. Механізм дії фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводить до ураження нервової системи ектопаразитів і їх загибелі. Фіпроніл не впливає на центральну нервову систему теплокровних тварин.

(S)-метопрен імітує дію ювенільного гормону і викликає порушення розвитку та смерть бліх на стадіях яйця і личинки. S-метопрен проникає в оболонку щойно відкладених яєць, а також у личинки та лялечки і блокує їх розвиток, запобігаючи появі статевозрілих комах.

Після нанесення препарату на шкіру активні компоненти поступово розподіляються по всій поверхні тіла тварини, кумулюються в епідермісі, волосяних цибулинах і сальних залозах, і поступово вивільняючись забезпечують тривалий захист тварини від ектопаразитів. Після обробки котів препаратом, блохи (*Ctenocephalides* spp) гинуть протягом 24 годин; кліщі (*Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis longicornis*, *Haemaphysalis flava*, *Haemaphysalis campanulata*) та волосоїди (*Felicola subrostratus*) протягом 48 годин.

Одноразова обробка забезпечує захист від кліщів – до 4 тижнів, проти статевозрілих та преімагінальних фаз розвитку комах – до 6 тижнів.

Застосування

Коти

Профілактика та лікування котів при ураженнях блохами (*Ctenocephalides* spp.), кліщами (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*) та волосоїдами (*Felicola subrostratus*).

Препарат може використовуватись як один із засобів при лікуванні блошиного алергічного дерматиту котів, а також з метою запобігання прикріплення та розвитку ектопаразитів.

Тхори

Профілактика та лікування тхорів при ураженнях блохами (*Ctenocephalides* spp.), кліщами (*Ixodes ricinus*), а також з метою запобігання прикріплення та розвитку ектопаразитів.

Дозування

Препарат застосовують котам та тхорам зовнішньо шляхом одноразового нанесення на суху непошкоджену шкіру у дозі: одна піпетка 0,5 мл на одну тварину.

Перед обробкою взяти піпетку вертикально, зламати її кінчик, розділити шерсть тварини і видавити вміст піпетки безпосередньо на шкіру у ділянку шиї перед лопатками.

Обробку тварин проти паразитів рекомендується проводити 1 раз на 4 тижні.

Одна обробка забезпечує захист котів та тхорів від кліщів - до 4 тижнів, проти всіх стадій розвитку комах (блохи, волосоїди) – до 6 тижнів.

29.03.2024

Протипоказання

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.

Не застосовувати кошенятам віком до 8 тижнів та/або масою тіла до 1 кг.

Не застосовувати тхорам віком до 6 місяців.

Не застосовувати для кролів, оскільки можлива загибель тварини.

Застереження

Після обробки тварин препаратом не допускати злизування препарату (одягають захисний комірць, намордник, фіксують щелепи допоміжними засобами).

Не слід купати тварин протягом 48 годин після обробки препаратом, а також наносити препарат на вологу або пошкоджену шкіру.

Для досягнення максимального захисту тварин рекомендується періодично чистити і обробляти дозволеними засобами предмети догляду та місця перебування тварин (підстилки, килими, м'які меблі тощо).

Форма випуску

Поліетиленові піпетки «РЕ» та/або піпетки «Barex» об'ємом 0,5 мл, розфасовані по 1, 3 або 4 піпетки в блістери, упаковані в картонні коробки.

Термін придатності

36 місяців.

Особливі заходи зберігання

Зберігати препарат в оригінальній упаковці у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей і тварин місці при температурі від 2 до 25 °С.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Берінгер Інгельхайм Ветмедіка ГмбХ,
55216 м.Інгельхайм-на-Рейні,
Бінгер штрассе, 173, НІМЕЧЧИНА.

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
55216 Ingelheim-am-Rhein,
Binger Strasse 173, GERMANY.

Виробник готового продукту

Берінгер Інгельхайм Енімал Хелс Франс
СКС, 4 шема дю Калке – 31100 Тулуза,
Франція.

Boehringer Ingelheim Animal Health France
SCS, 4 chemin du Calquet - 31100 Toulouse,
France.