

Бровальзен таблетки
(таблетки)
листівка-вкладка

Опис

Таблетки масою 1 г білого або світло-сірого кольору, округло-циліндричної або овально-продовгуватої форми.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

альбендазол — 75,0 мг.

Допоміжні речовини: лактоза, кальцію карбонат, глюкоза, крохмаль, тальк, кальцію стеарат, кроскармелоза натрію, орісіл.

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код: QP52 — антигельмінтні ветеринарні препарати, QP52AC11 — альбендазол.

Альбендазол — антигельмінтик широкого спектра дії з групи бензimidазолів. Гальмує білковий синтез, у результаті порушується надходження і внутрішньоклітинне транспортування поживних речовин, обмін субстратів речовин (аденозинтрифосфornoї кислоти і глюкози), через гальмування фумаратредуктази знижуються мітохондріальні реакції, що спричиняє загибель паразитів.

Ефективний проти молодих і статевозрілих нематод, а також деяких личинок, які паразитують у травному каналі та дихальних шляхах тварин, цестод на преімагінальних та імагінальних стадіях життєвого циклу, статевозрілих трематод.

Альбендазол погано всмоктується при прийомі всередину. Максимальна концентрація в крові досягається протягом 2-5 годин. Високі концентрації створюються в сечі, жовчі, спинномозковій рідині, печінці. Добре проникає через гематоенцефалічний бар'єр, проникає через плацентарний бар'єр і виводиться з молоком. Метаболізується в печінці з утворенням активних метаболітів (альбендазолу сульфоксиду та альбендазолу сульфону). З організму альбендазол та його метаболіти виводяться переважно з жовчю, частково — з сечею. Період напіввиведення становить в середньому 8,5 годин. При порушенні функцій печінки цей час може збільшуватись.

Застосування

Дегельмінтизація тварин за паразитарних захворювань, спричинених:

- **велика рогата худоба:**

- нематодами травного каналу і дихальних шляхів: *Haemonchus placei*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum* spp., *Trichostrongylus* spp., *Ostertagia* spp., *Cooperia oncophora*, *Chabertia* spp., *Neoascaris vitulorum*, *Strongyloides papillosus*, *Dictyocaulus viviparus*, *Muellerius* spp., *Protostrongylus* spp., *Nematodirus* spp., *Trichuris* spp.;

- цестодами (преімагінальні та імагінальні): *Moniezia* spp., *Thysaniezia giardi*;

- трематодами печінки: *Fasciola hepatica* (статевозрілі), *Dicrocoelium lanceatum*;

- **вівці, кози:**

- нематодами травного каналу і дихальних шляхів: *Haemonchus contortus*, *Bunostomum trigonocephalum*, *Oesophagostomum* spp., *Trichostrongylus* spp., *Ostertagia* spp., *Cooperia oncophora*, *Skrjabinema ovis*, *Chabertia ovina*, *Strongyloides papillosus*, *Dictyocaulus filaria*, *Muellerius capillaris*, *Protostrongylus* spp., *Nematodirus* spp., *Trichuris* spp.;

- цестодами (преімагінальні та імагінальні): *Moniezia* spp., *Avitellina centripunctata*, *Thysaniezia giardi*;

- трематодами печінки: *Fasciola hepatica* (статевозрілі), *Dicrocoelium lanceatum*.

- **кони:**

- нематодами травного тракту і дихальних шляхів: *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Strongylus* spp., *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp., *Cylicodontophorus* spp., *Cylicostephanus* spp., *Strongyloides westeri*, *Dictyocaulus arnfieldi*;

- цестодами (преімагінальні та імагінальні): *Anoplocephala magna*, *Anoplocephala perfoliata*, *Paranoplocephala tamillana*.

10.03.2025

- **собаки, коти:**

- нематодами травного каналу: *Toxocara spp.*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria spp.*,

- цестодами (преімагінальні та імагінальні): *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus granulosus*, *Diphyllobothrium latum*.

Дозування

Перед застосуванням препарат змішують із кормом і дають одноразово на початку ранкової годівлі.

Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.

Вид тварин	Вид гельмінтів	Доза, г/10 кг маси тіла
Велика рогата худоба	нематоди, цестоди	1,0
	трематоди	1,3-2,0
Вівці, кози	нематоди, цестоди	0,7
	трематоди	1,0
Коні та інші однокопитні	нематоди, цестоди	0,7
Собаки, коти	нематоди, цестоди	3,0
	трематоди	3,5

Для індивідуальної дегельмінтизації дорослих жуйних тварин таблетки дають примусово на корінь язика.

Для худоби, що пасеться на пасовищах, лікувально-профілактичну дегельмінтизацію проводять на початку і наприкінці стійлового періоду.

При захворюванні жуйних тварин на фасціольоз препарат використовують у будь-яку пору року. Залежно від інтенсивності інвазії (визначають за середньою кількістю яєць фасціол у п'яти пробах фекалій) препарат застосовують у таких дозах на 10 кг маси тіла:

- до 4 яєць (низька інтенсивність) — 1,3 г;
- 5-10 яєць (середня інтенсивність) — 1,5-1,7 г.

Враховуючи, що альбендазол малоефективний проти личинок фасціол, першу профілактичну дегельмінтизацію проводять через 2-2,5 місяці після закінчення пасовищного періоду, а повторну — не пізніше ніж за 10-15 діб до вигону тварин на пасовище.

Протипоказання

Не застосовувати самкам у першу третину вагітності, вівцематкам у період парування і в перший місяць після виведення баранів із отари.

Не застосовувати коням, м'ясо яких призначено для споживання людьми.

Застереження

Побічна дія

При застосуванні в терапевтичних дозах побічних явищ не виникає. Індекс безпечності альбендазолу дорівнює 8.

Особливі застереження при використанні

При гострому фасціольозі використовувати препарат недоцільно.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не відомі.

Період виведення (каренції)

Після останнього застосування препарату забій великої рогатої худоби, овець, кіз на м'ясо дозволяється через 14 діб. Людям вживати в їжу молоко корів можна через 4 доби. М'ясо та молоко, отримані раніше вказаного терміну, утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Блістери по 10 таблеток (по 3, 10 шт. у картонній коробці).

Зберігання

У сухому темному, недоступному для дітей місці за температури не вище 25 °С.

10.03.2025

Термін придатності
3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна