

ВЕТКІНОМ 2,5%
(суспензія для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Однорідна дрібнодисперсна суспензія від молочно-білого до світло-коричневого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

цефквіному сульфат - 29,64 мг (що еквівалентно 25 мг цефквіному).

Допоміжні речовини: твій 80, хлорбутанол гемігідрат, тригліцериди з середньою довжиною ланцюга (Мігліюл 812N).

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01DE90 - Цефквіном.

Цефквіном - антибіотик, який належить до групи цефалоспоринів IV покоління. Діє бактерицидно проти грампозитивних (*Arcanobacterium pyogenes*, *Bacillus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* (серогрупи А, В та С/ *Clostridium spp.*, *Erysipelotrix rhusiopathiae*) та грамнегативних мікроорганізмів (*E. coli*, *Citrobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Serratia marcescens*, *Histophilus somnus*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Prevotella spp.*, *Actinobacillus spp.*).

Механізм дії антибіотика полягає в інгібуванні синтезу клітинної оболонки бактерій. Цефквіном як цефалоспорин четвертого покоління поєднує в собі високу ступінь проникнення в бактеріальні клітини з високим рівнем стійкості до бета-лактамаз. На відміну від цефалоспоринів попередніх поколінь, цефквіном не гідролізується хромосомно кодованими цефалоспориназами типу Amp-С або плазмідно-опосередкованими цефалоспориназами ряду ентеробактерій.

Цефквіном після внутрішньом'язового введення швидко потрапляє у системний кровотік, досягаючи максимальної концентрації у сироватці крові у собак та котів - через 15-45 хвилин і зберігається на терапевтичному рівні протягом 24 годин. Він погано зв'язується з білками сироватки крові (менше, ніж 5%), тому проникає в цереброспінальну та синовіальну рідину та швидко виводиться з організму, головним чином, у незміненому вигляді із сечею; період напіввиведення цефквіному в собак та котів становить 1-2 години.

Застосування

Лікування собак та котів, хворих на мастит, менінгіт, артрит, цистит та уретрит, а також за захворювань шкіри та органів дихання, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до цефквіному.

Дозування

Внутрішньом'язово глибоко, один раз на добу, у дозі:

собаки та коти - 0,5 мл препарату на 5 кг маси тіла (2,5 мг цефквіному на 1 кг маси тіла) тварини щодобово протягом 2-5 діб.

Перед використанням флакон із препаратом необхідно ретельно струсити!

Рекомендовано кожен дозу ін'єкції вводити в різні місця.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до цефалоспоринів та інших β лактамних антибіотиків.

Не застосовувати тваринам, маса тіла яких менша, ніж 1,25 кг.

Не застосовувати одночасно із бактериостатичними препаратами, у зв'язку з можливим зниженням бактерицидної активності цефквіному.

Не застосовувати при виявленні резистентних до цефквіному штамів збудників.

Не застосовувати при важких порушеннях функції печінки та нирок.

Застереження

Побічна дія

0 6. 0 5. 2025

Можливий тимчасовий набряк у місці введення препарату, який зникає протягом 15 діб після останнього застосування препарату.

Для попередження місцевої реакції бажано щоразу змінювати місце введення препарату.

Особливі застереження при використанні

Збільшення дозування або кратності використання, або відхилення від рекомендованої схеми лікування може призвести до розвитку антимікробної резистентності.

Препарат рекомендовано застосовувати тільки на основі тесту на чутливість мікроорганізмів до цефквіному. Цефквіном селектує резистентні штами, такі як бактерії, що несуть бета-лактамази розширеного спектру (ESBL), і може становити ризик для здоров'я людини, якщо ці штами поширюються на людину, наприклад, через їжу. Тому препарат слід застосовувати для лікування клінічних станів у тварин, які важко піддаються лікуванню, або для терапії важких гострих форм захворювання, при яких потрібно негайно починати лікування з врахуванням набутого досвіду; починати лікування з врахуванням емпіричних даних без попереднього визначення чутливості мікроорганізмів до протимікробних засобів.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Відомо що існує у бактерій перехресна чутливість до інших цефалоспоринов. Через небажану фармакодинамічну взаємодію цефквіном не застосовують одночасно з бактеріостатичними препаратами.

Застосування під час вагітності, лактації, несучості

Інформація про негативний вплив на сук та кішок під час вагітності та лактації відсутня. Застосування препарату допускається тільки після ретельної оцінки співвідношення користь/ризик лікарем ветеринарної медицини.

Спеціальні застереження

Перед використанням флакон із препаратом необхідно ретельно струсити.

Період виведення (каренції)

Немає.

Форма випуску

Флакони з нейтрального скла марки НС-1, НС-2, УСП-1 закриті гумовими корками під алюмінієву обкатку по 10; 20; 50; 100 та 200 мл. Вторинна упаковка - картонна коробка.

Зберігання

Суше темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °С.

Заборонено заморожувати!

Термін придатності - 24 місяці.

Після першого відбору з флакону, препарат необхідно використати протягом 28 діб, за умови стерильного відбирання препарату та зберігання в сухому темному місці за температури від 2 до 8 °С.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30, Україна

Виробник готового продукту

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30, Україна