

BOVIMUN 4, БОВІМУН 4

СКЛАД	До складу вакцини входять два компоненти (суспензія в якості розчинника ліофілізату) з однаковою кількістю доз. Одна доза препарату (3 мл) містить: <i>Вакцинні штами в суспензії (до інактивації):</i> вірус ринотрахеїту ВРХ штаму «ВМ» $\geq 10^{7,0}$ ТЦД ₅₀ ; вірус парагрипу-3 (ПГ-3), штаму «ВР-11» ≥ 480 ГАО; вірус діареї ВРХ, штаму «D-13» $\geq 10^{6,0}$ ТЦД ₅₀ . <i>Вакцинний штаму в ліофілізованому компоненті:</i> Живий респіраторно-синцитіальний вірус ВРХ, штаму «РС-09» $\geq 10^{4,0}$ ТЦД ₅₀ .
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА	Суспензія і ліофілізат.
ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	Вакцина стимулює утворення активного імунітету проти респіраторно-репродуктивного комплексу захворювань ВРХ (інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3, вірусної діареї та респіраторно-синцитіальної хвороби), впродовж 2 тижнів після вакцинації. Імунітет у ВРХ триває до 12 (дванадцяти) місяців. Вакцина не має лікувальних властивостей.
ВИД ТВАРИН	Велика рогата худоба (ВРХ).
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ	Для профілактики захворювання великої рогатої худоби на інфекційний ринотрахеїт, вірусну діарею, парагрип-3 та респіраторно-синцитіальну інфекцію ВРХ.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Не дозволяється вакцинувати хворих та виснажених тварин.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ	підігріти вакцину до температури 20-25°C; перед застосуванням суспензію ретельно збовтати. При довготривалому зберіганні можливе утворення незначного осаду, що легко розбивається при струшуванні в гомогенну суспензію; розчинити ліофілізований компонент в суспензії; вакцину застосувати впродовж 3-х годин після розчинення.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ТА ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ	Не вивчалися, тому не рекомендується застосовувати одночасно з іншими вакцинами та терапевтичними засобами. Не змішувати компоненти вакцини з різних серій.
ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ПРИ ВАГІТНОСТІ, ЛАКТАЦІЇ ЧИ НЕСУЧОСТІ	Застосовування на будь-якій стадії тільності та лактації не викликає негативної реакції.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ	Перенести шприцем 5 мл вакцинної суспензії у флакон з ліофілізованим компонентом, злегка збовтати до повного розчинення ліофілізату, відібрати шприцем розчинений матеріал та перенести до флакону з суспензією. Провести процедуру повторно для повного перенесення розчиненого ліофілізованого компонента у флакон з суспензією. Вакцину застосовувати внутрішньом'язево в ділянку шийних м'язів. Дозування: Телята: Вакцинувати дворазово з інтервалом 21-30 днів, починаючи з 4-х тижневого віку, незалежно від ваги, віку та статі. У віці 6 місяців проводять наступну вакцинацію. Бики: Вакцинувати дворазово з інтервалом 21-30 днів. В подальшому вакцинацію проводити раз на рік. Корови та телички: Вакцинувати дворазово за 60-50 та 30-20 днів до першого осіменіння (запліднення) або до отелу. В подальшому вакцинацію проводити раз на рік.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	Після вакцинації у тварин іноді може спостерігатися припухлість у місці введення та підвищення температури тіла до 1°C, які зникають через 2-3 дні без лікування.
ПЕРЕДОЗУВАННЯ (СИМПТОМИ, НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ)	Застосування двох доз вакцини не має негативного впливу на здоров'я тварин.
ПЕРІОД ВИВЕДЕННЯ (КАРЕНЦІЇ)	Нуль діб.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ І ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ВІП	Дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та техніки безпеки при проведенні вакцинації. У разі випадкової самоін'єкції необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, маючи при собі листівку-вкладку на даний препарат.
ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З НЕВИКОРИСТАНИМ ВІП, СПОСОБИ ЙОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЇ	Вакцину з закінченим терміном придатності, не використану впродовж 3-х годин після розчинення, порожні флакони, шприці та голки знезаразити кип'ятінням впродовж 30 хвилин.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	24 місяці з дати виготовлення. Вакцину використовувати впродовж 3-х годин після розчинення.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ	Зберігати за температури від 2 до 8°C у темному, недоступному для дітей місці. Не заморожувати.
УПАКОВКА ТА ФАСУВАННЯ	До складу вакцини входять два компоненти (суспензія в якості розчинника ліофілізату), розфасовані у флакони зі скла або пластику закриті пробками та закатані алюмінієвими ковпачками, з однаковою кількістю доз (по 10 або 30 доз).
НАЗВА ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ВЛАСНИКА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ І ВИРОБНИКА	ТОВ „БІОТЕСТЛАБ” 08600 Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська 57-А. Адреса виробництва: 03145 м. Київ, вул. Академіка Лебєдєва 1; 08600 Київська обл., м. Васильків, вул. Лістрового Олександра, буд. 1/3.
ПРАВИЛА ВІДПУСКУ	Без рецепту
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення застосування цієї серії негайно припиняють і негайно повідомляють Державний науково контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.