



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 «Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів» та на підставі експертного висновку 15.12.2021 № 3929-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів 14.02.2022 № 73 зареєстровано:

продукт Вектра 3D

форма Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення

Власник реєстраційного посвідчення:

Сева Санте Анімаль

10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн, ФРАНЦІЯ

зареєстровано в Україні за № АА-03086-03-12 від 14.02.2022

Виробник:

Сева Санте Анімаль

10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн, ФРАНЦІЯ

AB7 САНТЕ

Чемін де Монж, 31450 Дейм, ФРАНЦІЯ

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка препарату (додаток 2);
- етикетка (додаток 3).

Реєстраційне посвідчення дійсне до: 13.02.2027

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного продукту.



Коротка характеристика препарату

1. Назва

Вектра 3D

2. Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

динотефуран	54 мг,
перметрин	397 мг,
пірипроксифен	4,48 мг.

Допоміжні речовини: N-октил-2-піролідон, N-метил піролідон.

3. Фармацевтична форма

Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення.

4. Фармакологічні властивості

ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (ATCvet QP53AC54, комбінації перметрину)

Перметрин, що входить до складу препарату, є синтетичним піретроїдом, механізм дії якого полягає у блокуванні проведення нервового імпульсу в організмі ектопаразита за рахунок зниження проникності мембран для іонів натрію, що призводить до незворотного паралічу і його загибелі.

Динотефуран – похідний гуанідину, належить до нейротоксинів класу неонікотинοїдів, діє на постсинаптичні ацетилхолінові рецептори нервової системи, спричиняючи загибель ектопаразитів.

Пірипроксифен – аналог ювенільного гормону, що регулює ріст і розвиток комах, у тому числі і бліх. Механізм його дії полягає в порушенні нормального циклу метаморфози комах: яйце - личинка - лялечка - імаго.

При наскірному нанесенні, речовини, що входять до складу препарату, кумулюються в епідермісі, волосяних фолікулах і жирових залозах, що сприяє довготривалій контактній інсектоакарицидній і репелентній дії.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Собаки.

5.2 Показання до застосування

Лікування собак при ураженні блохами блохами (*Ctenocephalides spp.*), вошами (*Linognathus setosus*), волосоїдами (*Trichodectes canis*) та іксодовими кліщами (*Ixodes spp.*, *Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*).

Лікування собак при ураженні мухами-жигалками (*Stomoxys calcitrans*), комарами (*Aedes aegypti*, *Culex pipiens*), мошками (*Simulium galeratum*) й москітами (*Phlebotomus perniciosus*). Інсектицидна та репелентна ефективність триває 1 місяць.

Також препарат рекомендується застосовувати у комплексній терапії алергічного дерматиту, спричиненого укусами бліх.

Інсектицидна ефективність триває протягом 1 місяця, овіцидна та ларвіцидна – 2 місяці.

Репелентна та акарицидна ефективність проти *Rhipicephalus sanguineus* та *Ixodes ricinus* триває 1 місяць, проти *Dermacentor reticulatus* до 3-х тижнів.

5.3 Протипоказання

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Не застосовувати препарат цуценятм віком до 7 тижнів, собакам масою тіла до 1,5 кг, старим, хворим та ослабленим тваринам!

Категорично забороняється застосовувати препарат котам, оскільки він містить у своєму складі перметрин!

5.4 Побічна дія

У рекомендованих дозах побічної дії не спостерігали. При передозуванні препаратом рідко спостерігали еритему, свербіж або інші ознаки дискомфорту на місці нанесення.

14.02.2022

Ці ознаки можуть бути легкими і тимчасовими. Якщо ознаки зберігаються або погіршуються, слід звернутися за консультацією до ветеринарного лікаря.

У рідкісних випадках повідомлялося про поведінкові розлади, такі як гіперактивність, вокалізація або тривога, системні ознаки, такі як млявість або анорексія, а також неврологічні ознаки, такі як тремтіння м'язів.

У дуже рідкісних випадках повідомлялося про такі ознаки атаксії, як нестабільний рух.

Про шлунково-кишкові ознаки, такі як блювота або діарея, також повідомлялося дуже рідко.

Про короткочасні косметичні ефекти (мокра шерсть, злипання волоссяного покриву) на місці нанесення повідомлялося дуже рідко, проте ці ефекти зазвичай зникають протягом 48 годин.

5.5 Особливі застереження при використанні

При утриманні декількох тварин їх необхідно обробляти одночасно.

При утриманні собак і котів в одному приміщенні їх необхідно обробляти одночасно спеціалізованими ветеринарним лікарськими засобами для цих видів тварин.

У разі сильної інфестації блохами, рекомендується також обробляти відповідними інсектицидами місце перебування тварин (лежки, коврики, м'які підстилки, тощо), з подальшим ретельним прибиранням приміщення за допомогою пылососу.

При підозрі на дерматит (свербіж та подразнення шкіри) слід звернутися до ветеринарного лікаря.

Ветеринарний лікарський засіб залишається ефективним при контакті тварин з водою (наприклад, купання, плавання). Контакт з водою, що повторюється щотижня протягом одного місяця і починається через 48 годин після обробки, а також миття шампунем через 2 тижні після обробки тварини не впливають на ефективність препарату. Однак у разі частого миття шампунем або купання/плавання протягом 48 годин після обробки може знизити тривалість ефективності дії препарату.

5.6 Використання під час вагітності, лактації

Дослідження застосування препарату під час вагітності та лактації не проводились, тому доцільність його застосування визначає лікар ветеринарної медицини. Лабораторні дослідження кожного з компонентів препарату на щурах та кролях не виявили тератогенного чи фетотоксичного впливу на організм тварини.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не встановлена.

Не рекомендують застосовувати препарат одночасно з іншими аналогічними ветеринарними препаратами!

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Препарат застосовують шляхом топікального (крапельного) нанесення на суху непошкоджену шкіру в недоступному для злизування тваринами місці (між лопатками). Мінімальна рекомендована доза становить 6,4 мг динотефурану/кг маси тіла тварини, 0,6 мг пірипроксифену/кг маси тіла тварини та 46,6 мг перметрину/кг маси тіла тварини, що еквівалентно 0,12 мг препарату/кг маси тіла тварини.

Препарат наносять на шкіру в декількох місцях у дозах:

Маса тіла тварини, кг	Колір кришечки аплікатора	Об'єм піпетки, (мл)	Використовується аплікатор:	
1,5 – 4,0	Жовтий	0,8	1 аплікатор	Вектра 3D 1.5 – 4 кг
> 4,0 – 10,0	Бірюзовий	1,6		Вектра 3D 4 – 10 кг
> 10,0 – 25,0	Блакитний	3,6		Вектра 3D 10 – 25 кг
> 25,0 – 40,0	Фіолетовий	4,7		Вектра 3D 25 – 40 кг
> 40	Червоний	8,0		Вектра 3D 40 – 65 кг


Методи та способи нанесення

14.02.2022


Спот-он.

Витягнути аплікатор з упаковки.


Крок 1: Утримуючи аплікатор кришечкою догори розміщують пальці обох рук над маленьким та під великим дисками, як показано на малюнку.



Крок 2: Натискають на два диски, з'єднують їх, як показано на малюнку, прокалюючи захисну мембрану.




Крок 3: Розгортають шерсть тварини до шкіри та наносять препарат двома способами, які описані нижче (крок 4).




Крок 4: Препарат наносять одним з двох рекомендованих методів:

4а: Обережно стискаючи стінки аплікатора наносять ветеринарний препарат на шкіру в декілька місць, залежно від маси тіла собаки, починаючи з ділянки між лопатками.




Собаки, масою тіла від 1,5 до 4 кг




Собаки, масою тіла від 4 до 10 кг

14.02.2022




Собаки, масою тіла від 10 до 40 кг



Собаки, масою тіла від 40 кг

АБО

46: Незалежно від маси тіла тварини, проводять умовну лінію і видавлюють вміст аплікатора (препарат) вздовж лінії хребта від кореня хвоста до ділянки між лопатками, як показано на малюнку.



Повторну обробку впродовж сезону активності ектопаразитів проводять за показами, один раз на місяць.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

При 7-ми разовому нанесенні 5-ти кратної дози препарату здоровим цуценятм 7-ми тижневого віку, з інтервалом у 2 тижні спостерігали лише виникнення еритем та незначні зовнішні зміни волосяного покриву, інших змін не було. Після випадкового попадання препарату всередину (*per os*) у найвищій рекомендованій дозі спостерігали у тварин блювоту, слинотечу і діарею, які проходили без терапії.

У випадку виявлення алергічних реакцій після застосування препарату його негайно змивають проточною водою з милом і за необхідності, за рекомендацією лікаря ветеринарної медицини, застосовують антигістамінні засоби та симптоматичне лікування.

5.10 Спеціальні застереження

Цей ветеринарний лікарський засіб може викликати у кішок судоми, які можуть бути смертельними через унікальну фізіологію цього виду тварин, який не здатний метаболізувати певні сполуки, включаючи перметрин. У разі випадкового впливу та виникнення небажаних ефектів, вимийте кішку шампунем або милом. Щоб запобігти випадковому потраплянню ветеринарного препарату на котів, слід утримувати їх подалі від оброблених собак, поки місце нанесення не

14.02.2022

висохне. Важливо стежити, щоб кішки не контактували та не вилизували місце нанесення у собак, яку оброблювали цим ветеринарним препаратом.

Нешкідливість ветеринарного лікарського засобу не встановлена у собак молодше 7 тижневого віку або масою тіла менше 1,5 кг.

Слід бути обережним, щоб уникнути контакту ветеринарного препарату з слизовою оболонкою очей у собаки, що оброблюється. При попаданні в очі слід негайно промити водою.

Ветеринарний лікарський засіб залишається ефективним, коли оброблених тварин занурюють у воду (плавання чи купання). Регулярне занурення у воду протягом місяця після нанесення препарату, починаючи з 48 годин після нанесення, а також миття шампунем через 2 тижні після нанесення препарату не впливають на ефективність цього продукту.

5.11 Період виведення (каренція)

Не визначається.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, що прийняті при роботі з ветеринарними препаратами. Люди з відомою гіперчутливістю до будь-якого з компонентів препарату повинні уникати роботи із даним препаратом.

Під час обробки тварин забороняється палити, вживати продукти харчування та пити воду. Після закінчення роботи слід ретельно вимити руки теплою водою з милом. Уникати попадання препарату на слизові оболонки. При потраплянні на шкіру та слизові оболонки препарат слід негайно змити проточною водою з милом, при потраплянні всередину – негайно звернутися до лікаря.

Не дозволяється гладити тварину чи допускати до неї маленьких дітей протягом 4 годин після обробки препаратом. Тому рекомендується обробляти собак ввечері, перед вечірньою прогулянкою. У день обробки препаратом собакам не дозволяється спати з власниками, особливо з дітьми. Використані аплікатори слід негайно утилізувати і не залишати в межах видимості чи досяжності для дітей чи тварин.

Якщо подразнення шкіри або очей зберігається, або ветеринарний лікарський засіб випадково потрапив всередину слід негайно звернутися до лікаря та показати йому інструкцію або етикетку на препарат.

Зачекайте, поки місце нанесення препарату висохне, перш ніж дозволити обробленій собаці контактувати з текстилем або меблями у домі.

Не слід допускати собакам купатись у поверхневих водах протягом 48 годин після нанесення препарату, щоб уникнути несприятливого впливу на водні організми.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Не застосовувати одночасно з іншими інсекто-акарицидними лікарськими засобами!

6.2 Термін придатності

3 роки.

6.3 Особливі заходи зберігання

Недоступне для дітей місце за температури від 0 до 25 °С.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Препарат фасують у піпетки з алюмінієво-полімерного матеріалу по 0,8; 1,6; 3,6; 4,7; та 8 мл. Піпетки упаковують в картонні коробки по 1, 3, 4, 6, 12, 24 чи 48 шт.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат та його залишки утилізують відповідно до чинного законодавства.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль (Франція)
10 авеню де ла балластієре,
33500 Лібурн

Ceva Sante Animale (France)
10 avenue de la ballastiere,
33500 Libourne

14. 02. 2022

8. Назва і місце знаходження виробників

Сева Санте Анімаль (Франція)
10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн

Ceva Sante Animale (France)
10 avenue de la ballastiere, 33500 Libourne

AB7 САНТЕ (Франція)
Чемін де Монж, 31450 Дейм

AB7 SANTE (France)
Chemin des Monges, 31450 Deyme

9. Додаткова інформація

14.02.2022

Вектра 3D
(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення
листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин блідо-жовтого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

динотефуран 54 мг,

перметрин 397 мг,

пірипроксифен 4,48 мг.

Допоміжні речовини: N-октил-2-піролідон, N-метил піролідон.

Фармакологічні властивості

4. Фармакологічні властивості

ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (ATCvet QP53AC54, комбінації перметрину)

Перметрин, що входить до складу препарату, є синтетичним піретроїдом, механізм дії якого полягає у блокуванні проведення нервового імпульсу в організмі ектопаразита за рахунок зниження проникності мембран для іонів натрію, що призводить до незворотного паралічу і його загибелі.

Динотефуран – похідний гуанідину, належить до нейротоксинів класу неонікотиноїдів, діє на постсинаптичні ацетилхолінові рецептори нервової системи, спричиняючи загибель ектопаразитів.

Пірипроксифен – аналог ювенільного гормону, що регулює ріст і розвиток комах, у тому числі і бліх. Механізм його дії полягає в порушенні нормального циклу метаморфози комах: яйце - личинка - лялечка - імаго.

При нашкодженні, речовини, що входять до складу препарату, кумулюються в епідермісі, волосяних фолікулах і жирових залозах, що сприяє довготривалій контактній інсектоакарицидній і репелентній дії.

Застосування

Лікування собак при ураженні блохами блохами (*Ctenocephalides spp.*), вошами (*Linognathus setosus*), волосоїдами (*Trichodectes canis*) та іксодовими кліщами (*Ixodes spp.*, *Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*).

Лікування собак при ураженні мухами-жигалками (*Stomoxys calcitrans*), комарами (*Aedes aegypti*, *Culex pipiens*), мошками (*Simulium galeatum*) й москітами (*Phlebotomus perniciosus*). Інсектицидна та репелентна ефективність триває 1 місяць.

Також препарат рекомендується застосовувати у комплексній терапії алергічного дерматиту, спричиненого укусами бліх.

Інсектицидна ефективність триває протягом 1 місяця, овіцидна та ларвіцидна – 2 місяці.

Репелентна та акарицидна ефективність проти *Rhipicephalus sanguineus* та *Ixodes ricinus* триває 1 місяць, проти *Dermacentor reticulatus* до 3-х тижнів.

Дозування

Препарат застосовують шляхом топікального (крапельного) нанесення на суху непошкоджену шкіру в недоступному для злизування тваринам місці (між лопатками). Мінімальна рекомендована доза становить 6,4 мг динотефурану/кг маси тіла тварини, 0,6 мг пірипроксифену/кг маси тіла тварини та 46,6 мг перметрину/кг маси тіла тварини, що еквівалентно 0,12 мг препарату/кг маси тіла тварини.

Препарат наносять на шкіру в декількох місцях у дозах:

Маса тіла тварини, кг	Колір кришечки аплікатора	Об'єм піпетки, см ³ (мл)	Кількість піпеток, шт.	Кількість нанесень
1,5 – 4,0	Жовтий	0,8	1	1

14.02.2022


4,0 – 10,0	Бірюзовий	1,6	1	2
10,0 – 25,0	Блакитний	3,6	1	3
25,0 – 40,0	Фіолетовий	4,7	1	3
40,0 – 65,0	Червоний	8,0	1	4

Методи та способи нанесення


Спот-он.

Витягнути аплікатор з упаковки.


Крок 1: Утримуючи аплікатор кришечкою догори розміщують пальці обох рук над маленьким та під великим дисками, як показано на малюнку.



Крок 2: Натискають на два диски, з'єднують їх, як показано на малюнку, прокалюючи захисну мембрану.




Крок 3: Розгортають шерсть тварини до шкіри та наносять препарат двома способами, які описані нижче (крок 4).




Крок 4: Препарат наносять одним з двох рекомендованих методів:

4а: Обережно стискаючи стінки аплікатора наносять ветеринарний препарат на шкіру в декілька місць, залежно від маси тіла собаки, починаючи з ділянки між лопатками.




Собаки, масою тіла від 1,5 до 4 кг


14.02.2022



Собаки, масою тіла від 4 до 10 кг




Собаки, масою тіла від 10 до 40 кг



Собаки, масою тіла від 40 кг

АБО

46: Незалежно від маси тіла тварини, проводять умовну лінію і видавлюють вміст аплікатора (препарат) вздовж лінії хребта від кореня хвоста до ділянки між лопатками, як показано на малюнку.



Повторну обробку впродовж сезону активності ектопаразитів проводять за показами, один раз на місяць.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Не застосовувати препарат цуценятам віком до 7 тижнів, собакам масою тіла до 1,5 кг, старим, хворим та ослабленим тваринам!

Категорично забороняється застосовувати препарат котам, оскільки він містить у своєму складі перметрин!

Застереження

Побічна дія

У рекомендованих дозах побічної дії не спостерігали. При передозуванні препаратом рідко спостерігали еритему, свербіж або інші ознаки дискомфорту на місці нанесення.

Ці ознаки можуть бути легкими і тимчасовими. Якщо ознаки зберігаються або погіршуються, слід звернутися за консультацією до ветеринарного лікаря.

14.02.2022

У рідкісних випадках повідомлялося про поведінкові розлади, такі як гіперактивність, вокалізація або тривога, системні ознаки, такі як млявість або анорексія, а також неврологічні ознаки, такі як тремтіння м'язів.

У дуже рідкісних випадках повідомлялося про такі ознаки атаксії, як нестабільний рух.

Про шлунково-кишкові ознаки, такі як блювота або діарея, також повідомлялося дуже рідко.

Про короткочасні косметичні ефекти (мокра шерсть, злипання волосяного покриву) на місці нанесення повідомлялося дуже рідко, проте ці ефекти зазвичай зникають протягом 48 годин.

Особливі застереження при використанні

При утриманні декількох тварин їх необхідно обробляти одночасно.

При утриманні собак і котів в одному приміщенні їх необхідно обробляти одночасно спеціалізованими ветеринарними лікарськими засобами для цих видів тварин.

У разі сильної інфестації блохами, рекомендується також обробляти відповідними інсектицидами місця перебування тварин (лежки, коврики, м'які підстилки, тощо), з подальшим ретельним прибиранням приміщення за допомогою пилососу.

При підозрі на дерматит (свербіж та подразнення шкіри) слід звернутися до ветеринарного лікаря.

Ветеринарний лікарський засіб залишається ефективним при контакті тварин з водою (наприклад, купання, плавання). Контакт з водою, що повторюється щотижня протягом одного місяця і починається через 48 годин після обробки, а також миття шампунем через 2 тижні після обробки тварини не впливають на ефективність препарату. Однак у разі частого миття шампунем або купання/плавання протягом 48 годин після обробки може знизити тривалість ефективності дії препарату.

Використання під час вагітності, лактації

Дослідження застосування препарату під час вагітності та лактації не проводились, тому доцільність його застосування визначає лікар ветеринарної медицини. Лабораторні дослідження кожного з компонентів препарату на щурах та кролях не виявили тератогенного чи фетотоксичного впливу на організм тварини.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не встановлена.

Не рекомендують застосовувати препарат одночасно з іншими аналогічними ветеринарними препаратами!

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, що прийняті при роботі з ветеринарними препаратами. Люди з відомою гіперчутливістю до будь-якого з компонентів препарату повинні уникати роботи із даним препаратом.

Під час обробки тварин забороняється палити, вживати продукти харчування та пити воду. Після закінчення роботи слід ретельно вимити руки теплою водою з милом. Уникати попадання препарату на слизові оболонки. При потраплянні на шкіру та слизові оболонки препарат слід негайно змити проточною водою з милом, при потраплянні всередину – негайно звернутися до лікаря.

Не дозволяється гладити тварину чи допускати до неї маленьких дітей протягом 4 годин після обробки препаратом. Тому рекомендується обробляти собак ввечері, перед вечірньою прогулянкою. У день обробки препаратом собакам не дозволяється спати з власниками, особливо з дітьми. Використані аплікатори слід негайно утилізувати і не залишати в межах видимості чи досяжності для дітей чи тварин.

Якщо подразнення шкіри або очей зберігається, або ветеринарний лікарський засіб випадково потрапив всередину слід негайно звернутися до лікаря та показати йому інструкцію або етикетку на препарат.

Зачекайте, поки місце нанесення препарату висохне, перш ніж дозволити обробленій собаці контактувати з текстилем або меблями у домі.

14.02.2022

Не слід дозволяти собакам купатись у поверхневих водах протягом 48 годин після нанесення препарату, щоб уникнути несприятливого впливу на водні організми.

Форма випуску

Піпетки з алюмінієво-полімерного матеріалу по 0,8; 1,6; 3,6; 4,7; та 8 мл. Піпетки упаковують в картонні коробки по 1, 3, 4, 6, 12, 24 чи 48 шт.

Зберігання

Недоступне для дітей місце за температури від 0 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль (Франція)
10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн

Ceva Sante Animale (France)
10 avenue de la ballastiere, 33500 Libourne

Виробники готового продукту


Сева Санте Анімаль (Франція)
10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн

Ceva Sante Animale (France)
10 avenue de la ballastiere, 33500 Libourne

AB7 SANTE (Франція)
Чемін де Монж, 31450 Дейм

AB7 SANTE (France)
Chemin des Monges, 31450 Deyme

14.02.2022




Standard Tube Template
Albea 00188ABL
12.7 mm diameter

October 2019

MG 00474281-001-000
12.7mm x 39.29mm FPL

PIP VECTRA 3D DOG 1.5-4KG 3P EN UA	VECTRA 3D DOG 1.5-4KG 3P EN UA
45x39.29	ID53127
CODE ARTICLE : A0243-02	
Black	
P124	
P185	
CORPS : 9 pts	
MYTRAV 060372D - 130372D	

14.02.2022



Standard Tube Template

Albea 00185ABL


12.7 mm diameter

October 2019

MG 00474407-001-000
12.7mm x 42.47mm FPL

PP VECTRA 3D DOG 4-10KG 3P EN UA	VECTRA 3D DOG 4-10KG 3P EN UA
4544347	ID53128
CODE ARTICLE : A024742	
Black	
P312	
P185	
CORPS : 9 pts	
MYRIAM 300420 - 050520	

14.02.2022



Standard Tube Template


Albea 00186ABL

12.7 mm diameter

October 2019
MG 00474410-001-000
12.7mm x 58.74mm FPL

PP VECTRA 3D DOG 10.3KG 3P UA EN	VECTRA 3D DOG 10.3KG 3P UA EN
455874	ID53125
Code article - A024042	
Black	
P301	CORP: 5 Pts
P185	
MURIAN 04/05/20 - 05/05/20	

14.02.2022



Standard Tube Template

Albea 00187ABL


12.7 mm diameter

September 2019

MG 00474284-001-000
12.7mm x 67.47mm FPL

PP VECTRA 3D DOG 35-40KG 3P UA EN	VECTRA 3D DOG 25-40KG 3P UA EN
45x67.47	ID53320
Code article : A0250-02	
Black	
P185	CORPS : 9 Pa
MYRIAM 04/05/20 - 05/05/20	

14.02.2022




Standard Tube Template
Albea

PIP VECTRA 3D DOG 40-65KG 3P EN LIA	VECTRA 3D DOG 40-65KG 3P EN LIA
63x61.38	ID5131
Code article : A0356-02	
Black	
P187	
P185	
CORPS : 9 Pts	
MYRIAM 040520 - 060520	



6 |||||

14.02.2022



RECTO

Бектра 3D
Vectra[®] 3D

Піпетки x 1,6 мл (ml)
Pipettes x 1,6 ml

Бектра 3D
Vectra[®] 3D

> 4-10 kg

Ceva


Розчин для зовнішнього застосування.
Тільки для собак масою тіла > 4-10 кг (kg).
Solution for dogs > 4-10 kg.



Ceva



VERSO



Бектра 3D

Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення
№ AA-03086-03-12

14.02.2022

Застосовувати тільки для собак масою тіла > 4-10 кг (kg). Використовувати тільки для собак масою тіла > 4-10 кг (kg). Використовувати тільки для собак масою тіла > 4-10 кг (kg).

Склад
Активні речовини:
Дететра-100 (100 мг/мл)
Дететра-100 (100 мг/мл)

Дозування
Використовувати тільки для собак масою тіла > 4-10 кг (kg). Використовувати тільки для собак масою тіла > 4-10 кг (kg). Використовувати тільки для собак масою тіла > 4-10 кг (kg).

Протипоказання
Не застосовувати препарат собакам, які мають алергію на будь-який з компонентів препарату. Не застосовувати препарат собакам, які мають алергію на будь-який з компонентів препарату.

Застереження
Не застосовувати препарат собакам, які мають алергію на будь-який з компонентів препарату. Не застосовувати препарат собакам, які мають алергію на будь-який з компонентів препарату.

Звернення
Суміш препаратів не вживати разом з іншими препаратами. Суміш препаратів не вживати разом з іншими препаратами. Суміш препаратів не вживати разом з іншими препаратами.

Термін придатності
3 роки. Термін придатності 3 роки. Термін придатності 3 роки. Термін придатності 3 роки. Термін придатності 3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині
Використовувати тільки для собак масою тіла > 4-10 кг (kg). Використовувати тільки для собак масою тіла > 4-10 кг (kg). Використовувати тільки для собак масою тіла > 4-10 кг (kg).

Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.

Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.

Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.

Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.

Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.

Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.

Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.

Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.

Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.

Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.


Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.

Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.

Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.

Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.

Виробник
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Vallée, 33000 Bordeaux, France.



Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення
№ AA-03086-03-12

14.02.2022

VERSO

RECTO

Піпетки x 8,0 мл
Pipettes x 8,0 ml

40-65 kg

Бектра 3D
Vectra 3D



Бектра 3D
Vectra 3D

40-65 kg

Бектра 3D
Vectra 3D



Розчин для зовнішнього застосування.
точного нанесення
для собак масою тіла > 40 кг (kg)
Spot-on solution for dogs > 40 kg



Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Stable fly

Use of agents: Fleas, Ticks, Mosquitoes, etc. as well as the treatment of allergic dermatitis caused by ticks.

COMPOSITION

Substance (mg/ml)	Quantity (mg/ml)
Permethrin	1
Imidacloprid	1
Pyriproxyfen	1

INDICATIONS

For the treatment of flea infestation, tick infestation, mosquito infestation, and allergic dermatitis caused by ticks.

CONTRAINDICATIONS

Do not use animals with hypersensitivity to the active ingredients.

WARNINGS

Do not use animals with hypersensitivity to the active ingredients.

STORAGE

Store at 15-25°C.

EXPIRATION DATE


24 months.

FOR VETERINARY USE ONLY!

Виробничий готовий продукт АВ7 САНТЕ, Чешня де Нюва, 31450 Дюна, Франція.
Ceva Santé Animale, 10 avenue de la Grande Vallée, 33140 Dyrme, France.
Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la Grande Vallée, 33140 Dyrme, France.



VERSO



Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення
№ AA-03086-03-12

14.02.2022