

08.04.2022

Сарафлокс
(водорозчинний порошок для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Порошок білого або світло-жовтого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:
сарафлоксацину гідрохлорид — 100 мг.
Допоміжні речовини: мальтодекстрин.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01MA98 - Сарафлоксацин.

Сарафлоксацин належить до антибіотиків групи фторхінолонів. Механізм його бактерицидної дії зумовлений гальмуванням активності ДНК-гірази (топоізомерази II типу у грамнегативних бактерій та топоізомерази IV типу у деяких грампозитивних бактерій), яка забезпечує реплікацію ДНК в ядрах мікробних клітин та їхній подальший поділ. Гальмування її активності призводить до блокування біосинтезу в клітинах бактерій та загибелі патогенних мікроорганізмів.

Сарафлоксацин має широкий спектр бактерицидної дії проти грампозитивних (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*) та грамнегативних (*E. coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Campylobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella spp.*, *Yersinia spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Enterobacter spp.*, *Ornithobacterium spp.* та ін.) мікроорганізмів і *Mycoplasma spp.*, включаючи види, резистентні до бета-лактамних антибіотиків, тетрациклінів, макролідів та аміноглікозидів. Сарафлоксацин є одним з основних засобів у протоколах лікування колібактеріозу та сальмонельозу у птиці. Порівняно з норфлораксацином, сарафлоксацин у чотири рази активніший щодо грамнегативних та у два рази активніший щодо грампозитивних мікроорганізмів. Відносно анаеробів він активніший за ципрофлоксацин.

Сарафлоксацин швидко всмоктується з травного каналу у кров та проникає в усі органи та тканини організму. При пероральному застосуванні бройлерам біодоступність сарафлоксацину становить $59,6 \pm 13,8\%$. Максимальна концентрація сарафлоксацину в крові досягається через 1,5-3 години після вживання. Період напіввиведення у бройлерів становить $3,89 \pm 1,19$ годин. У печінці птиці в незначній кількості метаболізується до сульфамінових та глюкоронідних сполук. Біологічний період напіврозпаду триває 30,13 години. Виводиться в основному з послідом та нирками переважно в незміненому вигляді.

Застосування

Лікування свійської птиці (курчат, бройлерів, ремонтного молодняку курей) за колібактеріозу, сальмонельозу, некротичного ентериту, септицемії, стафілококозу, стрептококозу, мікоплазмозу, гемофільозу, пастерельозу, ускладнень бактеріальними інфекціями вірусних захворювань, неспецифічних захворювань органів дихання, травного каналу та сечостатевої системи, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до сарафлоксацину.

Дозування


Перорально з кормом або питною водою у дозі 0,5 г на 10 кг маси тіла (5 мг сарафлоксацину гідрохлориду на 1 кг маси тіла). Курс лікування — 3 доби; за сальмонельозу можливе продовження курсу до 4-5 діб. Залежно від норми добового споживання кормів та води доза препарату становить 25-50 г на 50 кг корму або 100 л питної води.

При лікуванні водними розчинами їх готують безпосередньо перед застосуванням і птиця повинна пити лише воду з препаратом.

Щоб при використанні медикаторів (дозатронів) препарат повністю розчинявся у воді, добову дозу ділять на 3-5 порцій залежно від типу медикатора.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до сарафлоксацину.



08.04.2022

Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких призначені для споживання людьми.

Не застосовувати одночасно з теофіліном, кофеїном, хлорамфеніколом, тіамфеніколом та флуорфеніколом.

Не застосовувати для профілактики.

Застереження

Побічна дія

При використанні у рекомендованих дозах побічних явищ, як правило, не спостерігається.

Особливості застереження при використанні

Перед застосуванням препарату рекомендують проводити бактеріологічне підтвердження діагнозу та визначення чутливості збудника захворювання до сарафлораксацину.

Період виведення (каренція)

Забій птиці на м'ясо дозволяють через 10 діб після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Пакети або контейнери із полімерних матеріалів по 10, 50, 100, 500 або 1000 г.

Зберігання

Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 8 °С до 15 °С.

Термін придатності

2 роки. Після відкриття флакона — 30 діб. Термін придатності після розчинення у воді або змішування з кормом — 24 години.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна