



МАЗЬ САНОФІТ (мазь) листівка-вкладка

Опис

Однорідна мазь від світло-зеленого до зеленого кольору зі специфічним запахом.

Склад

100 г препарату містять діючі речовини, (г):	
хлорофіліпт, олійний р-н 2%	- 5,0;
олію евкаліпта ефірну	- 3,22;
олію лавра ефірну	- 1,21;
олію розмарину ефірну	- 0,16;
камфору рацемічну	- 0,16;
ментол кристалічний	- 0,08.

Допоміжні речовини: олія кедра ефірна, вазелін.

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QD02A Дерматологічні ветеринарні препарати. Препарати із захисною і пом'якшувальною дією.

Завдяки комбінації діючих речовин препарат має антисептичну, протизапальну і протинабрякову дії.

Фармакологічна дія мазі насамперед обумовлена наявністю ефірних олій. Загальною властивістю ефірних олій є їх антисептична активність, яка розповсюджується практично на всі групи мікроорганізмів: грампозитивні і грамнегативні коки, вібріони, віруси, найпростіші, мікроскопічні гриби. Мікроорганізми практично не розвивають до них резистентності, навіть при тривалому застосуванні. Це пояснюється руйнуючим впливом ефірних олій на цитоплазматичну мембрану, пошкодженням механізмів захисту і адаптації мікробної клітини. Крім того, антибактеріальна активність ефірних олій поєднується з цілковитою безпекою для макроорганізму.

Хлорофіліпт – це олійний розчин хлорофіліпту 2%, який одержано з листя евкаліпту. Він має протизапальну, антисептичну дії, антибактерійну активність по відношенню до антибіотикостійких стафілококів, знімає набряки, стимулює процеси кровотворення, регенерації тканин, фагоцитарну активність лейкоцитів і клітин сполучної тканини.

Камфора при місцевому застосуванні помірно подразнює нервові закінчення, при тривалому впливі на шкіру знижує чутливість рецепторів шкіри, зменшує міграцію лейкоцитів у місце запалення. Діє бактеріостатично, особливо на кокові форми.

Ментол підсилює місцеву дію ефірних олій, має заспокійливу, легку місцеву знеболювальну та антисептичну дії. При місцевому застосуванні звужує судини шкіри. Мазь має антисептичну, протизапальну і протинабрякову дії, швидко всмоктується в місцях нанесення, підсилює місцевий кровообіг, активізує живлення шкіри, чим сприяє загоєнню мікротравм. Захищає шкіру вимені від шкідливих впливів навколишнього середовища (холоду, вологи, вітру), а також від укусів комах. Після застосування мазі шкіра стає пружною, м'якою, не тріскається.

Застосування

МАЗЬ САНОФІТ застосовують зовнішньо місцево коровам, кобилам, вівцяматкам, козам:



- із профілактичною метою для попередження запальних процесів шкіри молочної залози, особливо при не дотриманні санітарно-гігієнічних вимог, порушенні правил машинного доїння;
- у комплексній терапії клінічно виражених форм субклінічного маститу (втирання мазі поєднують із масажем молочної залози тоді, коли масаж не є протипоказаним);
- для відлякування комах від вимені при випасанні худоби у літніх таборах;
- для лікування і профілактики за мікротравм, тріщин діжок, а також за обвітрювання, дерматитах тріщин вимені;
- у комплексній терапії серозного набряку вимені, папілом діжок та вимені, гематом вимені;
- для масажу сфінктера дійкового каналу при лакторемії (самовільному витіканні молока);
- у комплексній терапії флебітів, парафлебітів, лімфангітів, тендинітів.

МАЗЬ САНОФІТ застосовують для обробки рук акушера або рукавиць акушера при наданні рододопомоги та акушерсько-гінекологічних маніпуляціях, змащування рук доярок та вим'я первісток при ручному роздоюванні.

Дозування

Мазь застосовують зовнішньо місцево.

Кількість препарату залежить від площі ділянки нанесення.

Вим'я та дійки після кожного здоювання змащують невеликою кількістю мазі. За потреби доярка змащує руки після доїння.

У комплексній терапії маститу при перших ознаках захворювання вим'я та дійки інтенсивно змащують і масажують до повного всмоктування мазі. Процедуру слід повторювати через кожні 4 години до зникнення клінічних ознак захворювання.

В інших випадках мазь наносять на уражені місця 2–3 рази на добу і втирають до повного її всмоктування. При тріщинах, опіках, укусах комах уражені місця змащують товстим шаром мазі. Процедуру повторюють до зникнення симптомів. Можна захищати змащені хворі місця бинтовою пов'язкою для уникнення додаткового їх травмування під час злизування мазі твариною.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Період виведення (каренції)

Не вимагається.

Застереження

Уникати потрапляння препарату в очі.

Форма випуску

Туби ламінатні по 50, 100 та 200 г.

Зберігання

У сухому темному, недоступному для дітей місці за температури від 8 до 25°C.

Термін придатності препарату — 3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ «ВП «Укрзооветпромстач»

вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка, Бучанський р-н, Київська обл., 08030, Україна

www.ukrzoovet.com.ua

Виробник готового продукту:

ТОВ «ВП «Укрзооветпромстач»

вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка, Бучанський р-н, Київська обл., 08030, Україна

www.ukrzoovet.com.ua

