

ЗІНОЛ 1%
(порошок для перорального застосування, гранульований)
листівка-вкладка

Опис

Гранульований порошок від сірувато-білого до коричневого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

нозігептид - 10 мг.

Допоміжна речовина: кальцію карбонат.

Фармакологічні властивості

ATCvetQA07A— протимікробні ветеринарні препарати, що застосовуються при кишкових інфекціях.

Діючою речовиною препарату є нозігептид - антибіотик групи поліпептидів, продукується бактеріями *Streptomyces actuosus*.

Діє бактерицидно на грампозитивні мікроорганізми: *Clostridium perfringens*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, а також на деякі грамнегативні мікроорганізми: *Pasteurella multocida*, *Neisseria catarrhalis*,

Механізм дії антибіотика полягає в порушенні бактеріального синтезу білків, а саме на 50S рибосомні субодиниці і міцно зв'язує комплекс 23S рРНК з рибосомальним білком L11.

Нозігептид не всмоктується з травного тракту, тому діє виключно на мікрофлору кишечника. Пригнічує розвиток мікроорганізмів, що продукують аміак, тим самим сприяє зниженню рівня аміаку в травному каналі.

Резистентність бактерій до діючої речовини розвивається повільно. Не виявлено резистентності в *Clostridium perfringens*. У мікроорганізмів не спостерігається перехресної резистентності з іншими антибактеріальними препаратами.

У травному каналі створюється висока концентрація нозігептиду, що сприяє тривалому антибактеріальному ефекту. Нозігептид не всмоктується у травному каналі, не накопичується в органах та тканинах, виводиться з організму у незміненому вигляді з фекаліями.

Застосування

Лікування декоративної птиці (голубів), хворих на некротичний ентерит, що спричинений *Clostridium perfringens*, чутливою до нозігептиду.

Дозування

Перорально з кормом у дозах:

голуби - 0,20-0,25 г препарату на 1 кг корму (що відповідає 2,0 - 2,5 мг нозігептиду на 1 кг корму) протягом 5-7 діб. Корм з препаратом повинен бути єдиним джерелом годівлі протягом всього періоду застосування препарату!

За необхідності курс лікування може бути повторений.

Протипоказання

Підвищена чутливість до нозігептиду.

Не застосовувати продуктивним тваринам!

Застереження

Особливі застереження при використанні

Перед застосуванням препарату рекомендовано провести тест на чутливість бактерій, виділених від хворої птиці, до нозігептиду.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не рекомендовано застосовувати одночасно з сильними окиснювачами.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Під час роботи з препаратом слід дотримуватися загальних правил особистої гігієни та техніки безпеки, передбачених для лікарських засобів. Всі роботи слід проводити з використанням спецодягу і засобів індивідуального захисту, після випадкового потрапляння препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно негайно змити струменем проточної води. Після потрапляння препарату в очі, промити їх великою кількістю проточної води і звернутися до лікаря.

Форма випуску

Пакети з поліетиленової плівки по 1, 10, 50, 100 г.

Зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці за температури від 5 до 30 °С та відносної вологості повітря не більше 70%..

Термін придатності: 2 роки.

Термін придатності препарату після першого відкриття (відбору) становить 2 роки.

Після змішування з кормом препарат слід використати протягом 12 тижнів.

Власник реєстраційного посвідчення:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

Україна, 61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30

Виробники готового продукту:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

Україна, 61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30

ЧЖЕЦЗЯН ДАЯН БАЙОТЕК
ГРУП КО., ЛТД.
№ 22, ЧЖАОЯН РОУД, ДАЯН
ТАУН, ЦЗЯНЬДЕ СІТІ,
ХАНЧЖОУ, ЧЖЕЦЗЯН,
Китайська Народна Республіка

ZHEJIANG DA YANG BIOTECH
GROUP CO., LTD
NO. 22, ZHAOYANG ROAD, DA
YANG TOWN, JIANDE CITY,
HANGZHOU, ZHEJIANG, People's
Republic of China