

ДОРАМАКС
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Масляниста рідина від безбарвного до жовтуватого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

дорамектин - 10,0 мг.

Допоміжні речовини: етилолеат, бутилгідроксианізол, спирт бензиловий, бавовняна олія.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP54, ендектоциди (QP54AA03, дорамектин)

Діючою речовиною препарату є дорамектин — макроциклічний лактон, напівсинтетичний похідний групи авермектинів. Дорамектин проявляє широкий спектр системної нематодоцидної, інсектицидної та акарицидної дії, має ларвоцидні та овоцидні властивості. Модулює активність іонів хлору в нервовій системі і м'язах нематод та членистоногих. Зв'язуючись зі специфічними рецепторами, збільшує проникність синаптичних мембран для іонів хлору, що призводить до блокади активності нервових та м'язових клітин нематод і членистоногих, що призводить до паралічу і загибелі паразитів. У ссавців ці рецептори локалізовані лише в центральній нервовій системі, а дорамектин не проникає через гемато-енцефальний бар'єр і, тому в рекомендованих дозах є безпечним для ссавців.

Дорамектин у рекомендованих дозах не має мутагенної, тератогенної і ембріотоксичної дії.

Дорамектин легко резорбується із місця введення, має високу ефективність і не викликає негативного впливу на організм тварин. Фармакокінетичні особливості дорамектину забезпечують збереження його терапевтичних концентрацій у крові тварин і тривалий час захищають від реінвазії. Пролонгована дія дорамектину удвічі триваліша, порівняно з іншими авермектинами.

Застосування

Лікування і профілактика великої рогатої худоби, овець, свиней при захворюваннях, спричинюваних нематодами та ектопаразитами:

Велика рогата худоба - захворювання, викликані:

- нематодами травного каналу (дорослі і личинки 4-ої стадії):

Ostertagia spp., *Cooperia* spp., *Haemonchus placei*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Oesophagostomum radiation*, *Strongyloides papillosus*, *Trichuris skrjabini*;

- нематодами дихальних шляхів (дорослі і личинки 4-ої стадії): *Dictyocaulus viviparus*;
- нематодами очей (статевозрілі): *Thelazia* spp.;
- нематодами підшкірної клітковини: *Parafilaria bovicola*;
- саркоптоїдними кліщами: *Psoroptes bovis*, *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes bovis*;
- личинками підшкірного овода (паразитичні стадії): *Hypoderma bovis*, *H. lineatum*;
- безкрилими комахами (вошами) - *Linognathus vituli*, *Haematopinus euesternus* та волосоїдами - *Bovicola bovis*.

Вівці - захворювання, викликані:

- нематодами травного каналу (дорослі і личинки 4-ої стадії):

Chabertia ovina, *Cooperia* spp., *Haemonchus contortus*, *Nematodirus* spp., *Ostertagia* (*Teledorsagia*) spp., *Trichostrongylus* spp., *Oesophagostomum columbianum*, *Strongyloides papillosus*, *Trichuris* spp.;

- нематодами дихальних шляхів (дорослі і личинки 4-ої стадії): *Dictyocaulus filaria*, *Muellerius capillaris*, *Protostrongylus* spp.;
- саркоптоїдними кліщами: *Psoroptes ovis*, *Chorioptes ovis*, *Sarcoptes ovis*;
- личинками овечого овода (паразитичні стадії): *Oestrus ovis*;
- безкрилими комахами - вошами: *Linognathus ovillus*, *L. pedalis*, *Haematopinus euryesternus* та волосоїдами - *Bovicola ovis*.

Свині - захворювання, викликані:

- нематодами травного каналу (дорослі і личинки 4-ої стадії): *Ascaris suum*, *Oesophagostomum* spp., *Hyostomylus rubidus*, *Strongyloides ransomi*, *Trichuris suis*

- нематодами дихальних шляхів (дорослі і личинки 4-ої стадії): *Metastrongylus* spp.
- саркоптоїдозними кліщами: *Sarcoptes suis*;
- безкрилими комахами (вошами): *Haematopinus suis*.

Дозування

Велика рогата худоба: 1 мл препарату на 50 кг маси тіла (еквівалентно 200 мкг дорамектину на кг маси тіла) одноразово підшкірно в ділянку шиї.

Вівці: 1 мл препарату на 50 кг маси тіла (еквівалентно 200 мкг дорамектину на кг маси тіла) одноразово внутрішньом'язово; при захворюваннях викликаних *Psoroptes ovis* та *Nematodirus* spp. (статевозріла стадія) - 1 мл препарату на 33 кг маси тіла (еквівалентно 300 мкг дорамектину на кг маси тіла) одноразово внутрішньом'язово.

Свині: 1 мл препарату на 33 кг маси тіла або 0,3 мл/10 кг маси тіла (еквівалентно 300 мкг дорамектину на кг маси тіла) одноразово внутрішньом'язово.

Поросята масою тіла до 16 кг і менше - в дозі (таблиця):

Маса тіла поросят, кг	Доза, мл
<4	0,1
5-7	0,2
8-10	0,3
11-13	0,4
14-16	0,5

Максимальний об'єм ін'єкції для кожного виду:

Велика рогата худоба: 5 мл на місце ін'єкції;

Вівці: 1,5 мл на місце ін'єкції;

Свині: 2,5 мл на місце ін'єкції.

Протипоказання

Підвищена чутливість до складових препарату.

Не можна застосовувати препарат самкам під час лактації, якщо молоко застосовується в їжу людям!

Не можна застосовувати препарат тільким коровам і телицям за 60 діб до розтелу!

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяють після останнього введення препарату: великої рогатої худоби і овець - через 35 діб, свиней - через 28 діб. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Не застосовувати тваринам, молоко яких призначене для споживання людьми.

Форма випуску

Флакони з нейтрального скла марки НС-1, НС-2, УСП-1, закриті гумовими корками під алюмінієву обкатку по 10; 20; 50; 100 мл. Вторинна упаковка - картонна коробка.

Зберігання

Суше, захищене від світла місце, за температури від 5 до 25 °С. Окремо від кормів та харчових продуктів, у недоступному для дітей та тварин місці.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30, Україна

Виробник готового продукту:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30, Україна