

06.05.2025

Ветдерм
(суспензія для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Суспензія від світло-жовтого до темно-жовтого кольору.

Склад

1 мл препарату містить активно діючі речовини (мг):

тріамцинолон	- 1,0;
піридоксину гідрохлорид	- 2,0;
рибофлавін	- 4,0;
нікотинамід	- 10,0;
метіонін	- 20,0;
кислоту бурштинову	- 2,0.

Допоміжні речовини: тілоза, твін-80, натрію бензоат, калію сорбат, ксантанова камедь, гліцерин, аспартам, пропіленгліколь, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

ATC vet класифікаційний код: QD07XB - Кортикостероїди помірно активні, інші комбінації. QD07XB02 - Тріамцинолон.

Тріамцинолон — синтетичний флуорвмісний глюкокортикоїд з вираженою протизапальною, протиалергічною, десенсибілізуючою та антитоксичною дією.

Протизапальні властивості тріамцинолону обумовлені стабілізацією мембран клітин, у тому числі, лаброцитів, і органел (лізосом), пригніченням активності фосфоліпази А2, припиненням вивільнення арахідонової кислоти з фосфоліпідів клітинних мембран і зниженням рівня продуктів її метаболізму. Тріамцинолон пригнічує гіалуронову кислоту, гальмує поділ лаброцитів і зменшує їх дегрануляцію, пригнічує синтез фактора активації тромбоцитів і проліферацію сполучної тканини. Завдяки зниженню кількості Т- і В-лімфоцитів, порушенню їхньої взаємодії, зупиненню міграції В-лімфоцитів, забезпечує імунодепресивну і протиалергічну дію. Зменшує вміст імунoglobulinів у сироватці крові, пригнічує кооперацію фагоцитів і лімфоцитів. Протишокова і антитоксична дія тріамцинолону базується на зниженні проникності ендотелію судин, мембранопротективних властивостях та активації ферментів печінки, які беруть участь у метаболізмі ендо- та ксенобіотиків.

Біодоступність тріамцинолону після перорального застосування становить 20-30 %. Дія починається через 1-2 години та триває 6-8 годин. Період напіввиведення з сироватки крові становить 2-5 годин, із тканин — 18-36 годин. Тріамцинолон на 40 % зв'язується з білками сироватки крові, в основному з глобулінами. Метаболізується у печінці, невелика кількість — у нирках. Виводиться з організму в основному з сечею у вигляді неактивних метаболітів.

Нікотинамід (вітамін РР), рибофлавін (вітамін В2) і піридоксин (вітамін В6) відіграють важливу роль в обміні речовин, беруть участь в клітинних окисно-відновних реакціях амінокислот. Значно покращують стан шкірного покриву, особливо при себореїному дерматиті і пелагрі. Легко всмоктуються в тонкому кишечнику і виводяться з сечею у вигляді різних метаболітів.

Метіонін — незамінна амінокислота, є джерелом сульфгідрильних і метильних груп, має ліпотропну дію (попереджає накопичення жиру в печінці при недостатності холіну, який бере

06.05.2025

участь у синтезі фосфоліпідів). Знешкоджує токсичні продукти обміну речовин шляхом метилювання і транссульфування.

Бурштинова кислота прискорює процеси регенерації пошкоджених клітин шкіри, стимулює і нормалізує енергетичний та пластичний обміни, має антитоксичну дію, підсилює біохімічні і фізіологічні відновні процеси в епідермісі та усуває метаболічний ацидоз у тканинах.

Застосування

Лікування собак і котів за запальних, алергічних, аутоімунних та інших захворювань шкіри.

Дозування

Препарат застосовують тваринам перорально один раз на добу, під час ранішньої годівлі з невеликою кількістю корму або вводять безпосередньо на корінь язика за допомогою шприца-дозатора у дозах:

Вид тварини	Маса тіла тварини (кг)	Добова доза препарату (на тварину, мл)
Собаки	до 10	0,5
	10-20	1,0
	20-30	1,5
	30-40	2,0
	більше 40	2,0
Коти	1-3	0,25
	3 і більше	0,5

Перед застосуванням флакон із препаратом слід ретельно струсити. Впродовж перших 4 діб препарат застосовують у дозах наведених в таблиці, впродовж наступних 8 діб - дозу препарату зменшують в два рази.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам, чутливим до компонентів препарату.

Не застосовувати одночасно з іншими кортикостероїдними препаратами.

Не застосовувати тваринам за системних грибкових уражень, гострих інфекційних захворювань, за діабету, а також із захворюваннями травного каналу та порушеннями функції нирок.

Не рекомендується застосовувати вагітним і лактуючим тваринам, а також кошенят до 2-місячного і цуценят до 3-місячного віку.

Не рекомендується застосовувати в періоди щеплення, особливо живими противірусними вакцинами.

Застереження

Побічна дія

При застосуванні препарату в рекомендованих дозах побічних явищ та ускладнень у тварин, як правило, не спостерігається. Рідко, у окремих тварин, при підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів препарату, можливе виникнення блювання, пригнічення, слинотечі, розлад травлення. У цих випадках застосування препарату припиняють.

Особливості застереження при використанні

Перед застосуванням флакон із препаратом слід ретельно струсити.

06.05.2025

У зв'язку з фармакологічними властивостями діючої речовини необхідна особлива обережність при застосуванні препарату тваринам з ослабленим імунітетом. Під час лікування кортикостероїди можуть викликати синдром Кушинга.

Форма випуску

Полімерні флакони по 10 або 15 мл, закриті кришками з різьбою та контролем першого відкриття.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце, за температури від 4 до 25 °С.

Термін придатності після першого відкривання (відбору) — 28 діб.

Термін придатності — 2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ “БРОВАФАРМА”

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київської обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту:

ТОВ “БРОВАФАРМА”

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київської обл., 07400, Україна