

06.05.2025

Сексанет
(краплі для перорального застосування, суспензія)
листівка-вкладка

Опис

Суспензія білого або світло-жовтого кольору, однорідна.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

мегестролу ацетат — 40,0 мг.

Допоміжні речовини: поліетиленгліколь-1500, полісорбат-80, камедь ксантанова, натрію бензоат, лимонна кислота, натрію цитрат, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код: QG03AC05 — мегестрол.

Мегестролу ацетат — синтетичний прогестаген, який блокує секрецію гонадотропних фолікуло-стимулюючого (ФСГ) та лютеїнізуючого (ЛГ) гормонів, які продукує передня доля гіпофізу. Через нестачу цих гормонів у самок затримується дозрівання фолікулів в яєчниках, а у самців блокується синтез тестостерону, внаслідок чого припиняється тічка і статевий потяг у тварин. Крім антигонадотропної дії, яка клінічно проявляється затриманням тічки, мегестрол має прогестагенну дію — прямо впливає на ендометрій матки, гальмує імплантацію зародка та забезпечує контрацептивні властивості препарату.

У самців мегестрол блокує синтез тестостерону, знижує їхню статеву активність та пов'язані з нею неспокій, підвищену збудливість і агресивну поведінку.

Мегестролу ацетат швидко і повністю всмоктується у кишечнику та через 2-3 години після застосування досягає максимальної концентрації в плазмі крові. Затримується в організмі до трьох діб. Невелика кількість депонується у жировій тканині. Біотрансформується у печінці і виводиться з організму у вигляді метаболітів з сечею (50-70%), калом (30%) і через дихальні шляхи.

Застосування

Застосовують кішкам і сукам для попередження або припинення тічки та/або попередження небажаної вагітності, котам і кобелям — для пригнічення статевого потягу, коригування небажаної поведінки (підвищена збудливість, агресивність, схильність до блукання тощо).

Дозування

Використовують перорально з кормом або примусово на корінь язика:

кішки:

- попередження тічки — 4 краплі (0,125 мл) через 2 тижні або по 2 краплі (0,0625 мл) щотижня, але не довше 18 місяців;

- припинення тічки — 4 краплі (0,125 мл), щоденно, 3-5 днів, до зникнення проявів тічки (розпочинати не пізніше, ніж на третій день з моменту прояву ознак статевого збудження);

- контрацепція — 4 краплі (0,125 мл), в перший день після спарювання;

суки:

- попередження тічки — 4 краплі (0,125 мл) на 10 кг маси тіла, щоденно, за 7-10 діб до її початку, але не довше чотирьох тижнів;

- припинення тічки — 8 крапель (0,25 мл) на 10 кг маси тіла, протягом перших 3-х днів з моменту прояву ознак статевого збудження та 4 краплі (0,125 мл) протягом наступних 7-ми днів;

- контрацепція — 8 крапель (0,25 мл) на 10 кг маси тіла, щоденно, в перші дві доби після спарювання;

коти:

- заспокоєння при статевому збудженні — 4 краплі (0,125 мл), протягом перших 5-7 днів, повторювати кожні 7 днів;

кобелі:

06.05.2025

- заспокоєння при статевому збудженні — 8 крапель (0,25 мл) на 10 кг маси тіла, щоденно, протягом перших 5 днів, з наступним зменшенням денної дози до 4 крапель (0,125 мл) на 10 кг маси тіла.

Протипоказання

Не застосовувати за захворювань статеві системи (піометра, метрит, ендометрит тощо), за наявності пухлин молочної залози, діабету, нестатевозрілим, вагітним та лактуючим тваринам.

Не використовувати, якщо після настання тічки пройшло більше як 3 доби, та молодняку тварин в першу тічку через складність визначення початку циклу.

Застереження

Побічна дія

При застосуванні у рекомендованих дозах побічної дії не спостерігається.

При тривалому використанні препарату можливі зміни у характері тварини, збільшення молочних залоз, підвищення апетиту і збільшення маси тіла тварини.

Період виведення (каренція)

Застосовують непродуктивним тваринам.

Форма випуску

Поліетиленові, скляні або полімерні флакони з крапельницею по 5, 10 мл.

Вторинна упаковка – пачка на 1 флакон.

Зберігання

У сухому темному, недоступному для дітей місці за температури від 4 до 25 °С.

Після відкриття флакона препарат зберігати щільно закритим у холодильнику та використати протягом місяця.

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ “БРОВАФАРМА”

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400

Виробник готового продукту:

ТОВ “БРОВАФАРМА”

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400