



АЛЬБЕНДАЗОЛ-250 з ароматом яловичини (таблетки) листівка-вкладка

Опис

Плоскоциліндричні таблетки без оболонки, кремово-білого або сіро-білого кольору з рискою, з ароматом яловичини.

Склад

1 таблетка (0,5 г) містить діючу речовину: альбендазол – 250 мг.
Допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, пудра цукрова, кро-сповідон, кальцію стеарат, аеросил, ароматизатор «яловичина».

Фармакологічні властивості

ATCvet код QP52A, протитрематодні, протинематодні і протицестодні ветеринарні препарати. QP52AC11- Альбендазол.

Альбендазол належить до групи бензімідазолів, які гальмують полімеризацію тубуліну в мікротубуліні, в результаті чого порушується надходження і внутріклітинне транспортування поживних речовин і продуктів обміну речовин (аденозинтрифосфornoї кислоти і глюкози), а також знижуються мітохондріальні реакції шляхом гальмування фумаратредуктази, що викликає загибель паразитів.

Альбендазол погано всмоктується за внутрішнього застосування, біодоступність за застосування натщесерце становить близько 5%, за згодовування корму, що містить альбендазол, біодоступність зростає в 5 разів. Максимальна концентрація в крові досягається протягом 2–5 годин. Високі концентрації препарату створюються в сечі, жовчі, спинномозковій рідині, печінці. Препарат добре проникає через гематоенцефалічний бар'єр. Альбендазол проникає через плацентарний бар'єр і виділяється з молоком. Зв'язується з білками плазми крові на 70%. Альбендазолу сульфоксид у печінці перетворюється в альбендазолу сульфон (вторинний метаболіт) та інші окиснені продукти. Період напіввиведення (T_{1/2}) альбендазолу сульфоксиду – 8–12 годин.

Виводиться альбендазол з організму переважно з жовчю, частково з сечею. Період напіввиведення препарату складає в середньому 8,5 годин; при порушенні функції печінки цей час може збільшуватись.

Застосування

Профілактика та лікування собак, котів та хутрових звірів за інвазійних захворювань, викликаних:

нематодами шлунково-кишкового тракту: *Toxocara* spp., *Toxascaris* spp., *Uncinaria* spp., *Ancylostoma* spp., *Trichuris* spp.;

цестодами: *Taenia solium*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllbothrium latum*;

трематодами: *Opisthorchis felinus*.

Дозування

Препарат тваринам застосовують перорально, індивідуально в будь-яку пору року шляхом безпосереднього згодовування, згодовування разом з кормом або примусового введення в ротову порожнину (на корінь язика).



Рекомендована доза – 1 таблетка на 10 кг маси тіла тварини. Для лікування тварин за *нематодозів* та *цестодозів* препарат застосовують дворазово, з інтервалом – 7–8 діб у дозі 0,5 таблетки на 5 кг маси тіла. За *трематодозів* препарат застосовують дворазово, з інтервалом – 7–8 діб у дозі 1,0 таблетки на 5 кг маси тіла тварини. Для здійснення профілактичних дегельмінтизацій препарат застосовують одноразово через кожні 3 місяці в тих самих дозах.

Протипоказання

АЛЬБЕНДАЗОЛ-250 з ароматом яловичини протипоказаний при індивідуальній чутливості до компонентів препарату, хворим на інфекційні хвороби, виснаженим тваринам.

Передозування

За передозування препарату в 5 і більше разів від терапевтичної дози альбендазол викликає наступні симптоми передозування: діарея, анорексія, атаксія, підвищення температури тіла, кома. Рекомендується симптоматичне лікування.

Застереження

Побічна дія

За застосування препарату АЛЬБЕНДАЗОЛ-250 з ароматом яловичини можливі наступні побічні ефекти:

- алергічні реакції: висипання на шкірі, гарячка, рідко свербіж шкіри;
- з боку травної системи: нудота, блювання, біль у животі, метеоризм, діарея, запор;
- з боку нервової системи: запаморочення, сонливість, судоми;
- з боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпертензія, тахікардія;
- з боку сечовидільної системи: рідко гостра ниркова недостатність, протеїнурія.

Особливі застереження при використанні

АЛЬБЕНДАЗОЛ-250 з ароматом яловичини протипоказаний при індивідуальній чутливості до компонентів препарату, на ранніх етап вагітності, хворим на інфекційні хвороби, виснаженим тваринам.

АЛЬБЕНДАЗОЛ-250 з ароматом яловичини не слід застосовувати одночасно з іншими протипаразитарними препаратами, а також дексаметазоном і циметидином.

Використання під час вагітності, лактації

Не застосовувати тваринам під час вагітності і лактації.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Під час роботи з препаратом необхідно дотримуватись загальних санітарно-гігієнічних правил роботи з ветеринарними препаратами.

Період виведення (каренції)

Не регламентується.

Форма випуску

По 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці.

Зберігання

У сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 5 до 25°C.

Термін придатності – 3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник:

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпочач»

вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка,

Бучанський р-н, Київська обл.,

08030, Україна

www.ukrzoovet.com.ua

