

06.02.2023

Бровалевамізол 8% порошок
(порошок для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Водорозчинний порошок білого або злегка жовтого кольору.

Склад

1 г порошку містить діючу речовину:

левамізолу гідрохлорид — 80 мг.

Допоміжна речовина: мальтодекстрин.

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QP52 — антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AE01 — левамізол).

Левамізолу гідрохлорид — синтетична сполука із групи імідазотіалів. Гальмує фермент основного обміну фумаратредуктазу й утворення АТФ, паралізує нервові вузли, спричинює параліч і загибель нематод у перші 12-24 години після введення.

Швидко всмоктується у ШКТ. Максимальна концентрація в плазмі крові спостерігається через 1,5-2 години. Біологічно трансформується в печінці з утворенням неактивних метаболітів. Період напіввиведення становить 3-4 години, метаболітів — приблизно 16 годин. Виводиться з організму у вигляді неактивних метаболітів переважно нирками (більш як 95%) і ШКТ (приблизно 5%) і менше ніж 0,2% у незмінному вигляді.

Препарат чинить комплексний вплив на імунну систему, особливо при імуносупресивних станах: підвищує вироблення антитіл на різні антигени, активує Т-лімфоцити й стимулює їхню проліферацію, підвищує функцію моноцитів, макрофагів і нейтрофілів (хемотаксис, фагоцитоз, адгезію).

Застосування

Лікування тварин та птиці за захворювань, спричинених нематодами:

- **велика рогата худоба, вівці, кози** — ШКТ *Haemonchus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Nematodirus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Chabertia ovina*, *Trichuris spp.*, *Neoascaris vitulorum*, *Strongyloides papillosus*;

- **свині** — *Trichuris suis*, *Oesophagostomum dentatum*, *Ollulanus spp.*;

- **птиця (кури, гуси, індички, голуби)** — *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria spp.*, *Trichostrongylus spp.*

Дозування

Препарат застосовують перорально у таких дозах:

- **велика рогата худоба, вівці, кози, свині** — 1 г на 10 кг маси тіла, з водою або кормом, одноразово;

- **птиця (кури, гуси, індички, голуби)** — 3-4 г на 10 кг маси тіла, з водою, одноразово або розділити розраховану дозу на 3-4 дні.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам, молоко і яйця яких вживають в їжу люди, самкам в останню третину вагітності, племінним плідникам у парувальний період, виснаженим і хворим на інфекційні захворювання тваринам.

Не використовувати разом з пірантелом, морантелом тартратом, фосфорорганічними препаратами, неостигміном.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин і птиці на м'ясо дозволяється через 8 діб. Заборонено вживати в їжу людини молоко і яйця після лікування.

М'ясо, отримане раніше вказаного терміну, можна використовувати тільки для годування м'ясоїдних тварин і виготовлення м'ясо-кісткового борошна, а молоко — випоювати

0 6. 0 2. 2023

непродуктивним тваринам.

Форма випуску

Контейнери з полімерних матеріалів, пакети з полімерних матеріалів по 10, 25, 50, 100, 500, 1000 г.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей, місце при температурі від 1 до 25 °С.

Термін придатності - три роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник:

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а,

м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна