



# ВОРМІКІЛ

(таблетки)

листівка-вкладка

## Опис

Плоскоциліндричні таблетки з рискою без оболонки жовтуватого кольору без запаху.

## Склад

1 таблетка (0,5 г) містить діючі речовини (мг):

пірантелу памоат (ембонат) - 144,0;

празіквантел - 50,0.

Допоміжні речовини: цукрова пудра, крохмаль кукурудзяний, кросповідон XL-10, полівінілпіролідон K25, лактоза моногідрат, кремнію діоксид, кальцію стеарат.

## Фармакологічні властивості

**ATCvet QP52 - Антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA01 - Празіквантел, комбінації)**

ВОРМІКІЛ – комбінований антигельмінтний препарат нематодцидної і цестоцидної дії, що ґрунтується на фармакологічних властивостях активніючих складових препарату – пірантелу памоату та празіквантелу. Володіє широким спектром антигельмінтної дії проти статевозрілих та личинкових форм круглих та стьожкових гельмінтів у собак та котів.

Пірантелу памоат (ембоат) активний щодо нематод (круглих гельмінтів), діє на їх холінергічні рецептори, викликаючи незворотній спастичний параліч. Мертві нематоди виводяться з організму тварин назовні перистальтичними рухами кишківника. Проте пірантел неактивний щодо міграційних личинкових стадій гельмінтів.

Празіквантел активний щодо цестод (стьожкових гельмінтів), швидко всмоктується всією поверхнею паразитів і рівномірно розподіляється по тілу. Празіквантел підвищує проникність мембран для іонів кальцію, викликає підвищення активності мускулатури, яке змінюється її скороченням та спастичним паралічем, викликає руйнування зовнішньої кутикули у дорослих форм цестод. У деяких випадках стьожкові гельмінти під дією ферментів травної системи повністю перетравлюються і не виявляються у фекаліях.

Пірантел в організмі ссавців погано абсорбується у травному каналі і після введення всередину *per os* у дозі 10 мг/кг маси тіла його концентрація в плазмі крові становить 0,005-0,13 мг/мл через 1-3 год. Пірантел, що абсорбувався до системи кровообігу, частково метаболізується в печінці до N-метил-1,3-пропандіаміну.

Празіквантел в організмі ссавців швидко всмоктується у травному каналі. Найвища його концентрація у плазмі крові спостерігається через 1-2 години після введення, він швидко метаболізується і виводиться до 80 % у вигляді метаболітів нирками протягом 4 діб, при цьому 90 % виводиться у перші 24 год.

## Застосування

Дегельмінтизація собак та котів при нематодозах (*Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria spp.*, *Ancylostoma spp.*, *Trichuris spp.*) та цестодозах (*Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus multilocularis*, *Mesocestoides spp.*).



## Дозування

Перорально, таблетки задають тварині безпосередньо на корінь язика або у подрібненому вигляді з кормом у дозах:

| Тварини              | Маса тіла, кг | Доза препарату, табл. |
|----------------------|---------------|-----------------------|
| цуценята та кошенята | 0,5-2,0       | 1/4                   |
| коти та малі собаки  | 2-5           | 1/2                   |
| малі собаки          | 5-10          | 1                     |
| середні собаки       | 10-20         | 2                     |
|                      | 20-30         | 3                     |
| великі собаки        | 30-40         | 4                     |
|                      | 40-50         | 5                     |

Рекомендована доза препарату – 1 таблетка на 10 кг маси тіла тварини, одноразово, без дотримання голодної дієти.

Дегельмінтизацію тварин проводять щоквартально. Рекомендується проводити також профілактичні обробки за 2-4 тижні до передбачуваної дати в'язки. Дегельмінтизацію кошенят і цуценят можна проводити з 6-ти тижневого віку.

## Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату в т.ч. в анамнезі.

Не застосовувати препарат виснаженим тваринам, хворим на інфекційні хвороби і видужуючим тваринам.

Не допускається застосування препарату при виражених порушеннях функцій печінки та нирок, а також цуценятам і кошенятам молодше 6-ти тижневого віку.

## Застереження

### Побічна дія

При правильному використанні та дозуванні побічні явища, як правило, не спостерігаються.

### Особливі застереження при використанні

Не перевищувати і не занижувати рекомендовані дози ВОРМІКІЛУ.

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не застосовувати лактуючим тваринам протягом перших 10 днів після пологів. Потім препарат застосовують у рекомендованих дозах.

Не застосовувати ВОРМІКІЛ у першій половині вагітності.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з антигельмінтними засобами, що містять піперазин.

## Форма випуску

По 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці.

## Зберігання

У герметично закритій упаковці в сухому темному та недоступному для дітей місці, окремо від продуктів харчування і кормів, за температури від 2 до 30 °С.

Термін придатності - 3 роки.

### Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "ВП "Укрзооветпромпостач"

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н.,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1

[www.ukrzoovet.com.ua](http://www.ukrzoovet.com.ua)

### Виробник готового продукту

ТОВ "ВП "Укрзооветпромпостач"

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н.,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1

[www.ukrzoovet.com.ua](http://www.ukrzoovet.com.ua)

**А**  
Для застосування  
у ветеринарній медицині

