



МАЗЬ ІХТІОЛОВА

(мазь)

листівка-вкладка

Опис

Густа однорідна маса чорно-коричневого кольору зі специфічним запахом.

Склад

100 г препарату містять діючу речовину: іхтіол – 10 г.
Допоміжна речовина: вазелін.

Фармакологічні властивості

**АТС-vet класифікаційний код: QD08 Антисептики та дезінфектанти.
QD08A10 Іхтіол.**

Мазь має антисептичну, протизапальну, кератопластичну та місцево-знеболювальну дію. Після нанесення на рани діє знеболювально та антисептично, звужує судини, зменшує секрецію та ексудацію, прискорює регенерацію тканин.

При зовнішньому застосуванні іхтіол практично не абсорбується у системний кровотік і не виявляє резорбтивної дії.

Застосування


Для місцевого застосування в комплексі терапевтичних заходів у лікуванні великої рогатої худоби, коней, овець, кіз, свиней, собак, котів при захворюваннях шкіри (опіках, ранах, екземах, дерматитах, фурункульозах, піодермії), артритів, невралгіях, бурситах.

Дозування

МАЗЬ ІХТІОЛОВУ застосовують зовнішньо 1-2 рази на добу протягом 5-10 днів до зникнення ознак захворювання. Перед нанесенням оброблювану ділянку очищають від шерсті, ексудату, сторонніх частинок, некротичного матеріалу або проводять гігієнічну обробку. Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри, прикриваючи пов'язкою. Кількість мазі залежить від площі ураженої ділянки. Можливе застосування мазі у вигляді аплікацій або тампонів.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.



Застереження

Побічна дія

Побічних явищ та ускладнень при застосуванні МАЗІ ІХТІОЛОВОЇ відповідно до листівки-вкладки як правило, не спостерігається. При підвищеній чутливості тварини до компонентів препарату можливі алергічні реакції, може виникати подразнення шкіри, особливо на початку лікування та при тривалому застосуванні. З появою сильного подразнення шкіри чи інших незвичайних реакцій застосування мазі слід припинити.

Особливі застереження при використанні

МАЗЬ ІХТІОЛОВА призначена тільки для зовнішнього застосування. Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки (особливо у очі). При випадковому потрапленні мазі у очі слід промити їх великою кількістю проточної води.

Не рекомендується застосування препарату для лікування глибоких інфікованих ран, опіків II та III ступеня.

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не слід наносити МАЗЬ ІХТІОЛОВУ в області сосків.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Диметилсульфоксид, етанол, гліцерол при одночасній аплікації з іхтіолом посилюють його системну абсорбцію та збільшують глибину його проникнення у м'які тканини.

Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Випадки передозування невідомі.

Спеціальні застереження

Не допускати злизування мазі тваринами.

Період виведення (каренція)

Під час та після застосування МАЗІ ІХТІОЛОВОЇ продукти тваринництва використовують без обмежень.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

При роботі з МАЗЗЮ ІХТІОЛОВОЮ слід дотримуватись загальних правил особистої гігієни та техніки безпеки, передбачених при роботі з ветеринарними препаратами.

Форми несумісності (основні)

Іхтіол несумісний у розчинах із солями йоду, важких металів та алкалоїдами

Форма випуску

Контейнери з полімерних матеріалів по 50 та 800 г.

Зберігання

У герметично закритій упаковці в сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності - 3 роки.



**Для застосування
у ветеринарній
медицині**

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпочащ»

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1

www.ukrzoovet.com.ua

Виробник готового продукту

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпочащ»

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1

www.ukrzoovet.com.ua

