

ЕФЕКТВЕТ™ УЛЬТРА для собак
(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)
листівка-вкладка

Опис

Масляниста рідина від жовтуватого до червоно-коричневого кольору зі специфічним запахом складників.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

фентіон - 100,0 мг.

Допоміжні речовини: 1,2-пропіленгліколь, ароматизатор, гліцерин, спирт бензиловий, спирт ізопропиловий.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP53A, ектопаразитициди для місцевого застосування з інсектицидами (QP53AF07 - фентіон)

Фентіон - інсектицид групи тіофосфорорганічних сполук, механізм дії полягає у блокуванні ферменту ацетилхолінестерази у синапсах ЦНС паразита, що призводить до його загибелі. Фентіон погано проникає через гематоенцефалічний бар'єр теплокровних тварин, але при зовнішньому застосуванні всмоктується через шкіру і проникає у кров. Кровосисні паразити гинуть через попадання у їх організм фентіону з кров'ю тварин.

Застосування

Лікування та профілактика собак при ураженні безкрилими комахами-ектопаразитами (сифонаптерози): *Ctenocephalides canis* (собача блоха), *Ctenocephalides felis* (котяча блоха), *Pulex irritans* (людська блоха).

Дозування

Перед застосуванням - зрізати кінчик піпетки ножицями.

Препарат застосовується зовнішньо, шляхом нанесення на шкіру тварини у ділянці холки та вздовж хребта, у дозах:

- собаки, масою тіла від 3 до 10 кг - 1 піпетка по 1,0 мл препарату;
- собаки, масою тіла від 10 до 20 кг - 2 піпетки по 1,0 мл або 1 піпетка по 2,0 мл препарату;
- собаки, масою тіла від 20 до 30 кг - 3 піпетки по 1,0 мл;
- собаки, масою тіла від 30 до 50 кг - 2 піпетки по 2,0 мл препарату;
- собаки, масою тіла понад 50 кг - 3 піпетки по 2,0 мл препарату.

Одноразова обробка тварин попереджає зараження від комах-ектопаразитів впродовж 3-6 тижнів. Повторні обробки тварин проводять через 3-4 тижні.

Протипоказання

Підвищена чутливість до фентіону.

Не застосовувати препарат цуценят до 6-ти місячного віку та масою тіла до 3 кг!

Не застосовувати тваринам одночасно або протягом декількох днів до або після обробки або впливу препаратів, що інгібують холінестеразу, такими як карбамати, левамизол, морантел, прантел.

Фентіон не слід застосовувати тваринам, які страждають на діарею, хронічний запор, коліки, судоми, порушення дихання, нирок та / або серця.

Не застосовувати ослабленим, хворим та виснаженим тваринам.

Не застосовувати препарат вагітним тваринам та самкам під час лактації.

Використовувати тільки після призначення ветеринарним лікарем.

Застереження

У чутливих тварин після обробки або тварини, які злизали препарат відразу після нанесення, можуть виникнути ознаки нервових розладів (посилене слиновиділення, блювота, неспокій, здуття живота, генералізований тремор, розширення зіниць, порушення дихання, хитка хода). Ці ознаки зникають через декілька хвилин без додаткового лікування. При алергічних ускладненнях (висипання на шкірі, свербіж та набряки) рекомендують десенсибілізуючу терапію. Антитокс - атропіну сульфат.

У разі великих пошкоджень шкіри місцеве лікування фентіоном може призвести до надмірного всмоктування шкіри з розвитком парасимпатичних симптомів.

Деполаризуючі міорелаксанти не можна вводити протягом 10 діб після введення фосфорорганічних речовин, оскільки вони посилюють побічні ефекти.

Фентіон не можна застосовувати разом з нейролептичними препаратами.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Обробку тварин слід проводити на відкритому просторі, користуючись гумовими рукавицями.

Препарат необхідно наносити у місця недоступні для злизування, не допускати злизування препарату іншими тваринами.

Під час обробки тварин препаратом не курити, не пити, не приймати їжу.

Після роботи з препаратом необхідно вимити руки теплою водою з милом; вимити та просушити рукавиці. При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його слід негайно змити проточною водою.

Уникати попадання препарату в очі тварини. Не наносити препарат на ушкоджену шкіру та в рани.

Після обробки тварин препаратом їх не можна гладити руками та допускати до дітей до повного висихання шерсті. Також після обробки тварин вони не повинні спати разом з господарями, особливо з дітьми.

Предмети догляду та місця перебування тварин (підстилки, килимки, меблі) необхідно періодично чистити та обробляти відповідними інсектицидами.

Форма випуску

Полімерні ампули-крапельниці або флакони-піпетки по 1,0 та 2,0 мл. Вторинна упаковка - картонна коробка.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ветсинтез»
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Виробник готового продукту

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ветсинтез»
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна