

PerFect TRIO краплі протипаразитарні для собак та котів
(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)
листівка-вкладка

Опис

Масляниста рідина від безбарвного до жовтого кольору зі специфічним запахом складників, допускається опалесценція. При зберіганні допускається поява незначного осаду.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

фіпроніл - 100,0 мг;

івермектин - 15,0 мг;

пірипроксифен - 20,0 мг.

Допоміжні речовини: диметилсульфоксид, спирт бензиловий, гліцеролформаль.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти; (QP53AX65, фіпроніл комбінації).

Препарат володіє вираженою інсекто-акарицидною дією щодо личинкових та дорослих форм розвитку бліх, вошей, волосоїдів, іксодових та саркоптиформних кліщів, нематод та личинок диروفілярій собак та котів.

PerFect TRIO® краплі-комбінований препарат, до складу якого входять фіпроніл, івермектин та пірипроксифен.

Фіпроніл - 5-аміно-1-[2,6-дихлоро-4-(трифлуорометил) феніл]-4-[(трифлуорометил) сульфініл]-1Н-піразол-3-карбонітрил, похідне фенілпіразолу з інсектицидною і акарицидною дією.

Фіпроніл порушує процес проходження іонів хлору у ГАМК - залежних рецепторах ектопаразитів, передачу нервових імпульсів та діяльність нервової системи, викликаючи загибель членистоногих. Не впливає на центральну нервову систему ссавців. Після нанесення на шкіру фіпроніл кумулюється в епідермісі, волосяних цибулинах та жирових залозах тварини і має тривалу контактну інсекто-акарицидну дію. Після нанесення препарату, фіпроніл розподіляється по поверхні тіла протягом 24 годин.

Івермектин, належить до хімічної групи макроциклічних лактонів. Фармакологічна дія івермектину полягає у блокаді нервової або нервово-м'язової передачі шляхом впливу на гамма-аміномасляну кислоту (ГАМК), внаслідок чого порушується передача нервових імпульсів ектопаразитів і нематод, що призводить до їх паралічу і загибелі.

Пірипроксифен - аналог природних ювенільних гормонів, який, порушуючи процеси синтезу хітину і линьки личинок, перешкоджає розвитку повноцінних лялечок і викликає загибель комах на преімагінальних фазах розвитку, що призводить до припинення поповнення популяції на стадії яйця і личинки, запобігає появі статевозрілих комах на тваринах і в місцях їх утримання та викликає стерилізацію імаго.

При нанесенні на шкіру в рекомендованих дозах не має місцево-подразнюючої та резорбтивно-токсичної дії, при попаданні в очі викликає подразнення. Препарат є токсичним для риб і бджіл.

Застосування

Профілактика та лікування собак і котів за ураження екто- та ендопаразитами:

- блохами та їх личинками (*Ctenocephalides canis /felis*, *Pulex irritans*);
- вошами (*Linognathus setosus*);
- волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*);
- комарами трьох родів: кусака *Aedes*, звичайний комар *Cuix* і малярійний комар *Anopheles*);
- іксодовими кліщами (*Ixodes spp.*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Boophilus calcaratus*) на імагінальній, німфальній та личинковій стадіях розвитку;

- саркоптиформними кліщами (*Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*, *Sarcoptes canis* та *Cheyletiella* spp.);
- тромбідіформними кліщами (*Demodex canis*, *D. gatoi*, *D. felis*);
- нематодами травного каналу (*Toxocara* spp., *Toxascaris* spp., *Trichuris vulpis*, *Uncinaria stenocephala*, і *Ancylostoma* spp.);
- личинками (мікрофіляріями стадії L3 та L4) *Dirofilaria immitis* та *Dirofilaria repens*.

Дозування

Препарат призначають одноразово дорослим собакам і котам, цуценят та кошенят з 3-х місячного віку та масою тіла більше 2 кг.

Препарат наносять на суху, неушкоджену шкіру тварин: котам - на шкіру потилиці, собакам - між лопатками та вздовж хребта. Для нанесення препарату необхідно зрізати кінчик піпетки та розділити шерсть тварини, щоб було видно шкіру, притиснути кінчик піпетки до шкіри й натиснути на піпетку кілька разів, щоб нанести весь вміст на шкіру.

Дози препарату становлять:

- собаки та коти масою тіла до 4 кг - 1 піпетка по 0,6 мл препарату;
- собаки та коти масою тіла від 4 до 10 кг - 1 піпетка по 0,8 мл препарату;
- собаки масою тіла від 10 до 20 кг - 1 піпетка по 1,6 мл препарату;
- собаки масою тіла від 20 до 40 кг - 1 піпетка по 2,5 мл препарату або комбінація піпеток меншого об'єму;
- собаки масою тіла більше 40 кг - 1 піпетка 3,6 мл препарату або комбінація піпеток меншого об'єму.

З лікувальною метою при саркоптозі, демодекозі собак та нотоєдрозі котів препарат застосовують 2-4 рази з інтервалом 7-10 днів; з профілактичною метою - 1 раз на місяць. Лікування рекомендується проводити комплексно із застосуванням етіотропних, патогенетичних і симптоматичних засобів.

При обробці великих собак препарат наносять на шкіру в 3-4 місця від потилиці тварини та уздовж хребта.

Для лікування отодектозу (вушної корости) PerFect TRIO® краплі застосовують одноразово. У процесі лікування рекомендується очищати слуховий прохід від ексудату і струпів, а при ускладненні отитом призначати протимікробні і протизапальні засоби. При необхідності курс лікування повторюють.

Для профілактики дирофіляріозу препарат застосовують щомісячно в один і той самий день протягом року. Препарат починають застосовувати за 1 місяць до першої очікуваної появи кровосисних комах (комарі різних родів) і припиняють через 1 місяць після закінчення сезону комах.

Тривалість захисної дії препарату після одноразової обробки тварини зберігається проти кліщів у собак до 30 днів, у котів - до 21 дня, проти комах у собак - до 2 місяців, у котів - до 1,5 місяців. Повторні обробки тварин препаратом протягом сезону активності паразитів рекомендується проводити за показаннями, але не частіше 1 разу на місяць. З метою запобігання повторної інвазії блохами тваринам замінюють підстилки або обробляють їх інсектицидною засобом відповідно до інструкції по застосуванню.

Препарат може використовуватись як один із засобів при лікуванні алергічного блошиного дерматиту (flea allergy dermatitis: FAD). При комбінованому лікуванні блошиного алергічного дерматиту препарат застосовують щомісяця.

Протипоказання

Підвищена чутливість до складових компонентів препарату!

Не застосовувати цуценят та кошенят до 3-х місячного віку та собакам масою тіла до 2 кг!

Не застосовувати ослабленим, хворим та виснаженим тваринам!

Не застосовувати препарат вагітним тваринам та самкам під час лактації.

Препарат не рекомендується застосовувати собакам з мутацією гену MDR1 порід коллі, шелті, бобтейл, шотландська вівчарка та їх помісям через можливу нейротоксичну дію складових!

Застереження

При роботі з препаратом дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

У разі прояву алергічних реакцій у чутливої до компонентів препарату тварини необхідно призначити антигістамінні та симптоматичні засоби.

Варто уникати порушення схеми застосування препарату, бо це зможе привести до зниження його ефективності.

Не дозволяти тваринам злизувати препарат, утримувати їх подалі від відкритого вогню та нагрівальних приладів.

Не рекомендується купати тварин 3 доби до та після обробки препаратом.

Важливо дотримуватись правил безпечної фіксації тварин.

Після обробки тварин необхідно вимити руки з милом.

Впродовж 48 годин після обробки тварин не можна гладити по шерсті та допускати тварину до маленьких дітей.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

Форма випуску

Полімерні ампули-крапельниці по 0,6 мл; 0,8 мл, 1,6 мл; 2,5мл та 3,6мл запаковані по 3 штуки у картонну коробку; полімерні ампули-крапельниці по 0,6 мл; 0,8 мл; 1,6 мл в індивідуальній картонній упаковці

Зберігання

Темне, недоступне для дітей місце, окремо від кормів та харчових продуктів, за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Увага! Дата виробництва вказана на піпетці.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"
61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30 , Україна

Виробник готового продукту:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"
61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30 , Україна