



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного висновку від 26.03.2025 р. №40 рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів від 07.04.2025 р. №268 зареєстровано:

препарат **ІММУКОКС 5,
ІММУСОХ® 5 – вакцина жива проти
кокцидіозу курчат**

у формі **суспензії та порошку**

Власник реєстраційного посвідчення:

**Сева Анімал Хелс Інк.,
131 Малкольм рд., Гвелф, Онтаріо, Канада Н1К 1А8**

зареєстровано в Україні за № **ВА-00917-02-18** від **07.04.2025**

Виробник:

**Сева Анімал Хелс Інк.,
131 Малкольм рд., Гвелф, Онтаріо, Канада Н1К 1А8**

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2);
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до

17.05.2028

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату.

Заступник Голови Державної служби України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту споживачів –
Головний державний ветеринарний інспектор України
Deputy Head of the State Service of Ukraine on
Food Safety and Consumer Protection –
Chief State Veterinary Inspector of Ukraine



Володимир КУСТУРОВ

Volodymyr KUSTUROV

Коротка характеристика препарату

1. Назва ветеринарного препарату

ИММУКОКС 5, IMMUCOX[®] 5 – вакцина жива проти кокцидіозу курчат.

2. Якісний і кількісний склад

Одна доза вакцини містить:

Активнодіючі речовини:

Eimeria acervulina (штам Ceva), *E. brunetti* (штам Ceva), *E. maxima* (штам Guelph), *E. necatrix* (штам Guelph), *E. tenella* (штам Ceva) - щонайменше 317 ооцист/дозу по закінченню терміну придатності.

Допоміжні речовини:

Стерильна вода	до 100%
Харчовий барвник	0 - 1,5%
Дихромат калію	1,33 ± 0,13%
СЕВАГЕЛЬ порошок для гель-крапельного застосування:	
Каррагінан	10-20%
Карбоксиметилцелюлоза	6-10%
Мальтодекстрин	72-84%

3. Фармацевтична форма

Суспензія та порошок.

4. Імунобіологічні властивості

ИММУКОКС 5 рекомендується для вакцинації здорових курчат на 1-3 добу життя з гелем (гель-спрей метод), як засобу для профілактики кокцидіозу, викликаного *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix* і *E. tenella*.

5. Клінічні особливості

5.1. Вид тварин

Кури.

5.2. Показання до застосування

Для активної імунізації курчат 1-3 денного віку проти кокцидіозу.

5.3. Протипоказання

Переконайтеся, що в кормі або воді немає кокцидіостатиків (антикокцидів). Навіть низький рівень кокцидіостатиків може знизити або звести до мінімуму ефективність вакцини. Антибіотики широкого спектру дії (наприклад, тетрацикліни, сульфаніламідні препарати та нітрофурани) не слід застосовувати разом з вакциною протягом перших 16 діб після вакцинації.

5.4. Побічна дія

Відсутня.

5.5. Особливості застереження при використанні

Не зменшувати та не збільшувати дозу. Якщо птиця утримується в замкненому просторі, її слід випустити до 6-го дня після вакцинації, або площа утримання повинна бути збільшена щонайменше вдвічі. Вакцинувати слід лише клінічно здорову птицю.

5.6. Застосування під час несучості

Не застосовується.

5.7. Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Заборонено використання кокцидіостатиків та антибіотиків (тетрациклінового, нітрофуранового, сульфаніламідного ряду) з вираженою кокцидіоцидною дією разом з вакциною, з водою чи кормом протягом 16 діб після вакцинації.

5.8. Дози і способи введення тваринам різного віку

Вакцина застосовується однократно, на 1-3 добу життя з гелем (гель-спрей метод).

Зразок приготування вакцинного розчину на 10 000 доз вакцини:

Один пакет з СЕВАГЕЛЬ - порошком для гель-крапельного застосування (70 г), розчиняють в 2,5 л охолодженої дистильованої води, ретельно перемішують. Флакон з вакциною ИММУКОКС ретельно струшують, додають у воду та ретельно перемішують. Вакцинний розчин не потребує подальшого перемішування та готовий до використання в той самий день.

Курчат вакцинують в 1-3 добовому віці, використовуючи спеціальне обладнання для гель-крапельного застосування чи пристрої, з розрахунку 25 мл на 100 курчат

5.9. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Введення 10-кратної дози вакцини через зонд не призводить до захворювання птиці на кокцидіоз.

5.10. Спеціальні застереження

Здатність вакцини сприяти розвитку імунітету проти кокцидіозу у курей залежить від багатьох факторів. До них відносяться, зокрема, умови зберігання та поводження з вакциною, спосіб введення вакцини, реакція окремих курчат на вакцину, а також те, наскільки ретельно дотримуються інструкції із застосування та застережних заходів.

5.11. Період виведення (каренції)

21 доба.

5.12. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі вводять засоби захисту тваринам

При попаданні препарату на шкіру змити його водою з милом. У випадку потрапляння в очі промити очі водою. *Eimeria* специфічні для курей і не спричиняють захворювання у людей. Розріджувач виготовлений з їстівних харчових смол, які не становлять ризику токсичності для людини.

6. Фармацевтичні особливості

6.1. Основні форми несумісності

Заборонено використання кокцидіостатиків та антибіотиків (тетрациклінового, нітрофуранового, сульфаніламідного ряду) з вираженою кокцидіоцидною дією разом з вакциною, з водою чи кормом протягом 16 діб після вакцинації.

6.2. Термін придатності

Вакцини - 9 місяців, порошку – 24 місяці.

6.3. Особливі застереження щодо зберігання

Вакцину зберігати при температурі від 2 до 8 °С, в захищеному від світла, недоступному для дітей місці. Не заморозувати.

6.4. Природа і склад контейнера первинного упакування

Вакцина: скляні флакони ємністю 1000, 2000 та 5000 доз, закриті гумовою кришкою та завальцьовані алюмінієвим ковпачком.

Порошок: пакети по 70 (+/-5) г.

6.5. Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності власника реєстраційного посвідчення

Сева Анімаль Хелс Інк., 131 Малкольм рд., Гвелф, Онтаріо, Канада Н1К 1А8.

6.6. Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності виробника

Сева Анімаль Хелс Інк., 131 Малкольм рд., Гвелф, Онтаріо, Канада Н1К 1А8.

6.7. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом

Утилізацію усіх відкритих під час проведення процедури вакцинації флаконів з вакциною слід здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.8. Правила відпуску

Без рецепту.

7. Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

ІММУКОКС 5, IMMUSOX[®] 5 – вакцина жива проти кокцидіозу курчат.

Склад

Одна доза вакцини містить:

Активнодіючі речовини:

Eimeria acervulina (штам Ceva), *E. brunetti* (штам Ceva), *E. maxima* (штам Guelph), *E. necatrix* (штам Guelph), *E. tenella* (штам Ceva) - щонайменше 317 ооцист/дозу по закінченню терміну придатності.

Допоміжні речовини:

Стерильна вода	до 100%
Харчовий барвник	0 - 1,5%
Дихромат калію	1,33 ± 0,13%
СЕВАГЕЛЬ порошок для гель-крапельного застосування:	
Каррагінан	10-20%
Карбоксиметилцелюлоза	6-10%
Мальтодекстрин	72-84%

Фармацевтична форма

Суспензія та порошок.

Імунобіологічні властивості

IMMUSOX 5 рекомендується для вакцинації здорових курчат на 1-3 добу життя з гелем (гель-спрей метод), як засобу для профілактики кокцидіозу, викликаного *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix* і *E. tenella*.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Для активної імунізації курчат 1-3 денного віку проти кокцидіозу.

Протипоказання

Переконайтеся, що в кормі або воді немає кокцидіостатиків (антикокцидів). Навіть низький рівень кокцидіостатиків може знизити або звести до мінімуму ефективність вакцини. Антибіотики широкого спектру дії (наприклад, тетрацикліни, сульфаніламідні препарати та нітрофурани) не слід застосовувати разом з вакциною протягом перших 16 діб після вакцинації.

Застереження при застосуванні

Не зменшувати та не збільшувати дозу. Якщо птиця утримується в замкненому просторі, її слід випустити до 6-го дня після вакцинації, або площа утримання повинна бути збільшена щонайменше вдвічі. Вакцинувати слід лише клінічно здорову птицю.

Взаємодія з іншими засобами

Заборонено використання кокцидіостатиків та антибіотиків (тетрациклінового, нітрофуранового, сульфаніламідного ряду) з вираженою кокцидіоцидною дією разом з вакциною, з водою чи кормом протягом 16 діб після вакцинації.

Особливі вказівки при несучості

Не застосовується.

Спосіб застосування та дози

Вакцина застосовується однократно, на 1-3 добу життя з гелем (гель-спрей метод).

Зразок приготування вакцинного розчину на 10 000 доз вакцини:

Один пакет з СЕВАГЕЛЬ - порошком для гель-крапельного застосування (70 г), розчиняють в 2,5 л охолодженої дистильованої води, ретельно перемішують. Флакон з вакциною ІММУКОКС ретельно струшують, додають у воду та ретельно перемішують. Вакцинний розчин не потребує подальшого перемішування та готовий до використання в той самий день.

Курчат вакцинують в 1-3 добовому віці, використовуючи спеціальне обладнання для гель-крапельного застосування чи пристрої, з розрахунку 25 мл на 100 курчат

Побічні ефекти

Відсутні.

Період виведення (каренції)

21 доба.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВІП

При попаданні препарату на шкіру змити його водою з милом. У випадку потрапляння в очі промити очі водою. *Eimeria* специфічні для курей і не спричиняють захворювання у людей.

Розріджувач виготовлений з їстівних харчових смол, які не становлять ризику токсичності для людини.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Утилізацію усіх відкритих під час проведення процедури вакцинації флаконів з вакциною слід здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Термін придатності

Вакцини - 9 місяців, порошку – 24 місяці.

Умови зберігання і транспортування

Вакцину зберігати при температурі від 2 до 8 °С, в захищеному від світла, недоступному для дітей місці. Не заморожувати.

Упаковка

Вакцина: скляні флакони ємністю 1000, 2000 та 5000 доз, закриті гумовою кришкою та завальцьовані алюмінієвим ковпачком.

Порошок: пакети по 70 (+/-5) г.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Сева Анімаль Хелс Інк., 131 Малкольм рд., Гвелф, Онтаріо, Канада Н1К 1А8.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.

Додаток 3
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00917-02-18
від 07.04.2025

CT CEVAGEL 70G UA 260x170 CODE ARTICLE : 00000 BLACK P PROCESS BLUE	CEVAGEL 70G UKRAINE ID : 86468 CORPS : 11 pts
---	---

OLIVIER 28/11/24



**ПОРОШОК ДЛЯ
ГЕЛЬ-КРАПЕЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ**

70 г (g)



**Порошок застосовується разом з вакцинами для птиці
проти кокцидіозу гель-крапельним методом**

Склад

Каррагінан 10-20%
Карбоксиметилцелюлоза 6-10%
Мальтодекстрин 72-84%

Спосіб застосування та дози

Для приготування вакцинного розчину на 10 000 доз вакцини ІММУКОКС:

1. Один пакет з порошком для гель-крапельного застосування (70 г), розчиняють в 2,5 л охолодженої дистильованої води, ретельно перемішують.
2. Флакон з вакциною ІММУКОКС ретельно струшують, додають у воду та ретельно перемішують. Вакцинний розчин не потребує подальшого перемішування та готовий до використання в той самий день.
3. Курчат вакцинують в 1-3 добовому віці, використовуючи спеціальне обладнання для гель-крапельного застосування чи пристрої, з розрахунку 25 мл на 100 курчат.

Виробник

Сева Санте Анімаль, З.І. Тре Ле Буа, 22600 Лудезак, Франція.

Лише для ветеринарної медицини!



02/003

Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00917-02-18
від 07.04.2025

**ИММУКОКС 5,
IMMUSOX 5 –
вакцина жива проти
кокцидіозу курчат**

5000 доз

Ceva

Склад: *Eimeria acervulina*, *E. tenella*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella* - щонайменше 317 ооцистів/дозу по закінченню терміну придатності.
Дія активної імунізації курчат 1-3 деного віку проти кокцидіозу.
Спосіб застосування та дози: Вакцина застосовується однократно, на 1-3 добу життя з гелем (гель-спрей метод). Період виведення (каренції) – 21 доба. Перед застосуванням уважно прочитайте текст на коробці.
Важливо! Вакцину зберігати при температурі від 2 до 8 °C, в захищеному від світла, недоступному для дітей місці. Не заморозувати.
Р/У553LДУА-01
Власник реєстраційного посвідчення та виробник: Села Анімалс Хелс Інк., 131 Малкольм Рд., Гвелф, Онтаріо, Канада Н1К 1А8.
РП№: ВА-00917-02-18
Лише для ветеринарної медицини
Серія №:
Придатний до:

**ИММУКОКС 5,
IMMUSOX 5 –
вакцина жива проти
кокцидіозу курчат**

5000 доз

Ceva

Склад
Eimeria acervulina, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella* - щонайменше 317 ооцистів/дозу по закінченню терміну придатності.

Показання до застосування
Для активної імунізації курчат 1-3 деного віку проти кокцидіозу.

Спосіб застосування та дози
Вакцина застосовується однократно, на 1-3 добу життя з гелем (гель-спрей метод). Період виведення (каренції) – 21 доба. Перед застосуванням уважно прочитайте текст на коробці.

Зберігання
Вакцину зберігати при температурі від 2 до 8 °C, в захищеному від світла, недоступному для дітей місці. Не заморозувати.

Власник реєстраційного посвідчення та виробник
Р/У553LДУА-01
Села Анімалс Хелс Інк., 131 Малкольм Рд., Гвелф, Онтаріо, Канада Н1К 1А8.
РП№: ВА-00917-02-18
Лише для ветеринарної медицини

Серія №:
Придатний до:

200%

CUSTOMER PROOF • pdf format • CHECK CAREFULLY!



ph (913) 287-3333 • fax (913) 287-3338

Customer: **Biomune - Kelly**

CS Representative: Libby Himmelwright • lhimmelwright@tabcoinc.com

P.O.#: **----** Tabco Part #: **58438 (In)**

Date: **12/05/24** **12/11/24**

Description: **Immucox 5**

Varnish: ☐ Pattern ☐ Flood Lamination: ☒ Size: **1.25** " x **3.50** " Unwind #: **3**

Colors: **black** **PMS 354**

PDF proofs are electronic files intended for delivery via the internet. They are intended for proofing of content, size, placement and color breaks. They are not intended to represent exact colors. Every effort has been taken to ensure the accuracy and conformance to applicable regulations on this proof. HOWEVER, please check carefully as the final liability rests solely with the CUSTOMER.

☐ Approved as shown ☐ Approved w/ corrections ☐ Make corrections & resubmit

Approved by: _____ Date: _____

Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00917-02-18
від 07.04.2025

**ИМУКОКС 5,
IMMUSOX 5 –
вакцина жива проти
кокцидіозу курчат**

5000

**10x5000
доз**



Склад
Elitioris avicollina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix, E. tenella – цілий міліард 317 особистостей по закінченню терміну придатності.

Показання до застосування
 Для захисту маляток курчат 1-3-днічного віку проти кокцидіозу.

ПІЗІСХ.Д.Ж.01

[illegible]

CUSTOMER PROOF • pdf format • CHECK CAREFULLY •	
 Tabco Inovar ph (012) 257 3333 • fax (012) 257 3338 Customer: <u>Birmune - Kelly</u> CS Representative: <u>Lilley Himmelnwright - Birmunewright@tabcoinc.com</u> P.O.#: <u>----</u> Tabco Part #: <u>S8437 (fin)</u> Date: <u>12/05/24</u> <u>12/11/24</u>	Description: _____ Immucox 5 Varnish: ☐ _____ Pattern Flood Lamination: ☒ _____ Size: <u>4.375" x 5.75"</u> - Umlin# <u>3</u> Colors: ☐ <u>black</u> ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☒ <u>PMS 354</u> ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____  FOR proof an electronic file converted for delivery via the internet. They are intended for proofing of content, size, placement and color. They are not intended to represent end results. Every effort will be taken to ensure the accuracy and conformance to applicable regulations on this proof. HOWEVER, please check carefully as the final liability rests solely with the CUSTOMER. ☐ Approved as shown ☐ Approved w/ corrections ☐ Make corrections & resubmit Approved by: _____ Date: _____

Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00917-02-18
від 07.04.2025



**ИМУКОКС 5,
IMMUCOX 5 –
вакцина жива проти
кокцидіозу курчат**

2000

**10х2000
доз**



Склад
Elavetio voerghueta, E. brunetti, E. mastica, E. necatrix, E. tenella – штамми кокси 317 оваріодіозу по звичайно терміну придатності.

Показання до застосування
 Для захисту Мухавці курчат 1-3 днів після вилупу проти кокцидіозу.

ПРИМІТКА
 Для використання вакцини необхідно розбавити її у відповідній кількості води, яку п'ють курчат.

[illegible]

CUSTOMER PROOF • pdf format • CHECK CAREFULLY!																	
 Tabco Inovar ph (012) 287 3333 • fax (012) 287 3338 Customer: <u>Bismuna - Kelly</u> CS Representative: <u>Lilby Himmelswight - himmelswight@tabcoinc.com</u> P.O.#: <u>----</u> Tabco Part #: <u>58436 (fin)</u> Date: <u>12/05/24</u> <u>12/11/24</u>	Description: _____ Immucox 5 Varnish: ☐ _____ Lamination: ☒ _____ Size: <u>4.375</u> "x <u>5.75</u> " Unwind #: <u>3</u> Pattern Flood <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Color:</td> <td style="width: 35%;">☒ Black</td> <td style="width: 35%;">☒ PMS 354</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </table>  PDF proofs are electronic files intended for delivery via the internet. They are intended for proofing of artwork, color, placement and color balance. They are not intended to represent actual prints. Every effort will be made to ensure the accuracy and conformity to applicable regulations on this proof. HOWEVER, please check carefully as the final liability must solely with the CUSTOMER. ☐ Approved as shown ☐ Approved w/ corrections ☐ Make corrections & resubmit Approved by: _____ Date: _____	Color:	☒ Black	☒ PMS 354			☐	☐			☐	☐			☐	☐	
Color:	☒ Black	☒ PMS 354															
	☐	☐															
	☐	☐															
	☐	☐															

Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00917-02-18
від 07.04.2025

IMМУКОКС 5,
IMMUSOX 5 –
вакцина жива проти
кокцидіозу курчат

2000 доз

Склад:
Eimeria acervulina, *E. tenella*, *E. maxima*,
E. meleagridis, *E. faecalis* – щонайменше 317
ооцистів/дозу по закінченню терміну
придатності.

Показання до застосування:
Для активної імунізації курчат 1-3 денного
віку проти кокцидіозу.

Спосіб застосування та дози:
Вакцина застосовується однократно, на
1-3 добу життя з гелем (гель-спрей метод).
Період введення (каренції) – 21 доба.
Період застосування уважно прочитайте
в інструкції.

Зберігання:
Вакцину зберігати при температурі від 2 до
8 °С, в захищеному від світла,
недоступному для дітей місці. Не
заморожувати.

РУ553IDUA-01
Власник реєстраційного посвідчення та
виробник:
Севел Анімал Хелс Інк., 131 Малкольм
Рд., Гвелф, Онтаріо, Канада Н1К 1А8.
РІПС: ВА-00917-02-18
Лише для ветеринарної медицини!

Серія №:
Придатний до:

IMМУКОКС 5,
IMMUSOX 5 –
вакцина жива проти
кокцидіозу курчат

2000 доз

Склад:
Eimeria acervulina, *E. brunetti*, *E. maxima*,
E. meleagridis, *E. tenella* – щонайменше 317
ооцистів/дозу по закінченню терміну
придатності.

Показання до застосування:
Для активної імунізації курчат 1-3 денного
віку проти кокцидіозу.

Спосіб застосування та дози:
Вакцина застосовується однократно, на
1-3 добу життя з гелем (гель-спрей метод).
Період введення (каренції) – 21 доба.
Період застосування уважно прочитайте
текст на коробці.

Зберігання:
Вакцину зберігати при температурі від 2 до
8 °С, в захищеному від світла,
недоступному для дітей місці. Не
заморожувати.

РУ553IDUA-01
Власник реєстраційного посвідчення та
виробник:
Севел Анімал Хелс Інк., 131 Малкольм
Рд., Гвелф, Онтаріо, Канада Н1К 1А8.
РІПС: ВА-00917-02-18
Лише для ветеринарної медицини!

Серія №:
Придатний до:

200%

ph (913) 287-3333 • fax (913) 287-3338

Customer: Biomune - Kelly

CS Representative: Libby Himmelwright • lhimmelwright@tabcoinc.com

P.O.#: --- Tabco Part #: 58435 (In)

Date: 12/05/24 12/11/24

Description: Immucox 5

Varnish: ☐ Pattern ☐ Flood Lamination: ☒ Size: 1.25 " x 3.50 " Unwind #: 3

Colors:

☒ black

☐ PMS 354

☐

☐

☐

☐

☐

☐

← Across →

↑ Around ↓

PDF proofs are electronic files intended for delivery via the internet. They are intended for proofing of content, size, placement and color breaks. They are not intended to represent exact colors. Every effort has been taken to ensure the accuracy and conformance to applicable regulations on this proof. HOWEVER, please check carefully as the final liability rests solely with the CUSTOMER.

☐ Approved as shown ☐ Approved w/ corrections ☐ Make corrections & resubmit

Approved by: _____ Date: _____

Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00917-02-18
від 07.04.2025

СЕВАГЕЛЬ

ПОРОШОК ДЛЯ ГЕЛЬ-КРАПЕЛЬНОГО

ЗАСТОСУВАННЯ

70 г (g) 

Порошок застосовується разом з вакцинами для птиці проти кокцидіозу гель-крапельним методом

Склад
Карраїнан 10-20%
Карбоксиметилцелюлоза 6-10%
Мальтодекстрин 72-84%

Спосіб застосування та дози
Для приготування вакцинного розчину на 10 000 доз вакцини ІММУКОКС:
1. Один пакет з порошком для гель-крапельного застосування (70 г (g)), розчиняють в 2,5 л (l) охолоджені дистильованої води, ретельно перемішують.
2. Флакон з вакциною ІММУКОКС ретельно струшують, додають у воду та ретельно перемішують. Вакцинний розчин не потребує подальшого перемішування та готовий до використання в той самий день.
3. Курчат вакцинують в 1-3 добовому віці, використовуючи спеціальне обладнання для гель-крапельного застосування чи пристрої, з розрахунку 25 мл (ml) на 100 курчат.
Перед застосуванням уважно прочитайте листівку-вкладку до вакцини!

Виробник
Сева Анімалс Хелс Інк., 131 Малкольм рд., Гвелф, Онтаріо, Канада Н1К 1А8.
Лише для ветеринарної медицини!

Супла №:
Дата виготовлення:
Придатний до:

PY050XHUA-01

CUSTOMER PROOF • pdf format • CHECK CAREFULLY!



ph (913) 287-3333 • fax (913) 287-3338

Customer: Biomune - Kelly

CS Representative: Libby Himmelwright • lhimmelwright@tabcoinc.com

P.O.#: --- Tabco Part #: 58434 (ln)

Date: 12/05/24 12/11/24

Description: _____ Diluent _____

Varnish: ☐ Pattern ☒ Flood Lamination: ☐ Size: 3.75 " x 5.50 " Unwind #: 4

Colors: ☒ black ☒ reflex blue ☐ thermal varn

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

PDF proofs are electronic files intended for delivery via the internet. They are intended for proofing of content, size, placement and color breaks. They are not intended to represent exact colors. Every effort has been taken to ensure the accuracy and conformance to applicable regulations on this proof. HOWEVER, please check carefully as the final liability rests solely with the CUSTOMER.

☐ Approved as shown ☐ Approved w/ corrections ☐ Make corrections & resubmit

Approved by: _____ Date: _____

Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00917-02-18
від 07.04.2025

1000

IMMUKOKS 5, IMMUSOX 5 – вакцина жива проти кокцидіозу курчат

10x1000 доз





Склад
Elmora avianalis, *E. blautii*, *E. maxima*, *E. passalis*, *E. tenella* – щонайменше 317 особин/дозу по зазначеному терміну придатності.

Показання до інтегрування
 Для стійкого імунітету курчат 1-3 днів після вилуплення.

[illegible]

CUSTOMER PROOF • pdf format •		• CHECK CAREFULLY!																	
 Tabco Inovar		Description: _____ Innuox 5																	
Customer: _____ Blomire - Kelly		Varnish: ☐ _____ Lamination: ☒ _____ Size: 4.375" x 5.75" Unwind #: 3																	
CS Representative: Lilley Hinnelwright • lhinne@tabcoinc.com		Pattern Flood																	
P.O.#: _____ Tabco Part #: 58433 (Int)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;"> Black </td> <td style="width: 50%; padding: 2px;"> PMS 354 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">☐</td> <td style="padding: 2px;">☐</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">☐</td> <td style="padding: 2px;">☐</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">☐</td> <td style="padding: 2px;">☐</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">☐</td> <td style="padding: 2px;">☐</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">☐</td> <td style="padding: 2px;">☐</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">☐</td> <td style="padding: 2px;">☐</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">☐</td> <td style="padding: 2px;">☐</td> </tr> </table>		Black	PMS 354	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Black	PMS 354																		
☐	☐																		
☐	☐																		
☐	☐																		
☐	☐																		
☐	☐																		
☐	☐																		
☐	☐																		
Date: 12/05/24 12/11/24																			
PDF proofs are electronic files intended for delivery via the internet. They are intended for proofing of content, color, placement and color balance. They are not intended to represent final prints. Every effort has been taken to ensure the accuracy and conformity to applicable regulations on this proof. HOWEVER, please check carefully on the final facility print, solely with the CUSTOMER.																			
☐ Approved as shown		☐ Approved w/ corrections																	
Approved by: _____		Date: _____																	

Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00917-02-18
від 07.04.2025



**ИМУКОКС 5,
ИМУСОХ 5 –
вакцина жива проти
кокцидиозу курчат**

1000 доз

Склад
*Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima,
E. pleschkei, E. tenella* - щонайменше 317
ооцист/дозу по закінченню терміну
придатності.

Показання до застосування
Для активної імунізації курчат 1-3 денного
віку проти кокцидиозу.

Спосіб застосування та дози
Вакцина застосовується однократно, на
1-3 добу життя з гелем (гель-спрей метод).
Період виведення (каренції) – 21 доба.
Перед застосуванням уважно прочитайте
текст на коробці!

Зберігання
Вакцину зберігати при температурі від 2 до
8 °C, в захищеному від світла,
недоступному для дітей місці. Не
заморожувати.

**Власник реєстраційного посвідчення та
виробник**
Сева Анімал Хелс Інк., 131 Малкольм
Рд., Гвелф, Онтаріо, Канада Н1К 1А8.
РП№: ВА-00917-02-18
Ліше для ветеринарної медицини!

Серія №:
Придатний до:

200%

CUSTOMER PROOF • pdf format • CHECK CAREFULLY!	
 ph (913) 287-3333 • fax (913) 287-3338	Description: Immucox 5 Varnish: ☐ Pattern ☐ Flood Lamination: ☒ Size: 1.25 " x 3.50 " Unwind #: 3 Colors: ☐ black ☐ PMS 354 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ PDF proofs are electronic files intended for delivery via the internet. They are intended for proofing of content, size, placement and color breaks. They are not intended to represent exact colors. Every effort has been taken to ensure the accuracy and conformance to applicable regulations on this proof. HOWEVER, please check carefully as the final liability rests solely with the CUSTOMER. ☐ Approved as shown ☐ Approved w/ corrections ☐ Make corrections & resubmit
Customer: Biomune - Kelly	
CS Representative: Libby Himmelwright • lhimmelwright@tabcoinc.com	
P.O.#: - - - - Tabco Part #: 58432 (In)	
Date: 12/05/24 12/11/24	
Approved by: _____	Date: _____