

POLIMUN ND EDS IB MAX, ПОЛІМУН НХ СЗН ІБК МАКС 	
вакцина проти Ньюкаслської хвороби, синдрому зниження несучості та інфекційного бронхіту курей, інактивована	
СКЛАД	Одна доза вакцини (0,5 мл (ml)) містить інактивовані антигени, що індукують утворення специфічних антитіл в титрах: вірус Ньюкаслської хвороби штам Ла-Сота - $\geq 4,5 \log_2 \text{ HI}^*$; вірус синдрому зниження несучості штам ССЯ-76 - $\geq 7,0 \log_2 \text{ HI}$. Віруси інфекційного бронхіту курей: штам М-41(група Массачусетс) - $\geq 5,0 \log_2 \text{ HI}$; штам БК-07 (група 793В) - $\geq 4,0 \log_2 \text{ HI}$; штам VAR2/V2 (група VAR2) - $\geq 4,0 \log_2 \text{ HI}$. * HI – титр антитіл, визначений в РЗГА, Допоміжні речовини: Інактивант – формальдегід ≤ 250 мкг (mcg), або бінарний етиленмін (не є компонентом кінцевого продукту). Ад'ювант – парафін рідкий легкий, полісорбат 80, сорбітан олеат – 0,3 мл (ml). Консервант – тіомерсал ≤ 50 мкг (mcg).
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА	Емульсія.
ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	Вакцина стимулює формування специфічного імунітету у домашньої птиці проти захворювання на Ньюкаслську хворобу (починаючи з 21-ї доби), інфекційний бронхіт, викликаний класичними штамами групи Массачусетс і варіантними штамами (БК-07, VAR2/V2), та синдром зниження несучості курей (починаючи з 28-ї доби), який зберігається позитивно. Лікувальних властивостей не має.
ВИД ПТИЦІ	Кури.
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ	Для профілактики Ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту птиці та синдрому зниження несучості серед курей-несучок та батьківського стада.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Не дозволяється вакцинувати кволих та хворих курей.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ	Максимального захисту можна досягти, вакцинуючи лише клінічно здорову птицю. Для вакцинації слід використовувати лише стерильне обладнання. Перевірте точність шприца, щоб перекоонатися у введенні правильної дози. Для вакцинації використовують звичайні або напівавтоматичні стерильні шприци та голки. Не допускається застосування хімічних дезінфікуючих засобів для стерилізації інструментів. Перед використанням вакцину підігривають до кімнатної температури (20-25°C), флакони ретельно струшують. При вакцинації необхідно дотримуватись правил асептики та особистої безпеки. Не використовувати вакцину у флаконах з тріщинами, без етикеток, порушенням закупорювання, з розшаруванням емульсії в нижній частині флакону, вакцину, не використану впродовж 10 годин після першого відбору вакцини, а також з закінченим терміном придатності.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ	Не змішувати з іншими профілактичними препаратами та не застосовувати одночасно з лікарськими засобами.
ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ПРИ НЕСУЧОСТІ	Не вакцинувати птицю в період несучості.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ	Вакцину вводять по 0,5 мл (ml) внутрішньом'язово (в ділянці стегна або грудних м'язів) або підшкірно (в нижню ділянку шиї) курам 90-100 денного віку, але не пізніше ніж за 30 діб до початку періоду несучості. Для створення більш напруженої імунної відповіді рекомендується заздалегідь, не менше ніж за 4 тижні, вакцинувати птицю живими вакцинами проти Ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту птиці згідно з прийнятою в господарстві схемою вакцинації.
ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	Вакцина не спричинює клінічно виражену реакцію на введення. Незначна припухлість, яка може утворитися в окремих птахів у місці введення, зникає протягом 2-3-х тижнів.

ПЕРІОД ВИВЕДЕННЯ (КАРЕНЦІЇ)	Нуль діб.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ І ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ВІП	Оператору: Цей ветеринарний препарат містить мінеральну олію. Випадкова ін'єкція/самоін'єкція може призвести до сильного болю та набряку, особливо, якщо це сталося у суглоб або палець. При випадковому введенні вакцини, негайно зверніться за медичною допомогою та візьміть з собою листівку-вкладку. Якщо біль триває більше 12 годин після медичного огляду, зверніться до лікаря ще раз. Лікарю: Потрібна негайна хірургічна допомога, що може потребувати надрізу місця ін'єкції та видалення препарату.
ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З НЕВИКОРИСТАНИМ ВІП, СПОСОБИ ЙОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЯ	Вакцину, не використану через 10 годин після відкриття флакону, з закінченим терміном придатності, порожні флакони, шприці та флакони з залишками вакцини знешкоджують кип'ятінням впродовж 15 хвилин.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	24 місяці. 10 годин після першого відбору вакцини.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ	Зберігати в темному, недоступному для дітей місці за температури від 2 до 8°C. Не заморозувати!
УПАКОВКА	Скляні або пластикові флакони по 10 (5,0 мл), 20 (10,0 мл), 100 (50,0 мл), 200 (100,0 мл), 400 (200,0 мл), 500 (250,0 мл) або 1000 (500,0 мл) доз.
НАЗВА, МІСЦЕ НАХОДЖЕННЯ І МІСЦЕ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ	ТОВ „БІОТЕСТАБ” 08601 Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська 57-А. Адреса виробництва: 08601 Київська обл., м. Васильків, вул. Лістрового Олександра, буд. 1/3.
ПРАВИЛА ВІДПУСКУ	Без рецепту.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.