

PerFect® ГЛОБАЛ для котів
(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)
листівка-вкладка

Опис

Рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору зі специфічним запахом складників.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

імідаклоприд - 100 мг;

моксидектин - 10 мг.

Допоміжні речовини: бутилгідрокситолуол (Е 321), пропілен карбонат, бензиловий спирт.

Фармакологічні властивості

АТС vet: QP53A, ектопаразитарні ветеринарні препарати для місцевого застосування (QP53AX17 - імідаклоприд, QP54AB02 - моксидектин)

PerFect® ГЛОБАЛ для котів - це екто- та ендopаразитицид зовнішнього застосування. Фармакологічні властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин.

Імідаклоприд[1-(6-хлоро-3-піридилметил)-М-нітро-імідазолідин-2-іліденамін)]- ектопаразитицид, що належить до класу нітрометиле-гетероциклічних сполук. Група хімічного складу інсектоакарицидів - неонікотинноїди. Імідаклоприд має високу спорідненість до нікотинових ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи (ЦНС). Він взаємодіє з нікотинергічним рецептором ектопаразита, розміщеним на постсинаптичному нейроні, порушує передачу нервового імпульсу по ньому, та призводить до паралічу та загибелі ектопаразита. Через слабку взаємодію з нікотиновими рецепторами ссавців та низький рівень проникнення через їх гематоенцефалічний бар'єр, діюча речовина практично не впливає на ЦНС ссавців.

Моксидектин - макроциклічний лактон другого покоління з класу мільбеміцинів є напівсинтетичним похідним немадектину, який представляє собою продукт ферментації з бактерії *Streptomyces cyanogriseus* (підвиду *noncyanogenus*). Моксидектин діє на багатьох екто- та ендopаразитів. Він активний щодо нематод травного каналу і дихальних шляхів, а також мікрофілярій (стадії L3, L4) *Dirofilaria* spp. Механізм його дії обумовлений взаємодією з гамма- аміномасляною кислотою і глутаровими хлорними каналцями паразитів, що призводить до відкриття хлорних каналців у постсинаптичному просторі і збільшення іонів хлору, внаслідок чого відбувається незворотне зниження м'язової активності, параліч та загибель паразитів.

Після зовнішнього застосування імідаклоприд поширюється по всій поверхні шкіри тварини впродовж однієї доби і утримується на шкірі протягом усього періоду лікування.

Моксидектин абсорбується через шкіру, концентрується в жировій тканині тварини і розповсюджується системно, досягаючи максимальної концентрації в плазмі крові через 1-2 доби. Моксидектин виводиться з організму повільно, впродовж місяця після введення.

Застосування

Лікування та профілактика котів за ураження блохами (*Ctenocephalides* spp., *Pulex irritans*), отодектозу (*Otodectes cynotis*), нотоєдрозу (*Notoedres cati*), нематодозів травного каналу (*Toxocara cati*, *Ancylostoma tubeaforme*) та дихальних шляхів (*Eucoleus aerophilus*syn, *Capillaria aerophila*); профілактика дирофіляріозу (*Dirofilaria* spp.: мікрофілярії L3 та L4 стадії). Препарат може використовуватись як один із засобів при лікуванні алергічного блошиного дерматиту (*flea allergy dermatitis: FAD*).

Дозування

Препарат для котів застосовують шляхом крапельного (точкового) нанесення на суху непошкоджену шкіру в недоступному для злизування місці (на потилиці, між лопатками).

Мінімальна рекомендована доза для котів становить 1 мл на 10 кг маси тіла тварини (еквівалентно імідаклоприду - 10 мг/кг маси тіла, моксидектину - 1,0 мг/кг маси тіла). Мінімальний терапевтичний інтервал становить 4 тижні.

Перед застосуванням препарату рекомендується зважити тварину, а вміст флакону добре струсити. Кришка флакона містить піпетку-дозатор. Вміст піпетки-дозатора наносять краплями згідно дозування.

Флакон об'ємом 1,7 мл: флакон 1,7 мл розрахований на обробку тварин вагою 17 кг. Для тварин меншої ваги доза розраховується наступним чином: 1 крапля препарату з піпетки-дозатора (1 крапля дорівнює 0,03 мл) - на 300 г маси тіла тварини або 1 повне натиснення на ковпачок піпетки-дозатора (містить 8 крапель) - на 2,5 кг маси тіла тварини.

Залишок препарату у флаконі може бути використаний для наступної обробки тварини.

Розділити шерсть тварини на потилиці, щоб видно було шкіру, і нанести необхідну кількість крапель. Для запобігання злизування препарату, котам надягають комір з картону.

Лікування та профілактика ураження блохами (сифонатперозу)

Одноразова обробка попереджує зараження блохами впродовж 4-х тижнів. Доцільно поєднувати обробку тварини препаратом PerFect® ГЛОБАЛ для котів з обробкою місць перебування тварин з метою переривання життєвого циклу бліх. При лікуванні алергічного блошиного дерматиту препарат рекомендується застосовувати щомісяця.

Лікування вушної корости (отодектозу)

Одноразове застосування. Можлива повторна обробка через 30 діб. Не наносити препарат безпосередньо у вушний канал.

Лікування корости котів(нотоедрозу)

Одноразове застосування. Можлива повторна обробка через 30 діб

Лікування та профілактика ураження круглими гельмінтами (нематодозів) травного каналу та дихальних шляхів

Щомісячна обробка тварин препаратом знижує можливість зараження нематодами. Препарат також використовують у період профілактичного карантинування (за результатами дослідження проб калу), при планових та сезонних дегельмінтизаціях котів проти кишечних та легеневих нематодозів.

Профілактика дирофіляріозу

Препарат застосовують за 1 місяць до очікуваної активності кровосисних комах, впродовж усього періоду активності та місяць після завершення їх активності. Обробку тварин рекомендується проводити щомісяця в один і той же день. Якщо тварині застосовували інший препарат, що захищає від мікрофілярій, препарат PerFect® ГЛОБАЛ для котів можна застосовувати через 1 місяць після обробки попереднім препаратом. Препарат PerFect® ГЛОБАЛ для котів не знищує статевозрілих дирофілярій, але знижує кількість циркулюючих в крові мікрофілярій.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з гіперчутливістю до складових препарату.

Не застосовувати кошенятам віком до 9-ти тижнів і/або масою тіла до 1,0 кг.

Не застосовувати ослабленим, хворим та виснаженим тваринам!

Не застосовувати одночасно з іншими препаратами, що містять макроциклічні лактони (івермектин, дорамектин, селамектин, мільбемицин).

Обробку вагітних і годуючих кішок слід проводити з обережністю під наглядом ветеринарного лікаря.

Застереження

Препарат призначений лише для зовнішнього нашкірного застосування.

При роботі з препаратом PerFect® ГЛОБАЛ для котів необхідно дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Після роботи з препаратом необхідно ретельно вимити руки.

Після застосування препарату не можна стригти тварин до повного висихання препарату на шкірі.

Під час обробки тварин не можна палити, пити і приймати їжу.

При обробці тварин уникати попадання препарату в очі, ротову порожнину.

Не допускати контакту щойно обробленої тварини з іншими тваринами до повного висихання шкіри.

При нанесенні препарату уникати можливості злизування препарату тваринами.

Часте купання тварин з миючими засобами у період між обробками препаратом PerFect® ГЛОБАЛІ для котів може знизити ефективність препарату.

Часте та повторне використання екто- і ендопаразитоцидів будь-якого класу може призвести до виникнення резистентності паразитів до діючої речовини.

Після застосування препарату у котів можливий короткочасний свербіж, почервоніння шкіри, ознаки засалювання шерсті, блювота. Ці прояви швидко минають без лікування.

У тварин, що випадково злизали препарат відразу після нанесення, можуть виникнути ознаки нервових розладів (атаксія, генералізований тремор, розширення зіниць), порушення дихання, посилене слиновиділення та блювота. В цих випадках рекомендується застосування симптоматичне лікування та ентеросорбенти (активоване вугілля).

Люди із гіперчутливістю до складників препарату повинні наносити препарат в гумових рукавицях.

Форма випуску

Флакони зі скла або полімерні по 1,7 мл, укупорені кришкою-крапельницею та запаковані у картонні коробки.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому захищеному від світла місці за температури від 10 °С до 25 °С, у місцях, недоступних для дітей та тварин, окремо від харчових продуктів та кормів.

Термін придатності

24 місяці.

Після першого відбору з флакону препарат необхідно зберігати в темному місці за температури від 10 до 25°С протягом 90 діб.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ветсинтез»
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Виробник готового продукту

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ветсинтез»
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна