

12.03.2022

Енкон
(концентрат емульсії (маслянистий розчин) для зовнішнього використання)
листівка-вкладка

Опис

Рідина жовто- бурштинового кольору, густа, прозора.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

енілконазол – 100 мг.

Допоміжні речовини: твін 20, сорбітану монолаурат.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QD01A – Протигрибкові ветеринарні препарати для місцевого застосування. QD01AC90 – Енілконазол.

Енілконазол – синтетичний фунгіцид широкого спектру дії, який належить до групи імідазолу, активний щодо різних видів паразитуючих мікроміцетів, в тому числі, збудників трихофітії та мікроспорії (*Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton equinum*, *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum*).

Виборково інгібує біосинтез ергостерину – основного компонента клітинних мембран мікроміцетів та дріжджів, що призводить до незворотних змін в стінках їхніх клітин.

При локальному зовнішньому застосуванні енілконазол має низьку системну доступність, погано всмоктується через шкіру і проникає в тканини організму лише у незначних кількостях.

Застосування

Лікування коней, собак та котів при дерматомікозах, переважно спричинених *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton equinum*, *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum*.

Дозування

Тварин лікують 2%-вою емульсією препарату, для виготовлення якої препарат змішують з теплою водою в об'ємному співвідношенні 1:50.

Курс лікування – чотири рази з інтервалом у 3-4 доби. При тяжких захворюваннях лікування може бути продовжено за погодженням з лікарем ветеринарної медицини.

Всі уражені та межуючі з ними ділянки шкіри попередньо очищають від кірок та бруду за допомогою змоченої в робочій емульсії щітки або м'якої тканини та обробляють емульсією.

У собак і котів, шкіру обробляють проти росту шерсті, повністю покриваючи емульсією уражені та межуючі з ними ділянки. Тварин довгошерстих порід уражену ділянку перед обробкою доцільно постригти. Обробку собак і кішок дрібних порід можна проводити зануренням в ємність з лікувальною емульсією

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з підвищеною індивідуальною чутливістю до енілконазолу або допоміжних речовин препарату.

Застереження

Побічна дія

Побічної дії та ускладнень як правило не спостерігається. У гіперчутливих тварин можливе виникнення алергічних реакцій. У рідкісних випадках спостерігалися ознаки розладів травлення (анорексія, слинотеча, блювання), нервової системи (атаксія, прострація/млявість) та дуже рідко - шкіри (свербіж, алопеція).

Особливі застереження при використанні

Для запобігання повторного зараження тварин, під час та після лікування, все обладнання, яке контактувало з хворими тваринами (упряж, щітки, віники, лопати, скребки, будки, кошики, нашийники тощо), промивають чи обприскують робочою емульсією препарату або іншими придатними для цього фунгіцидними засобами.

12.03.2022

Для лікування тварин використовують лише свіжоприготовлені емульсії.

Після нанесення препарату тварин не миють.

Необхідно запобігати злизування препарату тваринами.

Використання під час вагітності, лактації

Не обмежується.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з іншими фунгіцидними препаратами для місцевого застосування.

Спеціальні застереження

Залишки робочої емульсії препарату після лікування тварин використовують для знезараження обладнання, яке контактувало з хворими тваринами. Невикористаний препарат утилізують відповідно до чинного законодавства.

Період виведення (каренція)

Не застосовується.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, які прийняті при роботі з ветеринарними препаратами. Під час роботи з препаратом необхідно уникати прямого контакту з ним та робочою емульсією. Обробку тварин слід проводити в гумових рукавичках. Після роботи з препаратом необхідно вимити руки теплою водою з милом.

Форма випуску

Скляні або полімерні флакони по 10 та 100 мл, полімерні каністри по 1000 мл.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей, місце за температури від 5 °С до 25 °С в упаковці виробника.

Термін придатності – 2 роки.

Термін придатності після першого відкриття (відбору) – 3 місяці за умови зберігання його в закритій тарі.

Робочу емульсію препарату використовують впродовж 24 годин.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту:

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна