

7 2. 1 2. 2023

ФРОНТЛАЙН СПРЕЙ
(розчин для зовнішнього застосування, спрей)
листівка-вкладка

Опис

Безбарвний прозорий розчин.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

фіпроніл - 2,5 мг.

Допоміжні речовини: коповідон, ізопропанол, вода дистильована.

Фармакологічні властивості

АТС-vet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX15 – фіпроніл)

Препарат - контактний інсектоакарицидний розчин для зовнішнього застосування.

Фіпроніл, який входить до складу препарату, похідний піразолу з інсектицидною і акарицидною дією. Механізм дії фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводить до ураження нервової системи ектопаразитів і їх загибелі. Фіпроніл накопичується в волосяних цибулинах і жирових залозах та не впливає на центральну нервову систему тварин.

Препарат ефективний проти кліщів до 5 тижнів, проти бліх – від 1-го до 3-х місяців, проти вошей – до 63 діб у собак та до 42 діб для котів.

Застосування

Профілактика та лікування собак і котів при ураженні ектопаразитами: паразитиформними кліщами (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*), блохами (*Ctenocephalides spp.*, *Pulex irritans*), волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), вошами (*Linognathus setosus*).

Профілактика та лікування собак і котів при блошиному алергічному дерматиті.

Дозування

Препарат застосовують собакам та котам зовнішньо, шляхом розпилення на тіло тварини.

Дозування: доза препарату становить 3-6 мл на кг маси тіла тварини (7,5 – 15 мг фіпронілу на кг маси тіла), що відповідає 2–4 натисканням на кг маси тіла для флаконів ємністю 250 та 500 мл або 6-12 натисканням для флаконів ємністю 100 мл.

Спосіб застосування: розпилювати препарат на всю поверхню тіла тварини з відстані 10 – 20 см, проти росту шерсті; у довгошерстих тварин рекомендується розчісувати шерсть щіткою, щоб препарат міг потрапити на шкіру; для обробки голови та ділянки навколо очей препарат наносять на руку у рукавиці і обережно втирають у шерсть тварини.

Після обробки препарат повинен висохнути на тілі тварини. Не висушувати препарат за допомогою рушників.

Мінімальний інтервал між застосуванням становить 4 тижні.

Протипоказання

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати тваринам при гіперчутливості до компонентів препарату!

Не застосовувати тваринам віком до 2 діб!

Не застосовувати для кролів!

Застереження

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

При обробці тварин препаратом користуватися гумовими рукавицями.

Уникати попадання препарату на шкіру або в очі, не вдихати препарат.

При випадковому потраплянні препарату на шкіру або слизові оболонки необхідно відразу промити їх великою кількістю води.

22.12.2023

Після роботи з препаратом необхідно вимити руки з милом.
Забороняється пити, приймати їжу і палити під час роботи з препаратом.

Після обробки тварин не гладити тварин та уникати контакту маленьких дітей з обробленими тваринами до повного висихання препарату.

Особам, чутливим до діючих речовин препарату, уникати прямого контакту з ним.

Форма випуску

Флакони з поліетилену високої щільності з механічною помпою для розпилення по 100, 250 та 500 мл.

Зберігання

Зберігати препарат в оригінальній упаковці у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей і тварин місці, за температури від 2 до 30 °С.

Термін придатності

36 місяців.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Берінгер Інгельхайм Ветмедіка ГмбХ,
55216 м. Інгельхайм-на-Рейні,
Бінгер штрассе, 173,
НІМЕЧЧИНА

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
55216 Ingelheim-am-Rhein,
Binger Strasse 173,
GERMANY

Виробник готового продукту

Берінгер Інгельхайм Енімал Хелс Франс
СКС, 4 шема дю Калке - 31100 Тулуза,
Франція

Boehringer Ingelheim Animal Health France
SCS, 4 chemin du Calquet - 31100 Toulouse,
France