



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного висновку від 11.05.2023 р. №40 рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів від 18.05.2023 р. №357 зареєстровано:

препарат **Вектормун ND,
Vectormune ND – вакцина векторна
клітинно-асоційована заморожена проти
хвороби Марека та ньюкаслської хвороби**

у формі **суспензії**

Власник реєстраційного посвідчення:

**Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд,
1107 Будапешт, Сзалас 5, Угорщина**

зареєстровано в Україні за №

ВА-00888-02-18

від

18.05.2023

Виробник:

**Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд,
1107 Будапешт, Сзалас 5, Угорщина**

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2);
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до

17.05.2028

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату.

Головний державний ветеринарний інспектор України
Chief State Veterinary Inspector of Ukraine



Ольга ШЕВЧЕНКО

Коротка характеристика препарату

1. Назва ветеринарного препарату

Вектормун ND, Vectormune ND – вакцина векторна клітинно-асоційована заморожена проти хвороби Марека та ньюкаслської хвороби.

2. Якісний і кількісний склад

Одна доза вакцини містить:

генетично сконструйований вірус хвороби Марека (серотип 3, штам HVT) в клітинно-асоційованій формі, що вміщує в собі антиген вірусу ньюкаслської хвороби (гібридний білок F) – щонайменше 2 500 КУО в одній дозі.

Допоміжні речовини – кріопротектор 1, кріопротектор 2.

3. Фармацевтична форма

Суспензія заморожена.

4. Імунобіологічні властивості

Вакцина рекомендована для активної імунізації курячих ембріонів на 18-19 день інкубації та для підшкірної вакцинації добових курчат з метою профілактики хвороби Марека та ньюкаслської хвороби.

Збільшення рівня антитіл проти ньюкаслської хвороби у попередньо імунізованої птиці відмічається впродовж 3 тижнів після вакцинації й забезпечує захист щеплених курчат щонайменше впродовж 19 тижнів після вакцинації.

Імунітет проти хвороби Марека формується протягом 9 днів після вакцинації.

5. Клінічні особливості

5.1. Вид тварин

Кури.

5.2. Показання до застосування

Активна імунізація курчат та курячих ембріонів проти хвороби Марека та ньюкаслської хвороби.

5.3. Протипоказання

Відсутні.

5.4. Побічна дія

Вакцинація не спричинює будь-яких системних реакцій.

5.5. Особливості застереження при використанні

Вакцинована птиця може виділяти вакцинний штам вірусу, проте даний вірус не передається від вакцинованої птиці до не вакцинованої. Вакцинний штам вірусу може поширитися на індиків, проте доведено, що вакцина є безпечною для індиків.

Все стадо птиці слід вакцинувати одночасно. Вакцину треба використати одразу ж після її розрідження. Впродовж щонайменше двох тижнів після вакцинації слід суворо дотримуватись умов належного утримання та виробництва.

5.6. Застосування під час вагітності, лактації, несучості

Не застосовувати птиці в період несучості.

5.7. Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Вакцина Вектормун ND може бути введена одночасно або в поєднанні з вакцинами Севак Трансмун або Севак Rispens.

5.8. Дози і способи введення тваринам різного віку

In ovo на 18-19 день інкубації:

Вакцину слід ввести по 0,05 мл у кожен ембріон.

Підшкірно добовим курчатам:

Вакцину слід ввести по 0,2 мл на особину.

Вакцина рекомендована до застосування після попереднього розведення специфічним розріджувачем для вакцин проти хвороби Марека.

Можливі розведення для різних презентацій вакцини:

Для введення in ovo:

Кількість ампул з вакциною	Кількість доз вакцини в одній ампулі	Розріджувач (мл)	Одна доза (мл)
4	2000	400	0.05
2	4000	400	0.05
4		800	0.05
6		1200	0.05
8		1600	0.05

Важливо! Для введення in ovo не рекомендується використовувати розріджувач об'ємом менше 400 мл, оскільки цієї кількості може бути не достатньо для запуску обладнання для введення in-ovo протягом більше 10 хвилин.

Для підшкірного введення:

Кількість ампул з вакциною	Кількість доз вакцини в одній ампулі	Розріджувач (мл)	Одна доза (мл)
1	1000	200	0.20
1	2000	400	0.20
2		800	0.20
1	4000	800	0.20

Важливо! Для підшкірного введення не рекомендується використовувати розріджувач об'ємом більше 800 мл, оскільки введення вакцини може зайняти більше 2-х годин.

При роботі з вакциною слід дотримуватись правил асептики/антисептики.

Спосіб отримання вакцинної суспензії:

1. До початку вакцинації пакет з розріджувачем витримують за температури 20-25⁰ С впродовж 8-12 год. Після розрахунку необхідної дози вакцини та об'єму розріджувача, ампули з вакциною обережно виймають з посудини Дьюара (використовуючи корнцанги).
2. Гумову пробку ін'єкційної канюлі пакета з розріджувачем протирають спиртом. Після повного випаровування спирту проколюють пробку, використовуючи стерильний шприц, об'ємом 5 мл і відбирають 2 мл розріджувача.
3. Ампули з вакциною обережно занурюють на одну хвилину в ємкість з водою, нагрітою до температури 27-39°C.
4. Після повного розмороження, ампули обережно відкривають на відстані витягнутої руки, для попередження травмування.
5. Використовуючи голку щонайменше 18-го калібру набирають вміст ампули у стерильний 5 мл шприц, в який було попередньо набрано 2 мл розріджувача.
6. Потім через ін'єкційну канюлю, повільно, уникаючи тиску на поршень, вводять вакцину в пакет з розріджувачем, після чого його вміст обережно перемішують 5-6 разів.
7. Ампули по декілька разів промивають розріджувачем.

Операції в пунктах 2-6 слід повторити для відповідної кількості ампул.

Розріджену вакцину використовують впродовж 2-х годин. Уникають дії прямих сонячних променів. В процесі вакцинації вміст пакету з розрідженою вакцинною злегка перемішують, уникаючи утворення піни. Не можна сильно струшувати!

Добовим курчатам вакцину вводять за допомогою звичайних або автоматичних шприців чи дозаторів. Для введення in ovo використовують спеціалізоване обладнання.

Шприци та голки перед вакцинацією стерилізують автоклавуванням, за режиму 1,5 Па впродовж 15 хв. чи кип'ятінням в дистильованій воді протягом 20 хв, або використовують стерильні одноразові голки та шприци.

Не допускається стерилізація інструментів хімічними засобами.

Добовим курчатам вакцину вводять підшкірно в ділянці верхньої третини шиї, в дозі 0,2 мл на особину. Курчат фіксують за шию, в основі голови, складку, що утворилася, обережно відтягують великим та вказівним пальцями. Голку (довжиною 0,9 чи 1,25 см) вводять в каудальному напрямку, уникаючи введення вакцини в шкіру, м'язи, хребці.

Курячим ембріонам вакцину вводять в алантоїсну порожнину в дозі 0,05 мл. З цією метою ембріони розміщують повітряною камерою до верху та за допомогою спеціалізованого автоматичного обладнання чи шприца-автомата інокулюють розріджену вакцину.

5.9. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Введення десятикратної дози не викликає жодних ускладнень у птиці, як *in ovo*, так і підшкірно.

5.10. Спеціальні застереження

Клітини і часточки вірусів, що входять до складу вакцини дуже тендітні і вимагають дбайливого поводження. Неналежне зберігання, транспортування та поводження з вакциною може спричинити зниження її імунобіологічної активності. Вакцину необхідно зберігати в рідкому азоті. Розріджену чи розморожену вакцину не можна заморозувати повторно.

5.11. Період виведення (каренції)

0 діб.

5.12. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі вводять засоби захисту тваринам

Перед початком роботи ознайомтесь зі всіма правилами роботи з рідким азотом й ретельно їх дотримуйтесь. Користуйтесь засобами індивідуального захисту (захисний халат, гумові рукавички, захисні окуляри, маска для обличчя та ін.) при роботі з рідким азотом. Посудини Дьюара слід зберігати лише в добре вентильованому приміщенні. Слід регулярно перевіряти вміст азоту в посудині Дьюара та поновлювати його, для забезпечення повного занурення ампул з вакциною в рідкий азот.

У разі самовведення промийте рану під проточною водою з милом, обробіть 70% розчином етилового спирту та негайно зверніться до лікаря.

6. Фармацевтичні особливості

6.1. Основні форми несумісності

Не встановлені.

6.2. Термін придатності

24 місяці.

6.3. Особливі застереження щодо зберігання

Вакцину слід зберігати та транспортувати в посудині Дьюара з рідким азотом за температури мінус 196° С. Повторно не заморозувати!

6.4. Природа і склад контейнера первинного упакування

Скляні запаяні ампули по 1000, 2000 та 4000 доз вакцини. Ампули з вакциною закріплені в спеціальних металевих фіксаторах та розміщені в посудині Дьюара в рідкому азоті.

6.5. Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності власника реєстраційного посвідчення та виробника

Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд, 1107 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина.

6.7. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом

Утилізацію усіх відкритих під час проведення вакцинації ампул з вакциною слід здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства України. Ампули з вакциною, що зберігалися без рідкого азоту, слід утилізувати.

7. Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “ Вказівки про порядок пред’явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині ” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті ампули цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Вектормун ND, Vectormune ND – вакцина векторна клітинно-асоційована заморожена проти хвороби Марека та ньюкаслської хвороби.

Склад

генетично сконструйований вірус хвороби Марека (серотип 3, штам HVT) в клітинно-асоційованій формі, що вміщує в собі антиген вірусу ньюкаслської хвороби (гібридний білок F) – щонайменше 2 500 КУО в одній дозі.

Допоміжні речовини – кріопротектор 1, кріопротектор 2.

Фармацевтична форма

Суспензія заморожена.

Імунобіологічні властивості

Вакцина рекомендована для активної імунізації курячих ембріонів на 18-19 день інкубації та для підшкірної вакцинації добових курчат з метою профілактики хвороби Марека та ньюкаслської хвороби.

Збільшення рівня антитіл проти ньюкаслської хвороби у попередньо імунізованої птиці відмічається впродовж 3 тижнів після вакцинації й забезпечує захист щеплених курчат щонайменше впродовж 19 тижнів після вакцинації.

Імунітет проти хвороби Марека формується протягом 9 днів після вакцинації.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Активна імунізація курчат та курячих ембріонів проти хвороби Марека та ньюкаслської хвороби.

Протипоказання

Відсутні.

Застереження при застосуванні

Вакцинована птиця може виділяти вакцинний штам вірусу, проте даний вірус не передається від вакцинованої птиці до не вакцинованої. Вакцинний штам вірусу може поширитися на індиків, проте доведено, що вакцина є безпечною для індиків.

Все стадо птиці слід вакцинувати одночасно. Вакцину треба використати одразу ж після її розрідження. Впродовж щонайменше двох тижнів після вакцинації слід суворо дотримуватись умов належного утримання та виробництва.

Взаємодія з іншими засобами

Вакцина Вектормун ND може бути введена одночасно або в поєднанні з вакциною Севак Трансмун.

Спосіб застосування та дози

In ovo на 18-19 день інкубації:

Вакцину слід ввести по 0,05 мл у кожен ембріон.

Підшкірно добовим курчатам:

Вакцину слід ввести по 0,2 мл на особину.

Вакцина рекомендована до застосування після попереднього розведення специфічним розріджувачем для вакцин проти хвороби Марека.

Можливі розведення для різних презентацій вакцини:

Для введення in ovo:

Кількість ампул з вакциною	Кількість доз вакцини в одній ампулі	Розріджувач (мл)	Одна доза (мл)
4	2000	400	0.05
2	4000	400	0.05
4		800	0.05
6		1200	0.05
8		1600	0.05

Важливо! Для введення in ovo не рекомендується використовувати розріджувач об'ємом менше 400 мл, оскільки цієї кількості може бути не достатньо для запуску обладнання для введення in-ovo протягом більше 10 хвилин.

Для підшкірного введення:

Кількість ампул з вакциною	Кількість доз вакцини в одній ампулі	Розріджувач (мл)	Одна доза (мл)
1	1000	200	0.20
1	2000	400	0.20
2		800	0.20
1	4000	800	0.20

Важливо! Для підшкірного введення не рекомендується використовувати розріджувач об'ємом більше 800 мл, оскільки введення вакцини може зайняти більше 2-х годин.

При роботі з вакциною слід дотримуватись правил асептики/антисептики.

Спосіб отримання вакцинної суспензії:

1. До початку вакцинації пакет з розріджувачем витримують за температури 20-25⁰ С впродовж 8-12 год. Після розрахунку необхідної дози вакцини та об'єму розріджувача, ампули з вакциною обережно виймають з посудини Дьюара (використовуючи корнцанги).
2. Гумову пробку ін'єкційної канюлі пакета з розріджувачем протирають спиртом. Після повного випаровування спирту проколюють пробку, використовуючи стерильний шприц, об'ємом 5 мл і відбирають 2 мл розріджувача.
3. Ампули з вакциною обережно занурюють на одну хвилину в ємкість з водою, нагрітою до температури 27-39°C.
4. Після повного розмороження, ампули обережно відкривають на відстані витягнутої руки, для попередження травмування.
5. Використовуючи голку щонайменше 18-го калібру набирають вміст ампули у стерильний 5 мл шприц, в який було попередньо набрано 2 мл розріджувача.
6. Потім через ін'єкційну канюлю, повільно, уникаючи тиску на поршень, вводять вакцину в пакет з розріджувачем, після чого його вміст обережно перемішують 5-6 разів.
7. Ампули по декілька разів промивають розріджувачем.

Операції в пунктах 2-6 слід повторити для відповідної кількості ампул.

Розріджену вакцину використовують впродовж 2-х годин. Уникають дії прямих сонячних променів. В процесі вакцинації вміст пакету з розрідженою вакцинною злегка перемішують, уникаючи утворення піни. Не можна сильно струшувати!

Добовим курчатам вакцину вводять за допомогою звичайних або автоматичних шприців чи дозаторів. Для введення in ovo використовують спеціалізоване обладнання.

Шприци та голки перед вакцинацією стерилізують автоклавуванням, за режиму 1,5 Па впродовж 15 хв. чи кип'ятінням в дистильованій воді протягом 20 хв, або використовують стерильні одноразові голки та шприци.

Не допускається стерилізація інструментів хімічними засобами.

Добовим курчатам вакцину вводять підшкірно в ділянці верхньої третини шиї, в дозі 0,2 мл на особину. Курчат фіксують за шию, в основі голови, складку, що утворилася, обережно відтягують великим та вказівним пальцями. Голку (довжиною 0,9 чи 1,25 см) вводять в каудальному напрямку, уникаючи введення вакцини в шкіру, м'язи, хребці.

Куричим ембріонам вакцину вводять в алантоїсну порожнину в дозі 0,05 мл. З цією метою ембріони розміщують повітряною камерою до верху та за допомогою спеціалізованого автоматичного обладнання чи шприца-автомата інокулюють розріджену вакцину.

Побічні ефекти

Вакцинація не спричинює будь-яких системних реакцій.

Період виведення (каренції)

0 діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВП

Перед початком роботи ознайомтесь зі всіма правилами роботи з рідким азотом й ретельно їх дотримуйтесь. Користуйтесь засобами індивідуального захисту (захисний халат, гумові рукавички, захисні окуляри, маска для обличчя та ін.) при роботі з рідким азотом. Посудини Дьюара слід зберігати лише в добре вентиляваному приміщенні. Слід регулярно перевіряти вміст азоту в посудині Дьюара та поновлювати його, для забезпечення повного занурення ампул з вакциною в рідкий азот.

У разі самовведення промийте рану під проточною водою з милом, обробіть 70% розчином етилового спирту та негайно зверніться до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Утилізацію усіх відкритих під час проведення процедури вакцинації ампул з вакциною слід здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства України. Ампули з вакциною, що зберігалися без рідкого азоту слід утилізувати.

Термін придатності

24 місяці.

Умови зберігання і транспортування

Вакцину слід зберігати та транспортувати в посудині Дьюара з рідким азотом за температури мінус 196⁰ С. Повторно не заморожувати!

Упаковка

Скляні запаяні ампули по 1000, 2000 та 4000 доз вакцини. Ампули з вакциною закріплені в спеціальних металевих фіксаторах та розміщені в посудині Дьюара в рідкому азоті.

Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності власника реєстраційного посвідчення та виробника

Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд, 1107 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті ампули цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.

Додаток 3
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00888-02-18
від 18.05.2023



Вектормун ND, Vectormune ND

вакцина
векторна клітинно-асоційована заморожена
проти хвороби Марека
та ньюкаслської хвороби.

4000 доз



Суспензія заморожена
Склад
генетично сконструйований вірус хвороби Марека (серотип 3, штам HVT) в клітинно-асоційованій формі, що вміщує в собі антиген вірусу ньюкаслської хвороби (гібридний білок F) – щонайменше 2 500 БУО в одній дозі.
Допоміжні речовини – кріопротектор 1, кріопротектор 2.

Показання до застосування
Активна імунізація курчат та курячих ембріонів проти хвороби Марека та ньюкаслської хвороби.

Спосіб застосування та дози
Вакцина рекомендована до застосування після попереднього розведення специфічним розріджувачем для вакцин проти хвороби Марека.
Добовим курчатом вакцину вводять підшкірно в ділянці верхньої третини шиї, в дозі 0,2 мл на особину.
Курячим ембріонам вакцину вводять в алантоїсну порожнину в дозі 0,05 мл.

Перед застосуванням уважно прочитайте дистівку-вкладку!
Особливості застереження при використанні
Все стадо птиці слід вакцинувати одночасно. Вакцину треба використати одразу ж після її розрідження. Впродовж щонайменше двох тижнів після вакцинації слід суворо дотримуватись умов належного утримання та виробництва.

Умови зберігання і транспортування
Вакцину слід зберігати та транспортувати в посудині Дьюара з рідким азотом за температури мінус 196 °C. Повторно не заморожувати!

Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності власника реєстраційного посвідчення та виробника
Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд,
1107 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина.

Серія №:
Дата виготовлення:
Придатний до:
Кількість ампул:


РПН№ ВА-00888-02-18

ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

00000/00

product name: C Вектормун ND, Vectormune ND /4000 доз		language: UA	item code: 00000	revision: 00	standard number:
méret /size: 108 x 186 mm (rolling: A/4)	modified item code: -	old revision: -	changing:	date: 2023.04.13.	
szín /colours: Black		font (size [leading]): Myriad Pro (7,5 pt, sortáv: 95%)			graphic version: v1
					made/ modified by: RAI ÁTS Erzsébet

Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00888-02-18
від 18.05.2023



Вектормун ND, Vectormune ND

вакцина
векторна клітинно-асоційована заморожена
проти хвороби Марека
та ньюкаслської хвороби.

2000 доз



Суспензія заморожена
Склад
генетично сконструйований вірус хвороби Марека (серотип 3, штам HVT) в клітинно-асоційованій формі, що вміщує в собі антиген вірусу ньюкаслської хвороби (гібридний білок F) – щонайменше 2 500 БУО в одній дозі.
Допоміжні речовини – кріопротектор 1, кріопротектор 2.

Показання до застосування
Активна імунізація курчат та курячих ембріонів проти хвороби Марека та ньюкаслської хвороби.

Спосіб застосування та дози
Вакцина рекомендована до застосування після попереднього розведення специфічним розріджувачем для вакцин проти хвороби Марека.
Добовим курчатом вакцину вводять підшкірно в ділянку верхньої третини шиї, в дозі 0,2 мл на особину.
Курячим ембріонам вакцину вводять в алантоїсну порожнину в дозі 0,05 мл.

Перед застосуванням уважно прочитайте дистівку-вкладку!
Особливості застереження при використанні
Все стадо птиці слід вакцинувати одночасно. Вакцину треба використати одразу ж після її розрідження. Впродовж щонайменше двох тижнів після вакцинації слід суворо дотримуватись умов належного утримання та виробництва.

Умови зберігання і транспортування
Вакцину слід зберігати та транспортувати в посудині Дьюара з рідким азотом за температури мінус 196 °C. Повторно не заморожувати!

Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності власника реєстраційного посвідчення та виробника
Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд,
1107 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина.

Серія №:
Дата виготовлення:
Придатний до:
Кількість ампул:

РПН № ВА-00888-02-18

ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

00000/00

product name: C Вектормун ND, Vectormune ND /2000 доз			language: UA	item code: 00000	revision: 00	standard number:
méret /size: 108 × 186 mm (rolling: A/4)	modified item code: -	old revision: -	changing:	date: 2023.04.13.		
szín /colours:  Black			font (size [leading]): Myriad Pro (7,5 pt, sortáv: 95%)			graphic version: v1
						made/ modified by: BALÁZS Erzsébet

Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00888-02-18
від 18.05.2023

**Вектормун ND,
Vectormune ND**
вакцина
векторна клітинно-асоційована заморожена
проти хвороби Марека
та ньюкаслської хвороби.

1000 доз





Суспензія заморожена
Склад
генетично сконструйований вірус хвороби Марека (серотип 3, штам HVT) в клітинно-асоційованій формі, що вміщує в собі антиген вірусу ньюкаслської хвороби (гібридний білок F) – щонайменше 2 500 БУО в одній дозі.
Допоміжні речовини – кріопротектор 1, кріопротектор 2.

Показання до застосування
Активна імунізація курчат та курячих ембріонів проти хвороби Марека та ньюкаслської хвороби.

Спосіб застосування та дози
Вакцина рекомендована до застосування після попереднього розведення специфічним розріджувачем для вакцин проти хвороби Марека.
Добовим курчатам вакцину вводять підшкірно в ділянці верхньої третини шиї, в дозі 0,2 мл на особину.
Курячим ембріонам вакцину вводять в алантоїсну порожнину в дозі 0,05 мл.

Перед застосуванням уважно прочитайте дистівку-вкладку!
Особливості застереження при використанні
Все стадо птиці слід вакцинувати одночасно. Вакцину треба використати одразу ж після її розрідження. Впродовж щонайменше двох тижнів після вакцинації слід суворо дотримуватись умов належного утримання та виробництва.

Умови зберігання і транспортування
Вакцину слід зберігати та транспортувати в посудині Дьюара з рідким азотом за температури мінус 196 °С. Повторно не заморозувати!

Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності власника реєстраційного посвідчення та виробника
Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд,
1107 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина.

Серія №:

РПН№ ВА-00888-02-18

Дата виготовлення:

Придатний до:

Кількість ампул:

00000/00

ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

product name: С Вектормун ND, Vectormune ND /1000 доз			language: UA	item code: 00000	revision: 00	standard number:
méret /size: 108 × 186 mm (rolling: A/4)	modified item code: -	old revision: -	changing:	date: 2023.04.13.		
szín /colours:  Black			font (size [leading]): Myriad Pro (7,5 pt, sortáv: 95%)			graphic version: v1
						made/ modified by: BALÁZS Erzsébet