

ROLIMUN POX, ПОЛІМУН ПОКС**вакцина проти віспи птиці, жива.**

СКЛАД	Активні речовини вакцини: вірус віспи птиці штам Cutter $\geq 10^{2.8}$ ТЦД ₅₀ в дозі. Допоміжні речовини в вакцині: пептон або LH-B – 120 мг на флакон. Розчинник: 25% розчин гліцерину на фосфатному буфері.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА	Ліофілізат та розчинник.
ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	Захисні антитіла формуються через 2-3 тижні після вакцинації і захищають птицю від інфікування протягом періоду несучості, а також молодняк від вакцинованої птиці в перші тижні життя.
ВИД ТВАРИН	Кури, індики.
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ	Для захисту від захворювання щеплять курей старше 8 тижнів, а індиків - у віці старше 18 тижнів.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Не дозволяється вакцинувати кволу та хвору, птицю молодше вказаних строків вакцинації.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ	Не використовують вакцину у флаконах з тріщинами, без етикеток, порушенням укупорювання, таку що не розчинилася, не використану впродовж шести годин з моменту її розчинення або з закінченням терміну дії. Для розчинення вакцини не використовують розчинник у флаконах з тріщинами, без етикеток, порушенням укупорювання, зі зміною кольору або консистенції.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ	Не рекомендується застосовувати з будь-якими вакцинами одночасно.
ОСОБЛИВИ ВКАЗІВКИ ПРИ ВАГІТНОСТІ, ЛАКТАЦІЇ ЧИ НЕСУЧОСТІ	Не застосовують за 28 днів до та в період яйцекладки.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ	Перед застосуванням 1000 доз вакцини у флаконі розчиняють в 10 мл розчинника (500 доз в 5 мл, 100 доз в 1 мл). Вакцину вводять методом проколу перетинки крила 2-голковим ін'єктором. Перед імунізацією голки ін'єктора занурюють у вакцину, виймають і проколюють ним шкірну перетинку із внутрішньої сторони крила. Всю птицю пташника необхідно вакцинувати одночасно. В разі проведення штучної линьки після закінчення періоду несучості проводять ревакцинацію птиці способом і в дозах що вказані вище.
ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	Реакція на введення вакцини може наступити на 5 день після імунізації і характеризується утворенням затвердін під шкірою та виспін на зовнішній і внутрішній поверхні перетинки крила птиці у місці проколу, що зникають впродовж двох тижнів.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ (СИМПТОМИ, НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ)	Застосування десяти доз вакцини не діє негативно на здорову птицю.
ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ	14 діб.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ І ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ВІП	Необхідно дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та техніки безпеки при проведенні вакцинації. У разі випадкової самоін'єкції необхідно негайно звернутись за медичною допомогою, маючи при собі листівку-вкладку на даний препарат.
ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З НЕВИКОРИСТАНИМ ВІП, СПОСОБИ ЙОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЇ	Вакцину з закінченим терміном дії, не використану впродовж шести годин після розчинення, порожні флакони та голки ін'єктора необхідно знезаразити кип'ятінням впродовж 30 хвилин.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	Вакцина та розчинник придатні 24 місяці. Вакцина після розчинення придатна впродовж шести годин.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ	Вакцину зберігають у темному, не доступному для дітей місці, при температурі від 2 до 8 °C або мінус 20 °C. Короткочасове, до 48 годин, зберігання та транспортування препарату при температурі до 14 °C не несе негативного впливу на якість препарату. Розчинник зберігають в темному, не доступному для дітей місці, при температурі від 2 до 8 °C. Не заморозувати!
УПАКОВКА ТА ФАСУВАННЯ	Вакцина у флаконах зі скла по 100, 500 або 1000 доз укупорених гумовими пробками та закатаних алюмінієвими ковпачками. Розчинник у флаконах відповідно по 1,0 мл (мл), 5,0 мл (мл) або 10,0 мл (мл).
НАЗВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВЛАСНИКА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОВІДЧЕННЯ І ВИРОБНИКА	ТОВ „БІОТЕСТЛАБ” 08601 Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська 57-А. Адреса виробництва: Україна, 08601, Київська обл., Обухівський район, м. Васильків, вул. Лістрового Олександра, буд. 1/3.
ПРАВИЛА ВІДПУСКУ	Без рецепта.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.